

1. 牙龈炎患者基础治疗后采取的菌斑控制措施中错误的是

- A. 使用电动牙刷刷牙
- B. 使用牙间隙刷
- C. 用软毛牙刷刷牙
- D. 用冲牙器清除软垢
- E. 使用牙线

答案：B

2. 主要通过接触性传播的疾病是

- A. 风疹
- B. 疱疹
- C. 结核
- D. 水痘
- E. 麻疹

答案：B

3. 排在我国口腔癌之首的是

- A. 牙槽粘膜癌
- B. 颊粘膜癌
- C. 唇癌
- D. 牙龈癌
- E. 舌癌

答案：E

4. 复发性阿弗他溃疡常用的临床分型是

- A. 糜烂型、非糜烂型
- B. 轻型、重型、疱疹样型
- C. 均质型、非均质型
- D. 速发型、迟发型
- E. 假膜型、红斑型、萎缩型

答案：B

5. 弹性模量与牙本质接近的桩是

- A. 纤维桩
- B. 镍铬合金铸造桩
- C. 金合金铸造桩
- D. 氧化锆桩
- E. 预成钛合金桩

答案：A

6. 用于弯制磨牙卡环的钢丝直径是

- A. 0.9~1.0mm
- B. 1.3~1.5mm
- C. 0.6~0.8mm

金英杰教育

D.0.3~0.5mm

E.1.1~1.2mm

答案：A

(7~8 题共用题干)

男，8岁，左下后牙表面发黑就诊。一年前右下后牙因浅龋在口腔诊所接受过充填治疗。检查：左下6合面深窝沟，可以卡住探针，窝沟内有黑色沉着，质地硬，无软化，右下6合面银汞充填物完好，牙龈正常，叩诊（-），无松动，右上6合面深窝沟，可以插入探针，釉质脱矿呈白垩色。

7.左下6最适合的治疗措施是

A.银汞充填

B.树脂充填

C.观察随访

D.窝沟封闭

E.非创伤性修复

答案：D

8.右下6接受龋齿充填治疗属于龋病的

A.病因预防

B.一级预防

C.临床预防

D.三级预防

E.二级预防

答案：E

(9~11 题共用备选答案)

A.合支托.

B.连接体

C.间接固位体

D.基托

E.直接固位体

9.有防止义齿翘动、摆动、旋转、下沉作用的可摘局部义齿组成部分是

10.可摘局部义齿起主要固位作用的部分是

11.可摘局部义齿主要起支持作用，传导合力至基牙的是

答案：CEA

(12~14 题共用备选答案)

A.80%

B.20%~60%

C.10%~60%

D.17%

E.95%

12.慢性牙周炎约占牙周炎患者的比例是

13.侧支根管以根尖 1/3 处最多，占总牙数的比例是

金英杰教育

www.jinyingjie.com

14.根分叉区有副根管的比例是

答案：EDB

中等证据——螺旋体

种植体周围炎——菌斑

口腔修复前——冠延长术

下6近中接触区——颊 1/3~中 1/3

种植体成功标准——骨吸收小于 0.5

早起牙周炎——颌翼片

就位困难——人工牙无关

容易产生无基釉的冠修复体边缘形式——凹槽

印模材料精准度差的是--藻酸盐

桥体弯曲的变形量与桥体长度立方正比

牙体缺损的描述错误的是颜色的改变

溃疡的首选治疗是曲安奈德

粘结力的描述正确是接触面积大

附着龈的宽度正确是龈沟底到膜龈联合

牙体缺损固位力不包括吸附力