押题密卷一

第二单元

A1型题

1.答案：A

解析:1.经由“根尖孔一根管一冠部缺损”途径引流为急性根尖周脓肿时对患牙创伤最小的引流通道。

2.答案：D

解析:2.预防乙型肝炎最有效的措施是接种乙肝疫苗。故本题选D。

3.答案：B

解析:3.医患关系中，医生处于主导地位，社会和人们对医生的道德要求比较高，因此道德关系既是双向的、平等的，医生的道德修养又是起主导作用的。故本题答案是B。

4.答案：C

解析:4.心理学家研究心理健康与否常常从以下几个方面观察。心病理学角度：例如出现幻觉、妄想等症状，也可认定有心理异常存在。①统计学角度：许多在变态心理学看来属于异常的现象，在正常人身上也会或多或少地有所表现，与心理异常患者之间的差别只是程度上差异而已。②“文化学”角度：人总是在一定的社会文化环境中生活。因此，可以从人的心理和行为是否符合其生活环境提《夏威夷宣言》，是专门针对精神科医生的道德标准。故本出的要求，是否符合社会行为规范、道德准则等方面来题答案是C。专著在医学伦理学是常考点，所以要记住每判断一部伦理学文献的意义以避错。

5.答案：E

解析:5.核酸中磷（P）含量较多而且比较恒定，所以核酸的一种定量方法是测磷。而蛋白质中含量恒定的是氮元素，故本题答案是E。注意“恒定”两字为解题关键。

6.答案：C

解析:6.糖酵解途径关键酶有：己糖激酶、磷酸果糖激酶-1和丙酮酸激酶。中间都含有“激”。故本题答案是C。

7.答案：C

解析:7.提供一碳单位的氨基酸是：丝氨酸、甘氨酸、色氨酸和组氨酸。一碳单位的载体（辅酶）是四氢叶酸，主要作为体内合成嘌呤及嘧啶的原料。

8.答案：D

解析:8.棘细胞增生是一种黏膜的病理变化，但不属于常增生的表现。其他选项均为上皮异常增生的表现。故答案应选D。

9.答案：C

解析:9.乳牙的发育分别在胚胎期和婴儿期，胎盘对氟可形成屏障保护作用，一般不发生氟牙症。

10.答案：B

解析:10.A选项肯定不是深龋的临床表现，因为中龋时，患者已有食酸、甜食物痛的主诉，深龋时患者不仅食酸甜食物痛，而且有冷热食痛的主诉;C选项意味着患牙有自发痛，已非深龋的临床表现，而是牙髓炎的临床表现;D、E选项均不是深龋的临床表现，临床诊断为深龋，则意味着患牙牙髓尚未累及，因此牙髓的温度测验和电活力测验结果均应为正常的反应。

11.答案：C

解析:11.牙菌斑中的致龋菌有不同于其他非致龋菌的一些特性。致龋菌可产生糖基转移酶，以蔗糖为底物合成胞外多糖，主要是葡聚糖（C对），它能加速菌斑的形成。

12.答案：B

解析:12.血链球菌：是最早在牙面定居的细菌之一（D错）。轻链球菌：是牙菌斑中最常分离到的细菌（B对）。乳杆菌是口腔正常的菌群，多数学者认为，乳杆菌不是龋齿发生的初始致病菌，但参与龋病的发展（A错）。变异链球菌的终产物是有机酸（C

错）。放线菌合成的多糖仅有低度致龋性（E错）。

13.答案：C

解析:13.牙菌斑生物膜是口腔中不能被水冲去或漱掉的细菌性斑块（E错）。牙菌斑生物膜的形成可分为三个基本阶段：①获得性薄膜形成;②细菌黏附和共聚;③菌斑成熟（C对）。一般12小时的菌斑便可被菌斑显示剂着色（D错），早期菌斑增长较快，成熟时则较慢，9天后便形成各种细菌的复杂生态群体，约10-30天的菌斑成熟达高峰（A错）。邻近水性通道的细菌为需氧生存（B错）。

14.答案：A

解析:14.非附着性菌斑主要为革兰阴性厌氧菌，如牙龈卟啉单胞菌、福赛坦氏菌（A对）和具核梭杆菌。与牙槽骨的快速破坏有关，与牙周炎的发生、发展关系密切。

15.答案：A

解析:15.根管治疗时有效进行根管清理以去除细菌感染病因，是根管治疗成功的首要前提之一。

16.答案：B

解析:16.叩诊及扪诊用于评价根尖周炎症状态，并非根尖囊肿的诊断依据。

17.答案：D

解析:17.复发性阿弗他溃疡治疗措施中，远期疗效最佳的是针对与发病有关的全身和局部因素治疗。针对病因进行有针对性的局部和全身治疗，可使远期疗效最大化。

18.答案：A

解析:18.免疫抑制剂环孢素可引起药物性牙龈肥大。故本题正确答案为A。

19.答案：B

解析:19.广泛型侵袭性牙周炎的临床特点为：①患者的发病年龄是在青春期至35岁之间;②病损呈弥漫型，累及大多数牙;③某些病例（但不是所有病例）以前有过青少年牙周炎病史;④有严重及快速的牙槽骨破坏，然后破坏过程自然停止或显著减慢;⑤在活动期牙龈有急性炎症并伴有龈缘区桑卷样增殖，静止期炎症消失;⑥菌斑的沉积量在各病例间相差悬殊;⑦多数患者具有嗜中性粒细胞及单核细胞的功能缺陷;⑧有时伴有全身症状，包括体重减轻，抑郁及全身不适;⑨一般患者对治疗如刮治和全身药物治疗有明显的疗效，但也有少数患者经任何治疗都效果不佳，病情迅速加重直至牙齿丧失。

20.答案：A

解析:20.青春期龈炎的发病与机体激素水平相关

21.答案：B

解析:21.龈袋超过3mm，可形成假性牙周袋，不是诊断牙周炎的决定指标。有无附着丧失是判断有无牙周炎的主要指征。

22.答案：E

解析:22.功能性间隙保持器要考虑乳磨牙缺失的部位与数目。

23.答案：B

解析:23.含氟涂料需定期使用，一般情况下一年2次即可达到有效的预防效果（B对）。而对易患龋人群，一年可用2～4次。

24.答案：E

解析:24.常用的菌斑染色剂有：2%碱性品红（E错，为正确答案）、2%～5%藻红、酒石黄、1.0%-2.5%孔雀绿、荧光素钠。化学性控制菌斑措施：①氯己定（A对）;②酚类化合物，酚类化合物又称香精油（D对）;③季铵化合物;④氟化亚锡（C对）;⑤三氯羟苯醚（B对）。

25.答案：B

解析:25.出生后，第一次需做口腔检查的时间是6个月，第一颗乳牙萌出。第一颗乳牙萌出后推荐进行第一次口腔检查。

26.答案：E

解析:26.社区四级水平牙周保健中复杂治疗的指征是牙周袋≥6mm。故本题答案是E。而A、B、C、D为干扰项。

27.答案：E

解析:27.使用含氟牙膏防龋，正确的是6岁以下的儿童使用含氟浓度低的牙膏。故本题答案是E。易误选A。

28.答案：A

解析:28.固位体的固位力：全冠＞部分冠＞嵌体。故本题答案是A。易误选B。

29.答案：A

解析:29.固定义齿修复时，一端基牙若有倾斜可设计一端为活动连接。故本题答案是A。易误选C。

30.答案：C

解析:30.下颌牙列根据牙周膜面积由大到小排列顺序正确的是67354。故本题答案是C。易误选E。

31.答案：D

解析:31.窝洞制备的外形设计，G.V.Black提出以下原则：①外形的范围根据龋坏的范围而定;②外形应作预防性扩展，但应尽量保留健康的牙体组织;③外形应保留紧邻病变区不易患龋的健康牙体，切削时，应尽量避让牙尖、牙嵴部位;④外形线的总体观，应为圆钝曲线，圆钝的转角具有减少应力集中的效果外形线应有一定长度和宽度，以便于材料的填充。

32.答案：E

解析:32.医患之间有时虽有信息往来，但是这些信息并未被对方理解，甚至造成双方误解。例如患者对医务人员经常使用的“行话”难以理解。如像“流脑”（流行性脑脊髓膜炎），“传单”（传染性单核细胞增多症），“腔梗”（腔隙性脑梗死）等缩略语令患者不知所云。当然，患者用土话、方言描述症状也常使医生困惑不解，以致无法在病历中用规范的文字记录，如“脑袋迷糊”（北方话，指头晕）等。对同一医学名词由于双方认识上的差异，可能产生不同的理解;医生书写病历字迹潦草，可能产生误解，甚至导致意外事故的发生。

33.答案：E

解析:33.智力发展的关键期在7岁前。故本题答案是E。

34.答案：D

解析:34.龈瓣的复位：在有些膜龈手术时，将半厚瓣作根向复位，甚至复位在牙槽嵴顶的根方。有时需将龈瓣作冠向复位或侧向复位等（A错）。缝合：①牙

间间断缝合:牙周病学是在牙齿邻间隙处将颊、舌侧龈乳头瓣直接拉拢缝合。适用于唇、舌两侧龈瓣的张力相等、高低一致时。有直接环行间断缝合和“8”字形间断缝合。间断缝合也可用于缝合龈瓣的纵行切口（E错）。②悬吊缝合：是利用术区的牙齿来悬吊固定龈瓣。适用于颊、舌两侧龈瓣高度不一致时，使每侧龈瓣分别在所复位的水平紧密地贴合于牙与骨面，不易发生松脱或过大张力。包括：单个牙的双乳头悬吊缝合、单侧和双侧连续悬吊缝合（D对）。③水平褥式缝合：适用于两牙之间有较大缝隙或龈乳头较宽时，为使龈瓣能更好地贴合骨面，可做水平褥式缝合（C错）。④锚式缝合：是将最后一个磨牙远中的龈瓣或缺牙隙处的龈瓣以锚样的方式固定在邻近的牙上。适用于最后一个磨牙远中楔形瓣的缝合，或与缺牙间隙相邻处的龈瓣闭合（B错）。

35.答案：B

解析:35.菌斑控制方法：（1）刷牙：①Bass法;②竖转动法;③电动牙刷刷牙。（2）邻面清洁措施：①牙线;②牙签;③牙间隙刷。（3）家用冲牙器的使用。

36.答案：A

解析:36.口腔流行病学即用流行病学的原则、基本原理和方法，研究人群中口腔疾病发生、发展和分布的规律（D对）及其影响因素，同时研究口腔健康及其影响因素（B对），为探讨口腔疾病的病因和流行因素（C对）、制订口腔保健计划、选择防治策略和评价服务效果打下良好基础（E对）。口腔流行病学不包括制定口腔疾病的诊疗常规（A错，为正确答案）。

37.答案：A

解析:37.剧列运动时，肌糖原酵解产生大量乳酸，部分乳酸由尿排出，大部分乳酸经血液运送至肝，通过糖异生作用生成肝糖原和葡萄糖。故本题选A。

38.答案：E

解析:38.注意细胞膜和线粒体膜都是有选择性的。乙酰CoA在线粒体产生，但不能直接进入胞液，要通过柠檬酸转运（即通过柠檬酸－丙酮酸循环）进入胞液，在胞液中的酶催化合成脂肪酸。故本题答案是

E。

39.答案：C

解析:39.苏氨酸和甲硫氨酸属于必需氨基酸。必需氨基酸包括赖氨酸、色氨酸、苯丙氨酸、甲硫氨酸、苏氨酸、亮氨酸、异亮氨酸和缬氨酸。故本题答案是C。

40.答案：A

解析:40.血糖可氧化供能，转变其他单糖，合成糖原，转变非必需氨基酸、脂肪等，但无合成糖皮质激素的去路。注意不是名字含“糖”的物质都来源于葡萄糖。故本题答案是A。

41.答案：B

解析:41.甘氨酸结构是对称的，无L型或D型之分。注意20种氨基酸中只有甘氨酸是对称的。故本题答案是B。而A、C、D、E为干扰项。20种氨基酸的特点、分类是常考点，应牢固掌握。

42.答案：D

解析:42.不属于无牙颌缓冲区的是远中颊角区，但远中颊角区处基托不能过度伸展。故本题答案是D。易误选A。

43.答案：A

解析:43.颞下颌关节紊乱病病因不明，主要表现是颞下颌关节区的疼痛，弹响和功能障碍。

44.答案：D

解析:44.对可摘局部义齿基牙设计的具体要求是，除外尽可能选用离缺牙区较远的牙做基牙，以保持义齿平衡。缺隙前后的天然牙所能发挥的支持力最强，一般应该选作基牙。故本题答案是D。首先注意本题问的是哪项“除外”，其次还要掌握其他四项正确的选项以便全面掌握本题的考点。

45.答案：E

解析:45.对全口义齿固位有利的口腔黏膜是黏膜厚度、弹性、湿润度适中。口腔黏膜的质地和湿润度直接影响全口义齿的固位，黏膜厚度应适宜，有一定的弹性和韧性，唾液应有一定的分泌量和黏稠度。黏膜过于肥厚松软，移动度大，不利于固位，反之黏膜过薄没有弹性，不利于基托与黏膜的贴合，唾液过稀过少会降低吸附力，而过多过稠，不能发挥界面作用力也会影响固位。故本题答案是E。易误选C。

46.答案：A

解析:46.，防止可摘局部义齿水平移动的方法中，错误的是排塑料牙。防止可摘局部义齿水平移动主要是减少侧向力，增加义齿稳定性。减小牙尖斜度可以减少侧向力;增加间接固位体可以增加义齿的稳定性，防止水平移动;卡体的卡抱作用可以增加义齿的稳定性;大连接体将两侧的鞍基相连，可以传递分散合力，提供支持，增加稳定性。故本题答案是A。易误选B。

47.答案：B

解析:47.非贵金属铸造全冠颈部肩台的宽度通常为0.5-0.8mm。故本题答案是B。数据要牢记。

48.答案：A

解析:48.与牙列缺失后的颌骨改变无关的是颌弓形态。患有系统性疾病的患者，如糖尿病、代谢性疾病、牙槽嵴吸收速度快，因牙周炎拔除患牙较因龋拔除患牙牙槽嵴吸收速度快;骨质疏松的牙槽骨吸收速度相对快;戴用不适合的义齿会加快剩余牙槽嵴的吸收。故本题答案是A。易误选C。

49.答案：E

解析:49.应从牙根断面的最高点楔入而非最低点。

50.答案：E

解析:50.局部使用止血药物不属于干槽症的治疗，前四项都是干槽症的治疗原则。

51.答案：A

解析:51.腭大孔阻滞麻醉主要麻醉的神经是腭前神经。腭中、后神经出自腭小孔，行翼腭窝麻醉时可被麻醉。前孔切牙孔阻滞麻醉主要麻醉鼻腭神经。麻醉上牙槽后神经经用上颌结节注射法。眶下孔阻滞麻醉可麻醉上牙槽前、中神经。故本题答案是A。易误选E

52.答案：D

解析:52.茎乳孔外损伤表现为面瘫;膝状神经节损伤表面电凝止血是随着电刀近些年的使用出现的，而外科基本止现为面瘫伴舌前2/3味觉改变＋唾液、泪腺分泌功能障碍＋听觉改变;核性损害表现为面瘫＋轻度感觉与分泌功能障碍;鼓索与镫骨肌神经之间损伤表现为面瘫伴舌前2/3味觉改变＋唾液分泌功能障碍;镫骨肌与膝状神经节之间损伤表现为面瘫伴舌前2/3味觉改变＋唾液分泌功能障碍＋听觉改变。故本题答案是D。

53.答案：E

解析:53.颞下颌关节内强直的常见病因是化脓性中耳炎和外伤。关节创伤是主要原因，受伤方式以颏部受力对冲关节最常见。关节感染是次要原因，局部感染多源自化脓性中耳炎，也可源自血原性感染。其他原因还见于产钳损伤，强直性脊柱炎、骨化性肌炎、类风湿关节炎等。故本题答案是E。易误选C。

54.答案：C

解析:54.手术中遇大面积静脉渗血时宜用温热盐水纱布除时的广泛渗血，可用温热盐水纱布压迫止血。对局限性出血又查不到明显出血点的疏松组织出血区可用荷包式缝合或多圈式缝扎压迫止血，如组织基底移动性差，不能缝合或缝合效果不佳时可转移邻近肌肉或其他组织覆盖，填塞加压止血。腔窦内出血及颈静脉破裂出血又不能缝扎时，可用碳仿纱条填塞压迫止血。电凝止血常用于浅表部位较广泛的小出血点。故本题答案是C。易误选E。

55.答案：C

解析:55.属于拔牙相对禁忌证的是急性智齿冠周炎伴咬肌间隙感染。血压低于180/100mmHg的单纯性高血压无其他并发症的一般可以拔牙。故本题答案是C。易误选E。

56.答案：A

解析:56.上颌第三磨牙拔除的适应证不包括埋伏无症状。上颌第三磨牙拔除术的适应证有：牙本身龋坏;与邻牙间有食物嵌塞;无对颌牙且下垂;部分萌出，反复发生冠周炎;咬颊或摩擦颊黏膜;有囊肿形成;妨碍下颌冠突运动;导致第二磨牙龋坏或疼痛;妨碍义齿的制作及戴入。故本题答案是A。易误选E。

57.答案：B

解析:57.治疗三叉神经痛的首选药是卡马西平。故本题答案是B。易误选E。

58.答案：D

解析:58.“贝尔”征是指患侧用力闭目时，眼球转向外上方。故本题答案是D。

59.答案：B

解析:59.应按临界瘤治疗原则进行，即在肿瘤外0.5cm左右处切除整个肿瘤，对于较大的下颌骨肿瘤可行颌骨方块切除，较大的颌骨肿瘤则应行颌骨整块切除，切除后之组织缺损可立即植骨修复。

60.答案：B

解析:60.根据流行病学调查和实验研究结果分析，唇腭裂的致病因素作用于妊娠前3个月。故本题答案是B。

61.答案：A

解析:61.当氟浓度增高时，可抑制碱性磷酸酶的活力，而造成牙釉质发育不良、矿化不全和骨质变脆等骨骼疾患。结果是柱间质矿化不良和釉柱的过度矿

化。故选A。

62.答案：E

解析:62.前期牙本质是指在成牙本质细胞和矿化牙本质之间的一层未矿化的牙本质。球间牙本质指牙本质钙化不良时，钙化球之间遗留未被钙化的间质，主要见于牙冠部近牙釉质牙本质界处。透明牙本质是指牙本质受到刺激以后，牙本质小管内的成牙本质细胞突起变性，变性后矿物盐沉着矿化封闭小管，管周的胶原纤维变性，此时小管和周围间质折光率没有差异，在磨片上呈透明状，称为透明牙本质。原发性牙本质是指在牙发育过程中形成的牙本质。

63.答案：D

解析:63.成牙本质细胞位于牙髓腔近牙本质侧，不存在于牙周膜中。故本题答案是D。

64.答案：A

解析:64.管间牙本质胶原纤维多，矿化程度低。构成牙本质小管壁的是管周牙本质，围绕牙本质细胞突起。

65.答案：B

解析:65.基底层和邻近的棘层细胞有增殖能力称生发层。故本题答案是B。

66.答案：C

解析:66.上颌尖牙髓腔最宽的部位在牙冠中1/3处。故本题答案是C。

67.答案：E

解析:67.翼内肌深头起于翼外板的内侧面和腭骨锥突。故本题答案是E。

68.答案：C

解析:68.上颌第一前磨牙的（牙合）面：外形为轮廓显著的六边形。颊侧宽于舌侧，远中边缘嵴长于近中边缘嵴。有颊舌二尖，颊尖长大锐利、舌尖短小圆钝。从颊尖顶斜向合面中央的嵴，称颊尖三角嵴。由舌尖顶斜向合中央的嵴，称舌尖三角嵴。中央凹下成窝，称中央窝。窝的四周有近、远中边缘嵴和颊舌尖的牙尖嵴围绕。在中夹窝内有近远中向的沟，称中央沟。由近中点隙向近中方向越过近中边缘嵴至近中面的沟，称近中沟。

69.答案：E

解析:69.常见远中舌侧根管的牙是下颌第一磨牙。故本题答案是E。A、B、C、D为干扰项。

70.答案：A

解析:70.面神经有神经管段和颅外段，神经管段在茎乳孔分支有岩浅大神经分布至泪腺，镫骨神经支配镫骨肌，鼓索分布于舌前2/3味蕾、舌下腺、颌下腺。故本题答案是A。

71.答案：E

解析:71.面神经出茎乳孔后，距皮肤表面2～3cm向前外，进入腮腺分5支。面神经从茎乳孔到开始分支这一段，称为面神经主干，长2cm，直径2.5mm。面神经主要分支：（1）颞支：布于额肌、眼轮匝肌、耳前肌和耳上肌，损伤后可出现同侧额纹消失。（2）颧支：支配眼轮匝肌、提上唇肌。颧支损伤后眼睑不能闭合。（3）颊支：支配口周围肌上组，颊支损伤可致鼻唇沟变浅或消失、鼓腮无力、上唇运动力减弱或偏斜以及食物积存于颊部。（4）下颌缘支：支配口周围肌下组，损伤可出现患侧口角下垂和流口水。（5）颈支：分布于颈阔肌。

72.答案：A

解析:72.局麻时出现暂时性面瘫，一般多见于口内法下牙槽神经阻滞麻醉。由于注射针刺入过深，偏向后内未能触及骨面，或偏上越过下颌切迹进入腮腺包膜，致麻药注入腮腺麻醉面神经而发生面瘫。也偶见于咀嚼肌神经阻滞麻醉注射过浅。故本题答案是A。易误选E。

73.答案：E

解析:73.与口腔颌面部感染发生有关的主要因素是机体抵抗力和细菌的种类及数量。故本题答案是E。易误选C。

74.答案：C

解析:74.问诊的内容应包括主诉、现病史、既往史、家族史。故本题答案是C。易误选E。

75.答案：D

解析:75.吸入性窒息主要见于颌面部创伤伴昏迷。故本题答案是D。

76.答案：B

解析:76.鳃裂囊肿多发生于第二鳃裂。鳃裂囊肿（颈淋巴上皮囊肿）：（1）发生部位：常位于颈外侧胸锁乳突肌前缘。发生于下颌角以上，腮腺区者为第一鳃裂来源;发生于肩胛舌骨肌水平以上者为第二鳃裂来源;发生于颈根部者为第三、（2）临床表现：往往

在青春期出现肿块。肿块边界清楚，可活动，有波动感。一般患者无明显自觉症状。囊肿可因多次穿刺而致感染，或因切开而形成瘘管。（3）病理改变：囊壁内衬复层鳞状上皮或假复层柱状上皮;结缔组织囊壁中有大量淋巴样组织，可形成淋巴滤泡。（4）组织发生：传统认为此囊肿是由发育期间鳃弓及咽囊的上皮剩余而来，但另一种观点认为该囊肿由胚胎期间陷入颈部淋巴结中的涎腺上皮发生增殖及囊性变而来。故本题答案是B。易误选E。

77.答案：C

解析:77.有产气性细菌存在的证据是捻发音。故本题答案是C。易误选E。

78.答案：D

解析:78.口腔癌早期发生颈淋巴转移及转移率最高的是舌癌。故本题答案是D。

79.答案：B

解析:79.任何儿童期都可发生儿童复发性腮腺炎，但以5岁左右最常见。

80.答案：C

解析:80.固定义齿修复与否主要根据基牙牙周储备力。牙槽嵴吸收程度是牙周储备力的影响因素。故本题答案是C。

81.答案：A

解析:81.义齿的基托不可以进入倒凹区，否则会导致摘戴困难。故本题答案是A。易误选B。

82.答案：B

解析:82.对活髓牙牙体缺损修复治疗的首要原则是保存与保护牙体牙髓组织。故本题答案是B。易误选E。

83.答案：E

解析:83.颞下颌关节弹响的检查：弹响在下颌运动的什么阶段发生，弹响声音的性质以及有无疼痛等（A错）。外耳道前壁检查：用手指触诊外耳道前壁，嘱患者做正中咬合，检查上、下颌牙列紧咬时双侧髁突对外耳道前壁的冲击强度是否一致（E对），可验证正中关系。下颌运动检查：主要指开口度、开口型以及下颌前伸或侧向运动的检查（B错）。

84.答案：D

解析:84.确定前伸髁导斜度：Christensen发现，真牙列者当前伸髁道斜度呈正数、下颌前伸至前牙切端相对时，上下颌后牙（牙合）面之间出现一前小后大的模形间隙。利用上下（牙合）托可取得前伸颌位记录。克里斯坦森现象出现在后牙区，呈前小后大的间隙（D错，为正确答案）。

85.答案：E

解析:85.刷牙的初始2分钟内能去除菌斑80%左右。

86.答案：A

解析:86.原发性疱疹性口炎为单纯疱疹病毒感染所致，本病6岁以下儿童多见，尤其是6个月至2岁婴幼儿更多。原因是婴儿出生后可被母体被动免疫，其抗单纯疱疹病毒抗体在6个月后消失，2岁前不会出现明显的抗体效果。

87.答案：D

解析:87.萎缩性舌炎病因：①贫血（D对）;②烟酸、维生素B2缺乏;③干燥综合征;④念珠菌感染;⑤其他疾病;⑥部分患者找不到明确的病因。

88.答案：B

解析:88.思维是人脑对客观现实概括的、间接的反映，是认识的高级形式。认知过程是指人们获得知识或应用知识的过程，是对客观世界的认识和察觉。因此思维是属于心理活动的认知过程。

89.答案：B

解析:89.消化性溃疡属于心身疾病。故本题答案是B。

90.答案：E

解析:90.某食堂发生有死亡病例的食物中毒、某核电站发生核泄漏、某城市发生甲肝暴发流行、某研究所发生烈性传染病菌株丢失都属于突发公共卫生事件;某城市严重大气污染造成居民肺癌死亡率上升属于公共卫生事件，但不属于突发公共卫生事件。故本题选E。

91.答案：B

解析:91.患者全口牙从小就有散在的黄褐色及白垩状斑且同村居民也有类似表现，故应诊断为氟斑牙。病损探硬，无实质性缺损，表明不是龋病;题中未提供四环素牙和牙釉质发育不全症的诊断依据。

92.答案：E

解析:92.患牙髓炎时如果牙髓已有化脓，患牙可表现为所谓的“热痛冷缓解”。根尖炎疼痛范围局限，不引起放散痛。

93.答案：E

解析:93.近远中走向的隐裂牙极易发生完全劈裂，根管治疗后应尽快做全冠修复，防止牙齿劈裂。其他治疗均不可能达此目的。

94.答案：B

解析:94.没有意愿的采用SR动机访谈;已经决定戒烟的应该提供戒烟方法咨询，必要时推荐戒烟药物。

95.答案：B

解析:95.应激后出现肢体活动障碍，此为典型的分离（转换）性障碍。首选暗示疗法。故本题选B。

96.答案：E

解析:96.患者角色行为缺如是指病人未能进入病人角色，不承认自己是病人，虽然医生已做出疾病的诊断，但病人尚未意识到自己患病或不愿承认自己是病人。

97.答案：A

解析:97.多年来不能感知自己内心的感受，更不知如何向其他人包括自己的家人讲述自己内心的感受，从而来寻求帮助。心理治疗师首选的方法为人本主义。人本主义治疗可以帮助个体对自己有直接、充分的体验，并接纳自己、相信自己的情感，使个体变得和谐一致。故本题答案是A。

98.答案：D

解析:98.患牙冠折，牙本质暴露，未露髓，牙根不松动，可先行光固化修复，以后再定时复查，以判明牙髓的活力，牙齿的永久修复都应在受伤后的6～8周进行。

99.答案：B

解析:99.一型观测线：在基牙的近缺隙侧距（牙合）面远，远缺隙侧距（牙合）面近，即近缺隙侧的倒凹区小，远缺隙侧的倒凹区大。二型观测线：在基牙的近缺隙侧距（牙合）面近，远缺隙侧距（牙合）面远，即近缺隙侧的倒凹区大，远缺隙侧的倒凹区小。三型观测线：在近缺隙侧和远缺隙侧距（牙合）面都近，倒凹区都较大，非倒凹区小。缺隙远中基牙颊侧为二型观测线，即近缺隙侧的倒凹区大，远缺隙侧的倒凹区小，如调整为一型观测线，应向后倾斜（B对）。

100.答案：C

解析:100.间接固位体的作用，主要是防止翘起、摆动、旋转、下沉等不稳定，所以应加间接固位体。故本题答案是C。易误选D。

101.答案：A

解析:101.摘戴困难，且感牙痛，因而引起左上5疼痛的原因是卡环过紧，咬合高一般不会导致基牙疼痛。故本题答案是A。

102.答案：C

解析:102.活髓牙应该选对牙髓刺激小的粘固剂，玻璃离子粘固剂相对刺激性小，氧化锌丁香油对牙髓刺激小但是不能作为永久粘固剂。

103.答案：A

解析:103.神经如已受损，术后应给予预防水肿、减压及促神经恢复的药物或理疗等（B对）。针刺疗法桉循经穴与神经分布的解剖位置相结合的原则，选择邻近神经于的穴表层皮片包括表皮层和很薄的一层真皮最上层的乳突层。针灸以患者有强烈针感为宜（C对）。理疗可用维生素Bl或维生素B12和利多卡因用离子导入法，将药物导入疼痛部位，或采用穴位导入法均可获得一定疗效（D、E对）。拔牙窝搔刮与神经受损的治疗无关（A错，为正确答案）。

104.答案：E

解析:104.过敏反应多表现为突然惊厥、昏迷、呼吸心跳骤停等;晕厥多表现为头晕、胸闷、面色苍白、全身发冷、脉快而弱、恶心、血压下降、短暂意识丧

失等;癔症表现可类似过敏或晕厥，易受暗示，发作时无阳性体征;中毒反应有兴奋型和抑制型;肾上腺素反应表现为头晕、头痛、口唇苍白、血压升高、脉搏快而有力。故本题答案是E。易误选C。

105.答案：D

解析:105.诊断为血管型牙龈瘤，正确的治疗方法是拔除受累牙，切除肿瘤和受累牙周膜，仅切除肿物易复发。故本题答案是D。易误选B。

106.答案：A

解析:106.右下颌智齿冠周炎，已行抗感染治疗3天。检查见开口度正常，智齿正位，远中龈瓣覆盖部分牙面，上颌智齿正位萌出。感染消除后上、下颌智齿正位，此时暂不需拔除，故该患者的最佳处理方法是远中龈瓣切除。故本题答案是A。易误选C。

107.答案：B

解析:107.该病例的诊断是右翼外肌痉挛。翼外肌功能亢进造成的是过度开口，盘后区受损会造成疼痛开口受限，但开口不偏斜，可复性盘移位可以有关节弹

响，髁突骨质破坏一般有骨摩擦音，开口不偏斜。故本题答案是B。易误选E。

108.答案：E

解析:108.左上颈部肿物1年，有反复消长史，感冒时易增大，触诊囊性感明显，穿刺液为透明、淡黄色水样清亮液体。该患者最有可能的诊断为囊性水瘤。肿物有反复消长史以及感冒时易增大，推测其淋巴来源可能性大;穿刺液为透明、淡黄色“水样”清亮液体，与囊性水瘤更为符合;如果进一步对穿刺液镜检发现淋巴细胞则可确诊。故本题答案是E。

109.答案：A

解析:109.右下颌角骨折。检查发现右下8位于骨折线上，根尖暴露，无移位，不松动，有对（牙合）牙，无龋。在骨折固定过程中，该牙必须拔除，预防颌骨骨髓炎。故本题答案是A。易误选D。

110.答案：B

解析:110.左腮腺区切割伤，创口已缝合3周，但仍未愈，有较大量清亮液体流出，进食时明显。该患者发

生了涎瘘。故本题答案是B。易误选E。

111.答案：D

解析:111.幼儿期发生的颞下颌关节强直患者，若睡眠中出现呼吸不畅或打呼，可能发生了阻塞性睡眠呼吸暂停综合征。故本题答案是D。

112.答案：B

解析:112.造成患者不适的主要原因是垂直距离过高。据表现可以判断全口义齿的垂直距离高，上下牙前突，但是造成患者不适的主要原因还是垂直距离过高，咀嚼困难疲劳。故本题答案是B。易误选D。

113.答案：D

解析:113.Fieiss规定Kappa值的大小与可靠度的关系为：0.40以下可靠度不合格;0.41～0.60可靠度中等;0.61～0.80可靠度优（D对）;0.81～1.0完全可靠。

114.答案：E

解析:114.龋均=龋、失、补牙之和/受检人数（C错）。龋面均=龋、失、补牙面之和/受检人数。故本题中龋面均=（210+10+15）÷50=4.7（E对）。

115.答案：E

解析:115.多数婴儿在7～8个月乳牙萌出，12个月仍未萌出者为出牙迟缓，2～2.5岁出齐，全副乳牙共20个。该8个月患儿上前牙未萌出，应继续观察。

116.答案：D

解析:116.可能是环境改变造成。系统脱敏对于恐惧症有很好的效果。故本题答案是D。易误选C。

117.答案：A

解析:117.厌恶疗法是将令患者厌恶的刺激与对患者有吸引力的不良刺激相结合形成条件反射。患常用的厌恶刺激有电击法、橡皮筋法、氨水法、阿扑吗啡法、厌恶想象法等。

118.答案：B

解析:118.对照是实验控制的手段之一，目的在于消除无关变量对实验结果的影响，增强实验结果的可信度。

119.答案：D

解析:119.皑皑白雪，在晚霞的映照下显现出一片红色，但人们仍然对霄地知觉为白色，这是因为人的知觉具有恒常性。知觉条件在一定范围内变化时，知觉仍保持相对不变，属于知觉的恒常性特征。故本题答案是D。易误选C。

120.答案：D

解析:120.持续性自发性钝痛并有牙龈出血，最可能的原因是充填时接触点恢复不良。因为接触点恢复不良导致长期食物嵌塞，以至造成急性龈乳头炎。

A3型题

121.答案：DEB

解析:121～123.肢体外伤史与本病的诊断、鉴别诊断

及治疗计划关系不大。本例应着重检查牙列的牙周健康状况，不包括牙齿颜色检查。牙周基础治疗是所有牙周治疗的基础，目的是消除致病因素，使炎症减轻到最低程度，并为下一阶段的治疗，如牙周手术治疗/修复治疗/正畸治疗等做准备。

122.答案：CCC

解析:124～126.85为深龋，应该先间接盖髓再充填。该患儿乳牙龋齿较多，第一恒磨牙窝沟深，仅观察和涂氟化钠是不合适的，应进行窝沟封闭防龋。腐质没有去尽时牙髓暴露说明已经是牙髓炎，乳牙牙髓已经感染不能采用直接盖髓术，6岁孩子的第二乳磨牙牙根处于稳定期可以进行根管治疗。

123.答案：EAB

解析:127～129.翼下颌间隙感染时翼下颌皱襞处黏膜水肿，下颌支后缘稍内侧轻度肿胀、压痛;咬肌间隙感染时以下颌支及下颌角为中心的咬肌区肿胀、变硬、压痛，伴有明显开口受限。冠周炎急性感染期应消炎、镇痛、增强抵抗力等为主，局部主要使用3%过氧化氢或生理盐水、高锰酸钾液等反复冲洗龈袋。翼下颌间隙感染口外切口为分离暴露下颌角下缘时，

在其内侧切开部分翼内肌附着及骨膜，口内切口为下颌支前缘稍内侧纵行切开2～3cm。

124.答案：ADB

解析:130～132.设计错误，右下37周储备力不足，右下456（牙合）力过大是导致失败的原因。过于松动的基牙应当拨除，但是对于松动度不大，牙周状况尚可的基牙应尽量保留。

125.答案：EDE

解析:133～135.膨胀性生长可使下牙槽神经管移位，但不出现麻木感。角化囊肿沿下颌骨长轴生长，X线为边界清楚，有皮质白线的透光影。良性肿物，手术刮除即可。但易复发，常以苯酚烧灼骨创。

B1型题

126.答案：AD

解析:136～137.患者道德权利有：基本的医疗权、知情同意权和知情选择权、保护隐私权、获得休息和免除社会责任的权利;人体实验受试者的基本权利有知

情同意、维护受伤者的利益，故从本题给提供的选项中可以看到属于患者和受伤者医德权利的是A选项。医务人员的医德修养的途径和方法主要有坚持医疗卫生保健实践、坚持自觉和不断地学习医德理论知识、有的放矢、持之以恒、追求慎独，所以从上述提供的选项看属于医务人员医德修养的途径和方法的是D选项。

127.答案：AD

解析:138～139.深龋应该选氢氧化钙制剂护髓后进行充填。后牙不追求美观性，而且玻璃离子水门汀可以释放氟，有预防龋齿的作用，因此选玻璃离子水门汀充填龋洞。

128.答案：CEB

解析:139～141.牙囊形成牙骨质、牙周膜、牙槽骨;牙乳头形成牙本质和牙髓;成釉器形成釉质。

129.答案：BAAC

解析:142～145.急性牙髓炎可出现特征性的放射性痛。牙周炎时，患牙牙周支持组织破坏可出现咬合不

适。急性根尖周炎时，根尖周炎症致咬合疼痛。慢性牙髓炎可有长期的隐痛不适，伴温度刺激痛。

130.答案：BE

解析:146～147.轻推外观正常的皮肤，可迅速形成水疱或使原有的水疱在皮肤上移动，称为天疱疮病变时的尼氏征。口腔扁平苔藓皮损上可见微高出皮面的扁平丘疹，形成白色网状条纹，称为Wickham纹。

131.答案：CDE

解析:148～150.慢性根尖周脓肿X线片的影像特点是根尖周骨质较疏松，呈云雾状，透射区边界不清；根尖周囊肿X线片的影像特点是根尖周透射区边界清，有致密骨白线围绕；根尖周致密性骨炎X线片的影像特点是根尖部局限性致密阻射影像，无透射区。

上一节解析 下一节解析