

真题：

1.急性坏死性溃疡性龈炎的主要致病菌是

- A.黏性放线菌和牙龈二氧化碳嗜纤维菌
- B.金黄色葡萄球菌和链球菌
- C.梭形杆菌和奋森螺旋体
- D.牙龈卟啉单胞菌和放线共生放线杆菌
- E.变性链球菌和嗜酸乳杆菌

【答案】 C

2 人的头部上唯一一块能活动的骨是（ ）

- A . 脑颅骨
- B . 面颅骨
- C . 上颌骨
- D . 下颌骨

【答案】 D

命中题

1.患儿，3岁半，因牙列不齐前来就诊，这一年龄阶段正常的特征有

- A.牙排列紧密无间隙，切缘及面有显著磨耗
- B.牙排列紧密无间隙，上下颌第二乳磨牙的远中面彼此相齐
- C.牙排列不紧密前牙有间隙，上下颌第二乳磨牙的远中面彼此相齐
- D.牙排列不紧密，前牙有间隙，下颌第二乳磨牙移至上颌第二乳磨牙的牙前方

E.牙排列由紧密到牙间隙逐渐形成

【答案】 B

【解析】 2.5~4岁的特征：牙排列紧密无明显缝隙，切缘及面尚无显著磨耗；乳牙位置较正，没有明显的近远中向或唇舌向的倾斜；覆较深，覆盖较小，曲线不明显；上下颌第二乳磨牙的远中面彼此平齐，成一垂直平面称为齐平末端。

2.男，10岁，因前牙排列不齐，有间隙来医院检查。发现口内乳牙和恒牙都存在对于错。关系的判断，哪个不是暂时性错

- A.恒侧切牙向侧方倾斜
- B.中切牙间存在间隙
- C.上下第一恒磨牙出现偏远中关系
- D.下颌前牙位于上颌前牙的唇侧
- E.上前牙拥挤

【答案】 D

【解析】 考点替牙特征：上唇系带位置过低；中切牙间间隙；上中切牙侧切牙牙冠偏远中；暂时性前牙拥挤；暂时性远中；暂时性深覆。

3.关于不完全抗原（半抗原）描述正确的是

- A.有免疫原性
- B.有免疫反应性
- C.是蛋白质大分子

D.与抗原决定簇无关

E.与载体的含义相似

【答案】 B

4.不属于隐蔽抗原的组织成分的是

A.脑组织

B.晶状体蛋白

C.精子

D.甲状腺球蛋白

E.关节滑膜

【答案】 E

5.下列有关朗格汉斯细胞的描述哪项是错误的()

A. 有处理抗原能力

B. 能分化为成熟的树枝状细胞

C. 具有抗原呈递能力

D. 分布于基底层

【答案】 D

6.牙周炎的组织破坏特点:

A、 持续性破坏

B、 长时间静止、短时间破坏

- C、 长时间破坏、短时间静止
- D、 进行性破坏
- E、 渐进性破坏

答案： B

7 患儿 8 岁，右下第一恒磨牙深龋，去除大块腐质，近髓处留少许软化牙本质，上方用氢氧化钙盖髓后充填。二次去腐质应在什么时间复诊

- A.1~2 周
- B.3~4 周
- C.6~8 周
- D.10~12 周
- E.15 周

答案： D

8. 解剖牙冠是指

- A.牙体暴露于口腔的部分
- B.牙体被牙釉质包被的部分
- C.牙体被牙骨质包被的部分
- D.牙本质分布的部分
- E.牙尖与窝沟分布的部分

【答案】 B

9 妊娠期龈炎的直接病因是

- A. 妊娠
- B. 牙石
- C. 不良卫生习惯
- D. 牙菌斑
- E. 不良修复体

**参考答案：** D

**参考解析：** [解析] 妊娠期龈炎的最根本的病因是牙菌斑，而不是牙石、不良修复体、不良卫生习惯和妊娠等促进因素，只是妊娠时性激素水平的变化，导致牙龈对局部刺激的反应加强。因此本题的正确答案为 D

**10 下列哪项属于食物中毒 ( )**

- A. 伤寒
- B. 暴饮暴食引起的急性胃肠炎
- C. 寄生虫病
- D. 误食亚硝酸盐
- E. 水俣病

**【答案】** D

**11.有关新冠肺炎疑似患者解除隔离标准，下列哪项是正确的 ( )**

- A、连续两次呼吸道病原核酸检测阴性(采样时间间隔至少 1 天)
- B、连续三次呼吸道病原核酸检测阴性(采样时间间隔至少 1 天)
- C、连续两次呼吸道病原核酸检测阴性(采样时间间隔至少 12h)

D、连续三次呼吸道病原核酸检测阴性(采样时间间隔至少 12h)

12 关于新冠肺炎的治疗，以下哪项表述不正确()。

A、建议联合使用广谱抗生素

B、不建议同时应用 3 种或以上抗病毒药物

C、对于双肺广泛病变者及重型患者，且实验室检测 IL-6 水平升高者，可试用托珠单抗治疗

D、对于氧合指标进行性恶化、影像学进展迅速、机体炎症反应过度激活状态的患者，酌情短期内(3-5 天)使用糖皮质激素