

2022 年护士模拟卷
专业实务

- 1.用于预防肠扭转最关键的措施是不能
 - A.饭后剧烈运动
 - B.腹部受凉
 - C.少量多餐
 - D.刺激性饮食
 - E.低脂饮食
- 2.做内生肌酐清除率检查，实验前三天的饮食是
 - A.高热量饮食
 - B.高蛋白饮食
 - C.无肌酐饮食
 - D.多纤维素饮食
 - E.正常饮食
- 3.中医学中关于疾病的基本病机正确的描述是
 - A.五行失调
 - B.脏腑虚损
 - C.大淫侵袭
 - D.阴阳失调
 - E.正邪失衡
- 4.指导腰椎间盘突出的人在术后进行直腿抬高试验的目的是
 - A.防止足部肌肉萎缩
 - B.防止深静脉血栓
 - C.促进血液循环
 - D.防止神经根粘连
 - E.防止伤口感染
- 5.长期应用可抑制小儿骨骼生长的药物是
 - A.吡拉西坦
 - B.泼尼松
 - C.胰岛素
 - D.地西洋
 - E.氨苄西林
- 6.遇到灾难事故，护理人员主动提出到救灾第一线去工作。这体现了护理人员
 - A.良好的科学文化素质
 - B.扎实的专业理论知识
 - C.规范的实践操作能力
 - D.崇高的职业道德素质
 - E.具备批判性思维能力
- 7.用于治疗轻、中型溃疡性结肠炎的首选药是
 - A.糖皮质激素
 - B.柳氮磺吡啶
 - C.免疫抑制药
 - D.止泻药
 - E.氯霉素

8. 营养不良的患儿皮下脂肪最先减少的部位是
- A. 面部
 - B. 腹部
 - C. 胸部
 - D. 四肢
 - E. 臀部
9. 意识丧失病人的卧位常为
- A. 自动体位
 - B. 被动体位
 - C. 患侧卧位
 - D. 端坐位
 - E. 仰卧位
10. 以下关于皮内注射方法的叙述，正确的是
- A. 拔针后不按压
 - B. 用稀碘酊消毒皮肤
 - C. 与皮肤呈 15° 角进针
 - D. 进针后抽回血
 - E. 推药液于真皮下
11. 胰液进入十二指肠后，最先被肠激酶激活的是
- A. 胰蛋白酶原
 - B. RNA 酶
 - C. 羧基肽酶原
 - D. 糜蛋白酶原
 - E. 胰脂肪酶
12. 胰腺老化的表现不包括
- A. 胰岛细胞变性
 - B. 胰酶的数量下降
 - C. 胰岛素分泌相对增加
 - D. 胰液分泌减少
 - E. 胰酶活性降低
13. 医用滑石粉灭菌可采用的灭菌方法是
- A. 压力蒸汽灭菌
 - B. 煮沸消毒法
 - C. 燃烧法
 - D. 干烤法
 - E. 电离辐射灭菌法
14. 一名 6 个月婴儿，喂面条后发生腹泻 2 天，稀水样便 5~6 次/天，量中等，偶吐奶，尿量略减少，前及眼窝稍凹陷。下列哪项措施不妥
- A. 口服抗生素
 - B. 暂停辅食
 - C. 继续喂母乳
 - D. 加强臀部护理
 - E. 给予口服补液盐

15.胸外伤后，出现胸壁软化，是因为

- A.单根肋骨单处骨折
- B.相邻多根肋骨多处骨折
- C.单根肋骨多处骨折
- D.多根肋骨单处骨折
- E.胸骨骨折

16.新生儿家庭访视内容不包括

- A.新生儿预防接种
- B.询问新生儿出生状况
- C.观察新生儿一般状况
- D.新生儿体检合格
- E.指导喂养及日常护理


17.小儿扁桃体炎的好发年龄为（）

- A.新生儿
- B.1岁
- C.1~3岁
- D.4~10岁
- E.14~15岁

18.小儿，1岁7个月。乳牙数目估计有

- A.月龄减2
- B.月龄减4~6
- C.月龄减3~4
- D.月龄减10
- E.月龄减7~8

19.下图为门静脉高压症常用手术术式之一，该术式术后易发生



- A.呕吐
- B.黄疸
- C.吻合口出血
- D.肝性脑病
- E.下肢水肿

20.下列食物中属于痛风患者可以选择食用的是

- A.鸡肝
- B.黄豆
- C.海鲜类
- D.牛奶
- E.牛肉汤

21.为昏迷患者护理口腔，防止误吸的措施是

- A.使用开口器时从白齿放入

- B.血管钳夹紧棉球，并挤出多蘸的液体
C.从外向里擦净口腔及牙齿的各面
D.取下的活动性假牙浸泡在冷开水中
E.长期应用抗生素的患者，注意口腔黏膜有无真菌感染
- 22.晚期肝硬化患者最可能并发
A.自发性腹膜炎
B.肝肺综合征
C.上消化道出血
D.门静脉血栓形成
E.原发性肝癌
- 23.糖尿病专科护士向病区的糖尿病患者做健康宣教时，告诉患者，糖尿病患者常合并眼部疾病及肾脏病变，原因是
A.小动脉病变
B.主动脉病变
C.微血管病变
D.小血管病变
E.深动脉病变
- 24.使用约束带的患者应重点观察
A.体位是否舒适
B.局部皮肤颜色及温度
C.约束带是否松开
D.衬垫是否垫好
E.意识是否清楚
- 25.深静脉血栓形成的患者，抗凝治疗期间最严重的并发症是（）
A.出血
B.继发性感染
C.动脉痉挛
D.血栓与静脉壁粘连并逐渐退化
E.形成再通静脉
- 26.社区获得性肺炎最常见的病原菌是
A.立克次体
B.金黄色葡萄球菌
C.溶血性链球菌
D.衣原体
E.肺炎链球菌
- 27.三叉神经痛治疗的首选药物是
A.布洛芬
B.地西洋
C.卡马西平
D.吗啡
E.阿司匹林
- 28.妊娠期高血压疾病重度子痫前期的临床表现不包括
A.出现持续性头痛
B.血压 $\geq 140/90$ mmHg

C.血小板 $<100 \times 10^9/L$

D.尿蛋白(+++)

E.视觉障碍

29.妊娠合并心脏病孕妇，心功能III级，行剖宫产术。术后安全返回病房，子宫收缩好，血压正常，护士对该产妇的护理措施中正确的是()

A.清淡饮食，防止便秘

B.尽早协助哺乳，促进子宫收缩

C.不宜再妊，产后36h后行绝育术

D.产后3天按医嘱应用抗生素

E.产后24h严密观察生命体征，每4h一次

30.人体精神活动的主要物质基础是

A.精

B.血

C.气

D.液

E.津

31.人工肛门的护理方法正确的是

A.禁忌扩张造口

B.定时灌肠，训练排便习惯

C.造口袋内排泄物超过34时应更换造口袋

D.肛门袋宜长期使用，少更换

E.局部皮肤保持湿润

32.浅昏迷与深昏迷的区别是

A.有无自主运动

B.有无大小便失禁

C.对声、光的反应

D.是否能被唤醒

E.角膜反射、瞳孔对光反射及防御反射是否存在

33.女性各阶段的生理特点正确的是

A.儿童后期卵巢内的卵泡有一定发育，但并不分泌性激素

B.青春期是卵巢生殖内分泌功能最旺的时期

C.月经初潮标志生殖器官发育成熟

D.围绝经期一般历时半年

E.绝经过渡期的突出表现为卵巢功能逐渐衰退

34.某孕妇，30岁，既往体健，近2年来发现HBs-Ag阳性，但无任何症状，肝功能正常。经过十月怀胎，足月顺利分娩4300g女婴，为阻断母婴传播，对此新生儿最适宜的预防方法是注射()

A.乙肝疫苗

B.丙种球蛋白

C.高效价乙肝免疫球蛋白

D.乙肝疫苗+丙种球蛋白

E.乙肝疫苗+高效价乙肝免疫球蛋白

35.某孕妇，23岁。妊娠33周，近10天来自感头痛，头晕。突然头痛加重，眼花、恶心、呕吐，急送医院。查体示血压170/105mmHg尿蛋白(++)，水肿(+++)。入院后1小时，该孕妇腹痛伴大量阴道出血。最有可能的情况是

- A.自然临产
- B. DIC
- C.前置胎盘
- D.先兆子宫破裂
- E.胎盘早剥

36.某女性，28岁，月经周期为30天，上月月经是4月18日，护士为其计算的排卵日期大约在5月

- A.1日
- B.4日
- C.9日
- D.12日
- E.14日

37.某女士，口服避孕药物进行避孕已2年，因工作忙，当晚漏服，询问指导，应告知补服时间为()

- A.3h内
- B.6h内
- C.9h内
- D.12h内
- E.24h内

38.某护士申请外出学习，是行使《护士条例》中的

- A.依法获得培训进修的原则
- B.依法获得卫生防护的权利
- C.依法自由选择的权利
- D.依法获得危险工作津贴的原则
- E.依法获得福利待遇的原则

39.某产妇，30岁，骨盆外测量显示:入口前后径9.5cm，对角径11cm，其他无异常。孕39周时胎心正常，行缩宫素静脉滴注试产。护士发现产妇在试产过程中很焦虑，该护士给予的护理措施正确的是

- A.专人看护
- B.用宫缩后灌肠
- C.可应用少量镇静药
- D.勤肛查
- E.试产2~4h，胎头仍未入盆，加强宫缩

40.慢性子宫颈炎临床最常见的病理类型是

- A.宫颈细胞非典型增生
- B.宫颈腺体囊肿
- C.宫颈息肉
- D.宫颈肥大
- E.宫颈糜烂样改变

41.慢性呼吸衰竭最常见的病因是

- A.严重胸廓畸形

- B.神经肌肉病变
C.大量气胸或胸腔积液
D.肺间质纤维化
E.支气管-肺疾病
- 42.临产后的主要产力是
A.腹肌收缩力
B.膈肌收缩力
C.产妇向下屏气
D.子宫收缩力
E.肛提肌收缩力
- 43.李女士，52岁，化脓性胆管炎，剖腹术后病情危重，下列哪项处理不妥（）
A.入住ICU病房
B.每15min观察1次BP、P、R
C.每15min观察1次神志
D.每15min观察1次肢体活动
E.术后用抗菌素
- 44.老年男性尿潴留最常见的原因是
A.尿道结石
B.膀胱结石
C.尿道损伤
D.良性前列腺增生
E.低血钾
- 45.口服补液盐治疗腹泻适用于
A.频繁呕吐者
B.新生儿腹泻
C.腹胀明显者
D.重度脱水者
E.轻、中度脱水者
- 46.可导致左心室后负荷过重的情况是
A.原发性高血压
B.二尖瓣狭窄
C.肺动脉高压
D.主动脉瓣关闭不全
E.室间隔缺损
- 47.静脉输液中发现药液不滴，查无回血，轻轻挤压输液管有阻力感，此时应
A.更换针头重新穿刺
B.调整针头位置
C.局部热敷、按摩
D.升高输液瓶高度
E.适当变换肢体位置
- 48.急性纤维蛋白性心包炎早期表现中具有诊断价值的表现是
A.发热
B.心包摩擦音
C.血压下降、脉压减小

D.胸痛

E.呼吸深大

49.急性脓胸具有确诊意义的是

A.胸痛、气促

B.肋间饱满

C.呼吸音减弱

D.X线片示大片浓密阴影

E.胸穿抽出脓液

50.急性腹膜炎发生休克的主要原因

A.剧烈疼痛

B.腹膜吸收大量毒素，血容量减少

C.肠内积液刺激

D.大量呕吐失液

E.腹胀引起呼吸困难

51.患者女性，66岁，诊断为尿毒症，精神不振，下腹无胀满，24h尿量为80ml。护士判断该患者的排尿情况属于（）

A.蛋白尿

B.无尿

C.少尿

D.尿量偏多

E.尿量偏少

52.患者，女性，75岁，患高血压性心脏病9年，近2年来患者明显感觉体力下降，轻微日常活动即感心悸、呼吸困难，休息较长时间后症状方可缓解。护士判断此患者目前的心功能处于（）

A.前驱期

B.I级

C.II级

D.III级

E.心力衰竭

53.患者，女性，62岁。突然出现心前区疼痛伴大汗2h，急诊就医，诊断为急性心肌梗死。给患者的护理措施中，下列正确的是

A.鼓励病人大量进食

B.尽量避免搬运

C.增加探望，增加信心

D.静脉输液速度宜快

E.如有便秘立即灌肠

54.患者，女性，55岁。护士为其测量脉搏时发现，每隔2个正常搏动后出现1次期前收缩，称为

A.二联律

B.三联律

C.间歇脉

D.水冲脉

E.绌脉

55.患者，女性，55岁，车祸造成腹部损伤，护士第一时间得知其有开放性膀胱破裂，首先要准备的抢救措施是

- A.积极止痛
- B.给予抗生素抗感染
- C.进行手术前准备
- D.留置导尿
- E.准备抗休克药物

56.患者，女性，40岁，患肝硬化6年。近日感腹胀、呼吸困难。B超示大量腹水。护士采取的护理措施应除外（）

- A.安置患者平卧位
- B.严格限制水、盐摄入
- C.预防压疮
- D.严格记录尿量
- E.预防感染

57.患者，女性，35岁，因股骨干骨折给予持续骨牵引，下列护理不妥的是（）

- A.足部不抵床栏
- B.及时清除骨针孔血
- C.抬高床脚
- D.常测患肢长度
- E.鼓励按照要求做患肢活动

58.患者，女性，30岁，孕18周，诊断淋病入院。护士向其解释淋病对分娩及胎和新生儿的影响后，孕妇出现下列哪一项表述时，表明护士仍需要对其进行健康教育

- A.「淋病会导致胎儿窘迫，」
- B.「淋病会导致新生儿肺炎，」
- C.「我不想让我丈夫知道这件事，」
- D.「我会因此发生盆腔感染，」
- E.「孕晚期我要注意胎膜早破的症状，」

59.患者，女性，26岁，前胸、双上肢烧伤急诊入院，主诉口干、剧烈疼痛，尿少体检:脉搏细数，血压75/60mmHg，血容量减少的原因是

- A.剧烈疼痛
- B.心功能不全
- C.血浆渗出到组织间隙和创面
- D.心力衰竭
- E.末梢血管扩张

60.患者，女，80岁。肺癌晚期。患者全身衰竭，生命体征微弱。护士为其测量呼吸应采取的观察方法是

- A.置少许棉花于鼻孔前，观察飘动次数
- B.耳头贴近患者口鼻处，听其呼吸声响
- C.手背置于患者鼻孔前，以感觉气流

- D.眼睛平视胸、腹部，观察起伏次数
E.测脉率除以3为呼吸次数
- 61.患者，女，58岁。肾衰竭接受肾移植术后，对其病房空气消毒的最佳方法是
A.紫外线灯管消毒
B.过滤除菌
C.电离辐射灭菌
D.臭氧灭菌灯消毒
E.2%过氧乙酸熏蒸
- 62.患者，女，57岁。腹痛，发热3天。查体:体温38.2℃，面部有毛细血管扩张；心率125次/分，律齐，双肺无异常；全腹压痛，肝肋下未及，脾肋下4cm，移动性浊音(+)实验室检查:白细胞2.8×10⁹/L，腹水培养有大肠埃希菌。患者发热、腹痛的原因最可能为
A.脓毒症
B.肝癌破裂继发腹膜炎
C.急性胰腺炎
D.肝硬化并发自发性腹膜炎
E.肝硬化并发结核性腹膜炎
- 63.患者，女，56岁。因乳腺癌在全麻下行乳癌根治术，手术顺利，术后返回病房。为患者准备麻醉床，不符合节力原则的是
A.动作平稳
B.使用肘部力量
C.铺床时身体靠近床铺
D.上身保持一定的弯度
E.两脚分开，两膝稍屈
- 64.患者，女，55岁。因肛门疾病需温水坐浴，适宜的水温是
A.34℃~36℃
B.40℃~45℃
C.37℃~39℃
D.50℃~52℃
E.46℃~48℃
- 65.患者，女，52岁。因头痛、头晕3天，加重1天伴视物不清住院，血压190/135mmHg，脉搏95次/分；眼底检查可见视乳头水肿；心电图示左心室肥大。首要的处理是
A.甘露醇快速静脉滴注
B.硝酸甘油舌下含化
C.服用硝苯地平
D.静脉注射毛花苷丙
E.静脉给速尿
- 66.患者，女，48岁。因“食管胃底静脉曲张破裂，上消化道大出血”急诊收住入院，护士应立即采取的措施是
A.向患者介绍病室环境
B.备好急救药品及物品
C.说明饮食的注意事项
D.询问患者家属既往病史、家族史和过敏史
E.立即通知医生诊治患者，及时执行医嘱
- 67.患者，女，48岁。诉夜间不能入眠。医嘱:地西洋5mg，PO，qn。护士执行的正确方法是

- A.肌内注射，每日 1 次
B.雾化吸入，每日 2 次
C.口服，每日 3 次
D.口服，隔日 1 次
E.口服，每晚 1 次
- 68.患者，女，37 岁。因肠粘连合并肠梗阻需行手术治疗，患者的丈夫、父母、哥哥及 10 岁的儿子都到了医院。医务人员介绍完手术的重要性及风险后，要求签订手术协议书，签订人应首选
- A.患者本人
B.患者的丈夫
C.患者的父母
D.患者的儿子
E.患者的哥哥
- 69.患者，女，37 岁。肛门周围瘙痒，肛周皮肤外口反复红肿，流脓，诊断为低位单纯性肛瘘，治疗的最佳方法是
- A.1:5000 高锰酸钾温水坐浴
B.局部换药治疗
C.肛瘘切除术
D.瘻道搔刮
E.使用抗菌药物
- 70.患者，女，35 岁。被诊断为骨癌，对生活失去信心，也不能照顾家庭和孩子，夜不能寐，被诊断为“抑郁症”不可能出现的症状是
- A.消极悲观
B.思维贫乏
C.睡眠障碍
D.食欲减退
E.自我评价过低
- 71.患者，女，34 岁。阑尾穿孔腹膜炎手术后第 6 天，护士查体发现患者体温 39.2℃，伤口无红肿，排便次数增多，混有黏液，伴有里急后重，该护士考虑患者并发了
- A.病毒性肠炎
B.肠梗阻
C.膈下脓肿
D.肠间脓肿
E.盆腔脓肿
- 72.患者，女，27 岁。妊娠 30 周，休息时有胸闷、气急等症状，查体，脉搏 120 次/分，心音向左侧扩大，心尖区有 II 级收缩期杂音，性质粗糙，肺底有湿音。该疾病对妊娠和分娩的影响不正确的是
- A.产后 2~3 天心脏负担最快减轻
B.因心功能不良可致胎儿宫内窘迫
C.分娩中第二产程心脏的负担最重
D.因心功能不良需要增加休息时间
E.因心功能不良可致早产
- 73.患者，男性，45 岁，因饱餐后出现右上腹疼痛而入院，诊断为胆囊结石，应忌食 ()
- A.蛋白食物

- B.纤维食物
- C.高纤维素食物
- D.油腻食物
- E.高维生素食物

74.患者，男性，36岁，近2个月以来出现皮肤紫癜，近3天出现牙龈出血不止，体温39℃，贫血进行性加重，伴乏力头晕、心悸，肝、脾、淋巴结不大，胸骨无压痛。化验：血红蛋白、白细胞、血小板低于正常，骨髓增生极度减低。该患者可能是（）

- A.急性再生障碍性贫血
- B.急性白血病
- C.血小板减少性紫癜
- D.血友病
- E.缺铁性贫血

75.患者，男性，27岁，印刷厂彩印车间，工人。因特发性血小板减少性紫癜住院，应用糖皮质激素治疗半月后好转出院。护士进行出院前的健康指导时，错误的是（）

- A.必须调换工种
- B.坚持饭后服药
- C.避免到人多聚集的地方
- D.注意自我病情监测
- E.若无新发出血可自行停药

76.患者，男性，27岁，前臂行石膏绷带包扎后3h患者向护士诉手指剧痛。护士查体，发现手指发凉、发绀，不能自主活动该护士首先考虑为

- A.低血容量性休克
- B.石膏绷带包扎过紧
- C.神经损伤
- D.体位不当
- E.静脉栓塞

77.患者，男，82岁。输液1小时后出现寒战、发热，体温39℃，伴有头痛、恶心、呕吐。患者家属质疑护士输液有误。此时护士适宜的处理措施是

- A.耐心解释输液反应可能的原因
- B.向护士长汇报详细情况
- C.送检残余药液和输液器
- D.向科室主任汇报详细情况
- E.与患者家属争辩，否认错误

78.患者，男，72岁。因“急性左心衰、心房颤动”急诊收入院，输液过程中突然出现肺栓塞。经抢救无效死亡。患者家属提出医疗事故鉴定申请，当地卫生行政部门应在当事人提出移送上一级主管部门的时间是

- A.21天
- B.14天
- C.3天
- D.7天
- E.10天

79.患者，男，65岁。恶性肿瘤晚期，卧床，大便失禁，多次污染床单，对其护理的重点是

- A.提供隐蔽的排便环境
- B.保护肛周皮肤，防止压疮

- C.给予高蛋白饮食
D.定时开窗通风换气
E.消除患者自卑、窘迫的心理
- 80.患者，男，64岁。散步时突然头痛、眩晕，伴呕吐、步态不稳。查体：血压 180/105mmHg 心率 62 次/分，双眼向右眼震，右侧指鼻欠稳准，右侧巴氏征阳性。处理措施不正确的是
- A.保持气道通畅
B.20%甘露醇 250ml 快速静滴
C.立即卧床休息
D.持续心电监测，观察意识变化
E.使用硝普钠降压
- 81.患者，男，60岁。由于严重恶心呕吐导致急性消化液大量丢失。医生开具以下医嘱，应首先为该患者输入的是
- A.5%NaHCO₃ 溶液
B.3%氯化钠溶液
C.平衡盐溶液
D.5%葡萄糖溶液
E.10%葡萄糖溶液
- 82.患者，男，59岁全程肉眼血尿 3 个月，应首先怀疑
- A.前列腺肿瘤
B.慢性肾小球肾炎
C.膀胱肿瘤
D.输尿管结石
E.泌尿系感染
- 83.患者，男，56岁。因心前区压榨样疼痛 4 小时余，伴冷汗、恐惧来诊。为评估病情，护士应重点收集的资料是
- A.遗传史
B.吸烟史
C.酗酒史
D.心绞痛病史
E.生活习惯
- 84.患者，男，36岁。因饱餐并大量饮酒后出现上腹部持续疼痛 2 小时来院急诊，疼痛剧烈而持续，阵发性加剧，为减轻疼痛患者的常见体位是
- A.俯卧位
B.弯腰屈膝侧卧位
C.半卧位
D.截石位
E.端坐卧位
- 85.患者，男，35岁。肢端发凉、怕冷及间歇性跛行 6 个月，近期加重，彻夜难眠，查体下肢皮肤暗红色，治疗药物不恰当的是
- A.肾上腺素
B.硫酸镁
C.低分子右旋糖酐
D.哌替啶
E.吗啡

- 86.患者，男，30岁。患大叶性肺炎，发热、咳嗽，医嘱予青霉素注射，开始注射10分钟，患者发生过敏性休克。以下处理方案中最适宜的是
- A.停药、吸氧、保暖、注射氢化可的松、平卧
 - B.停药、吸氧、保暖、注射多巴胺、平卧
 - C.停药、平卧、吸氧、注射抗组胺药物、保暖
 - D.停药、平卧、注射盐酸肾上腺素、保暖、吸氧
 - E.停药、平卧、测血压、注射尼可刹米、保暖
- 87.患者，男，22岁。被电动自行车撞伤后导致左侧第5肋骨闭合性骨折，治疗的重点是
- A.骨折对线
 - B.牵引疗法
 - C.固定胸廓
 - D.石膏托固定
 - E.手法复位
- 88.患者，26岁。已婚。近3个月经期均在10天左右，月经期28天。子宫正常大小，血红蛋白100g/L，最可能的诊断是
- A.无排卵性功血
 - B.子宫内膜不规则脱落性功血
 - C.黄体功能不足性功血
 - D.不全流产
 - E.稽留流产
- 89.患儿，男，8岁。课间不慎将笔帽吸入气管，不可能出现的表现是
- A.锁骨上窝凹陷
 - B.吸气时间长于呼气
 - C.呼气费力
 - D.胸骨上窝凹陷
 - E.鼻翼煽动
- 90.患儿，男，10岁。患1型糖尿病，护士指导患儿家长使用胰岛素治疗过程中应警惕
- A.酮症酸中毒
 - B.胃肠道反应
 - C.过敏反应
 - D.感染
 - E.低血糖反应
- 91.患儿，男，10个月。易激惹，夜间哭闹、多汗、睡眠不安。查体：方颅、肋骨串珠，手镯征(+)，诊断佝偻病。护士的健康教育内容不包括
- A.积极进行站立、行走锻炼
 - B.指导母乳喂养，及时增添辅食
 - C.操作轻柔以防断针
 - D.多到户外活动
 - E.添加含维生素D食物
- 92.患儿，7岁。因阵发性剑突下钻顶样疼痛伴恶心、呕吐半天入院。查体：剑突下压痛，无腹肌紧张，急诊护士应首先考虑
- A.胆道蛔虫病
 - B.肝内胆管结石
 - C.肝外胆管结石

D.急性阑尾炎

E.急性胰腺炎

93.患儿，3岁。低钙抽搐需用钙剂治疗，护士凭经验从固定位置取出5%氯化钙，未查对。注射后患儿死亡，经查实推注的竟是5%氯化钾该护士的行为属于

A.意外事故

B.过失犯罪

C.故意犯罪

D.医疗差错

E.侵权行为

94.患儿，14个月，因发热、咳嗽、食欲降低、呕吐4天后出现惊厥入院。体检:体温39.5℃，咽部充血明显，前平坦。分诊护士考虑该患儿惊厥的原因首先可能是（）

A.急性脑炎

B.低血糖

C.癫痫持续状态

D.缺血缺氧性脑病

E.高热惊厥

95.护士小孙在执行医嘱过程中有权提出异议并拒绝执行医嘱的情形是

A.护理程序太复杂

B.需要额外的劳动和付出

C.医嘱有错误

D.抢救过程中的口头医嘱

E.患者不愿意配合的医嘱

96.关于医嘱的处理，不正确的是

A.临时医嘱一般只执行一次

B.临时备用医嘱有效时间在24小时以内

C.长期医嘱有效时间在24小时以上

D.口头医嘱时，护士复述一遍，医护双方确认无误后方可执行

E.长期备用医嘱须由医生注明停止时间

97.关于儿童生长发育的说法，错误的是

A.生长发育是一个连续过程

B.各系统器官发育的速度是一致的

C.与后天环境有关

D.与出生时的基础有关

E.有一定的个体差异性

98.骨结核患者中，最常见的发病部位是

A.指骨

B.股骨

C.胫骨

D.脊椎骨

E.跖骨

99.负责管理护士考核工作的部门是

A.国家卫生部

B.预防机构

C.医学专业组织

D.县级以上人民政府卫生行政部门

E.县级以上医疗机构评审委员会

100.符合慢性阻塞性肺气肿的体征是 ()

A.叩诊呈鼓音

B.单侧语颤减弱

C.单侧呼吸运动减弱

D.气管偏移

E.呼气时间延长

101.初产妇, 28岁。顺产一健康女婴, 产后一切正常。产后第3天准备出院, 护士嘱咐第一次复诊应安排在产后

A.1周

B.2周

C.4周

D.6周

E.10周

102.白先生, 32岁, 既往有胃病史, 近一周来, 常感上腹部不适, 4h前突发上腹部剧烈疼痛, 伴有恶心、呕吐, 查体:腹部压痛、肌紧张, 肝浊音界缩小, X线检查可见膈下游离气体, 首先考虑

A.急性阑尾炎穿孔

B.胆囊炎穿孔

C.急性胰腺炎

D.溃疡病穿孔

E.急性肠梗阻

103.阿尔茨海默病的临床表现不包括

A.被窃妄想

B.经积极治疗预后良好

C.与遗传因素有关

D.脑重减轻、脑萎缩

E.可有非认知性的精神症状

104.WHO规定的白天病区内的噪声强度应控制在

A.20~25dB

B.35~40dB

C.25~30dB

D.55~60dB

E.45~50dB

105.3岁小儿向妈妈执意表达自己的需要, 其心理发展特征是

A.有集体意识

B.客观看问题

C.克服自卑感

D.有抽象思维

E.明显自主性

(106~108 共用题干)

赵女士, 68岁, 患肝硬化已5年, 近日发现牙龈出血、夜间睡眠时流涎呈粉红色, 皮肤有许多出血点, 且有尿频、尿急、腰痛就医, 经检查后确认为肝硬化、脾功能亢进、全血细胞

减少，伴泌尿系感染。

106.全血细胞是指

- A.淋巴细胞、嗜酸性粒细胞
- B.红细胞、白细胞及血小板
- C.杆状核粒细胞及嗜碱性粒细胞
- D.单核细胞
- E.中性粒细胞

107.泌尿系统感染是由于

- A.红细胞减少
- B.中性粒细胞减少
- C.血小板减少
- D.淋巴细胞减少
- E.嗜酸性粒细胞减少

108.皮肤、牙龈出血是由于

- A.有中毒颗粒
- B.血小板减少
- C.嗜酸性粒细胞减少
- D.中性粒细胞减少
- E.淋巴细胞减少

(109-111 题共用题干)

患者，男，68岁。因患膀胱癌住院。入院时，护士主动与其交谈：“您好！我是您的责任护士，有事请找我。”患者治疗多日病情不见好转，情绪低落，化疗不良反应重。护士悉心照顾、鼓励，患者深受感动患者经治疗后即将出院，对护士的服务非常满意。

109.该责任护士与该患者的关系模式属于

- A.共同参与型
- B.指导—合作型
- C.主动—被动型
- D.被动—主动型
- E.自主—合作型

110.影响患者与责任护士沟通的因素不包括

- A.患者的感受
- B.患者的情绪
- C.患者的身体状况
- D.患者的籍贯
- E.护士的专业能力

111.患者出院时，责任护士最主要的工作是

- A.评价护理措施
- B.征求患者意见，寻找护理工作中问题
- C.保持与患者的信任关系
- D.评估患者，制定随访计划
- E.向患者交代出院后的注意事项

(112-114 题共用题干)

40岁某先生因右小腿严重外伤后，发生气性坏疽，住院治疗。

112.首先的处理是

- A. 给氧
- B. 高压氧治疗
- C. 止痛
- D. 手术
- E. 加强营养

113. 下列哪项处理不必要

- A. 高压氧治疗
- B. 手术
- C. 隔离
- D. 应用青霉素
- E. 避光、安静

114. 该患者外伤后如何处理可避免发生气性坏疽

- A. 彻底清创缝合
- B. 清创后伤口敞开
- C. 应用 TAT
- D. 应用青霉素
- E. 应用甲硝唑

(115~116 题共用题干)

患者，男性，34 岁，近 2 年饮食没有规律，并嗜烟、酒，出现饥饿痛及半夜痛醒。进餐或服用碱性药物可使症状缓解。

115. 首先考虑该患者可能患有

- A. 胃溃疡
- B. 慢性胃炎
- C. 胃息肉
- D. 十二指肠球部溃疡
- E. 十二指肠球炎

116. 3h 前饱餐后，患者突然感到上腹部剧痛，随即向全腹扩散，出冷汗，平卧不敢翻身。

查体:体温正常，脉搏有力，90 次/分腹部平坦、无胃型，腹式呼吸表浅，肠鸣音消失，肝区浊音界消失，腹呈板样强直伴压痛及反跳痛，以中上腹为显著。考虑该患者可能的并发症是

- A. 急性胰腺炎
- B. 十二指肠球部溃疡穿孔
- C. 急性阑尾炎
- D. 急性胃肠炎
- E. 急性胆囊炎

(117-108 题共用题干)

患者，男，34 岁。肺结核，拟行链霉素治疗。

117. 链霉素皮肤过敏试验液的常用浓度是

- A. 2500/ml
- B. 15U/ml
- C. 25U/ml
- D. 150U/ml
- E. 250U/ml

118. 注射皮试液 3 分钟，患者皮肤发红、瘙痒、丘疹，眼睑水肿。其过敏反应的类型是

- A. 休克

- B. 结膜炎
- C. 周围神经炎
- D. 荨麻疹
- E. 肾炎

(119-120 题共用题干)

患者，女，70岁。近1年来腰背、脊柱X线检查示：胸12腰1椎体楔形压缩性骨折，骨密度测定腰椎低于正常年轻妇女峰值骨量。实验室检查血钙2.18mmol/L 血磷0.98mmol/L，碱性磷酸酶134u/L。

119. 该病的诱发因素除外

- A. 女性绝经后雌激素缺乏
- B. 妊娠期饮食钙含量不足
- C. 长期大量的饮酒、咖啡、吸烟
- D. 活动过少或过度运动
- E. 服用多种维生素的药物

120. 可用于的治疗药物不包括

- A. 钙剂
- B. 泼尼松
- C. 雌激素
- D. 阿仑膦酸盐
- E. 二膦酸盐

答案

2022年护士模拟卷一

专业实务

1. 答案：A

解析：肠扭转多见于青壮年，常因饱食后剧烈运动而发病。闭性肠梗阻加绞窄性肠梗阻，发病急骤，发展迅速，小肠最多见。故预防肠扭转最关键的措施是不可饭后剧烈运动。

2. 答案：C

解析：为避免饮食对内生肌酐的影响，应食用无肌酐饮食，连续进食低蛋白饮食3天，每日蛋白质应少于40g，并禁食肉类（无肌酐饮食），试验期禁食肉类、鱼类、鸡、鸭类等食物，试验当天忌饮茶和咖啡，停用利尿剂。

3. 答案：D

解析：疾病的病机是疾病发生、发展与变化的机制，是疾病的临床表现、发展转归和诊断治疗的内在根据。主要包括阴阳失调、正邪相争、气机失常。

4. 答案：D

解析：腰椎间盘突出病人术后进行直腿抬高试验的目的是防止神经根粘连。

5. 答案：B

解析：泼尼松属糖皮质激素，具有抗炎作用、抗休克作用、免疫抑制与抗过敏作用、退热作用。其不良反应较多，如消化系统和心血管系统并发症、诱发或加重感染、骨质疏松等。其中骨质疏松主要与糖皮质激素促蛋白质分解、抑制其合成及增加钙、磷排泄有关，多见于小儿、绝经妇女和老人。小儿长期应用还可抑制生长激素的分泌，影响生长发育。吡拉西坦（脑复康）属吡咯烷酮类药物，可改善大脑能量代谢，促进乙酰胆碱释放，主要用于脑外伤引起的脑功能减退，也可用于儿童发育迟缓的治疗。胰岛素具有促进蛋白质合成的作用，不会抑制小儿骨骼的生长发育。氨苄西林属广谱青霉素类药物，其主要不良反应为恶心、呕吐、腹

泻和皮疹。地西洋属苯二氮类药物，主要抗焦虑、镇静催眠的作用，其不良反应为嗜睡、头晕、乏力，长期应用可成瘾。

6.答案：D

解析：护理人员主动去参加救灾第一线工作，这体现了护理人员的崇高的职业道德素质。护士应积极参加公共卫生应急事件救护，护士有义务参与公共卫生和疾病预防控制工作。

7.答案：B

解析：5-氨基水杨酸在胃肠道几乎不被吸收，对肠道炎症的治疗效果显著。柳氮磺吡啶在肠道可分解成磺胺嘧啶和5-氨基水杨酸盐，起到抗菌、抗炎和免疫抑制的作用，是治疗溃疡性结肠炎的首选，适用于轻型、中型或经糖皮质激素治疗已缓解的重型患者。糖皮质激素类药物对急性发作者的疗效较好，适用于应用氨基水杨酸制剂疗效不佳的轻、中型患者，特别是重型活动期患者及急性暴发型患者。免疫抑制药可用于对糖皮质激素治疗效果不佳或对糖皮质激素依赖的慢性持续性患者。重症患者禁用止泻药，以免诱发中毒性巨结肠。氯霉素为抗生素，可控制感染。

8.答案：B

解析：营养不良的早期表现为体重不增，以后体内脂肪逐渐消失，体重减轻。皮下脂肪消耗的顺序：腹部→躯干→臀部→四肢→面部。测量小皮下脂肪厚度常选用的部位是腹部。

9.答案：B

解析：自动体位是病人自动采取的卧位，适用于清醒病人；被动卧位是病人自身无改变卧位的能力，躺在被安置的卧位，如昏迷、极度衰弱、瘫痪等病人（B对）；患侧卧位是病人侧向有功能障碍的或患病侧肢体，预防压疮形成，临床经常使用于长期卧床病人，与仰卧位交替更换以减少局部受压时间，防止压疮的发生；端坐位用于急性肺水肿，心包积液及支气管哮喘发作的病人，由于极度呼吸困难患者常常被迫端坐。床头抬高 $70^{\circ} \sim 80^{\circ}$ ，床尾抬高 $15^{\circ} \sim 20^{\circ}$ ，此卧位可减轻病人的体力消耗。（B对）

10.答案：A

解析：做药物过敏时，拔针后指导患者勿揉擦局部，以免影响结果的观察。试验消毒皮肤忌用碘酊、碘伏，以免影响对局部反应的观察。进针角度与皮肤呈 5° 刺入，以针尖斜面能全部进入皮内为宜，进针角度过大易将药液注入皮下，影响结果的观察和判断；拔针后指导患者勿揉擦局部，以免影响结果的观察。

11.答案：A

解析：胰液由腺泡细胞和小的导管管壁细胞分泌，呈碱性，可中和进入十二指肠的胃酸，使肠黏膜免受胃酸的侵蚀。胰液中的消化酶主要有胰淀粉酶、胰脂肪酶、胰蛋白酶和糜蛋白酶，分别水解淀粉、脂肪和蛋白质。胰酶原在进入十二指肠后，胰蛋白酶原首先在肠激酶的作用下被激活为胰蛋白酶，继而由胰蛋白酶激活其他胰酶原。

12.答案：C

解析：胰腺老化主要表现为胰岛细胞变性，胰岛素分泌减少，胰酶的活性降低，胰液分泌减少。

13.答案：D

解析：医用滑石粉灭菌可采用干烤法。热力消毒灭菌法包括压力蒸汽灭菌法、煮沸法、燃烧法、干烤法。其中干烤法适用于高温下不易变质、损坏和蒸发的物品，如粉剂、油剂、玻璃器皿及金属制品的灭菌等压力蒸汽灭菌法适用于耐高温、耐高压、耐潮湿的物品。煮沸消毒法适用于耐高温、耐潮湿物品。燃烧法适用于无保留价值、某些急用耐高温物品。电离辐射灭菌法适用于不耐热的物品。

14.答案：A

解析：小儿腹泻时呕吐严重时可禁食 4~6h（不禁水），好转后尽早恢复喂养，母乳喂养的患儿可继续母乳喂养，缩短每次哺乳时间，少量多次喂养，暂停添加辅食。轻、中度脱水无明显呕吐者可给予口服补液盐。婴儿腹泻期间要做好臀部护理，保持臀部清洁干燥。病毒性肠炎腹泻不需服用抗生素，细菌性肠炎腹泻根据病原菌，选择抗生素，或根据药敏试验结果调整。大肠杆菌选羟氨苄青霉素、庆大霉素口服片、多粘菌素 E，重症用三代头孢菌素。鼠伤寒沙门氏菌口服羟氨苄青霉素，重症用三代头孢菌素。空肠弯曲菌用大环内酯类。金黄色葡萄球菌肠炎用新青 II、万古霉素。真菌性肠炎停用抗生素，口服制霉菌素。该患儿未明确肠道感染细菌不可随意乱用抗生素。

15. 答案：B

解析：仅有 1 根肋骨骨折称为单根肋骨骨折，2 根或 2 根以上肋骨骨折称为多发性肋骨骨折，肋骨骨折可以同时发生在双侧胸部，每肋仅一处折断者称为单处骨折，有两处以上折断者称为双处或多处骨折，多根多处肋骨骨折或多根肋骨骨折合并多根肋软骨骨骺脱离或双侧多根肋软骨骨折或骨骺脱离，则造成胸壁软化，称为胸壁浮动伤，又称为连枷胸。

16. 答案：A

解析：本题只可采用排除法答题。新生儿家庭访视的内容包括询问出生情况，如产后生活状态、预防接种、喂养及护理；观察居住环境及新生儿一般情况，如有无产伤、黄疸、畸形、皮肤和脐部感染等；体格检查，如头颅、前囟、头围、体重、外生殖器、视听觉筛查等；指导喂养及日常护理。在排除其他四个选项后，理解新生儿家庭访视包括询问预防接种情况，但不包括新生儿预防接种的实施。

17. 答案：D

解析：扁桃体又称扁桃腺，是位于儿童鼻腔、口腔与咽部的腺体组织，因外形像扁桃而得名，是免疫系统的一部分。小儿扁桃体炎属于上呼吸道感染，感染部位通常是指聘扁桃体，而非咽扁桃体和鼻扁桃体。该扁桃体常在 1 岁后开始发育，4~10 岁时发育达最高峰，故此时是小儿扁桃体炎最高发的年龄段。

18. 答案：B

解析：人的一生有乳牙（20 颗）、恒牙（28~32 颗）两副牙齿。小儿生后 4~10 个月乳牙开始萌出，于 2 岁半乳牙出齐，2 年内乳牙数目为月龄-4（或 6）。

19. 答案：D

解析：由图可知，该术式为门-腔静脉端侧分流术。门体分流术将肝门静脉系和腔静脉系的主要血管进行手术吻合，使肝门静脉血流入腔静脉，降低门静脉压力，防止出血，但术后肠道吸收的氨部分或全部不通过肝解毒，直接影响大脑的能量代谢，故肝性脑病发生率高，易引起肝衰竭。

20. 答案：D

解析：痛风患者应严格控制饮食，避免高嘌呤如动物内脏、鱼虾类、河蟹、肉类、菠菜、黄豆、扁豆、豌豆、浓茶、酒等食物，应进食碱性食物，如牛奶、鸡蛋、马铃薯、各类蔬菜、柑橘类水果等。

21. 答案：B

解析：为昏迷患者行口腔护理时，可用开口器协助张口，开口器应从白齿处放入，有活动义齿者，取下义齿并用冷水刷洗，浸于冷水中备用。观察口腔时，对长期使用抗生素和激素的患者，应注意观察口腔内有无真菌感染。擦拭顺序为，咬合上、下齿，用压舌板轻轻撑开左侧颊部，擦洗左侧牙齿的外面。沿纵向擦洗牙齿，按顺序由白齿洗向门齿。同法擦洗右侧牙齿的外面。张开上、下齿，擦洗牙齿左上内侧面、左上咬合面、左下内侧面、左下咬合面，弧形擦洗左侧颊部。同法擦洗右侧牙齿。为防止误吸，使用的棉球不可过湿，以不能挤出液体为宜。

22.答案: C

解析: 上消化道出血多由食管-胃底静脉曲张破裂出血所致, 是肝硬化最常见的并发症, 表现为突发大量呕血或柏油样便, 易导致出血性休克或肝性脑病。肝硬化患者抵抗力低下、门-腔静脉侧支循环开放等易导致细菌感染, 从而并发自发性腹膜炎。肝肺综合征是指严重肝病伴肺血管扩张和低氧血症, 表现为呼吸困难、发绀和杵状指。门静脉血栓形成表现为腹胀、剧烈腹痛、脾大、顽固性腹水、呕血、便血。若短期内病情迅速恶化, 肝脏进行性增大, 表面凹凸不平, 持续性肝区疼痛, 腹水增多且为血性, 有不明原因的发热、消瘦等, 应怀疑并发原发性肝癌。

23.答案: C

解析: 糖尿病肾病是糖尿病常见的并发症, 是糖尿病全身性微血管病变表现之一, 临床特征为蛋白尿, 渐进性肾功能损害, 高血压、水肿, 晚期出现严重肾功能衰竭, 是糖尿病患者的主要死亡原因之一。糖尿病会损坏眼底微血管, 可以导致视力衰退, 甚至失明, 称为糖尿病视网膜病变。

24.答案: B

解析: 使用约束带时应局部置衬垫, 固定松紧适宜, 并定时松解, 每 2 小时放松约束带 1 次, 保证患者肢体功能位。注意观察约束带部位皮肤颜色, 每 15 分钟观察 1 次, 必要时行局部按摩, 促进血液循环。

25.答案: A

解析: 抗凝治疗期间需定期检测凝血功能, 关注有无出血倾向。

26.答案: E

解析: 社区获得性肺炎最常见的类型为细菌性肺炎, 细菌性肺炎常见的致病菌有肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯菌、铜绿假单胞菌、大肠埃希菌、厌氧菌、军团菌等, 其中肺炎链球菌是细菌性肺炎最常见的致病菌。

27.答案: C

解析: 治疗三叉神经痛的关键是迅速有效镇痛, 药物治疗首选卡马西平, 逐渐减量;卡马西平用于抗外周神经痛, 包括三叉神经痛、舌咽神经痛等, 亦可作为三叉神经痛缓解后的长期预防性用药。吗啡具有强大的镇痛作用, 对绝大多数急性痛和慢性痛的镇痛效果良好, 对持续性慢性钝痛作用大于间断性锐痛, 对神经性疼痛的效果较差, 故不选择吗啡。布洛芬主要用于风湿性关节炎、骨关节炎、强直性关节炎、滑液囊炎等疼痛, 也可用于痛经的治疗。阿司匹林有较强的解热、镇痛作用, 用于头痛、牙痛、肌肉痛、痛经及感冒发热等。地西具有抗焦虑、镇静催眠、抗惊厥、抗癫痫等作用。

28.答案: B

解析: 妊娠期高血压疾病重度子痫前期临床表现为血压持续升高, 收缩压 $\geq 160\text{mmHg}$ 或舒张压 $\geq 110\text{mmHg}$, 蛋白尿 $\geq 5.0\text{g}24\text{h}$ 或随机尿蛋白 $\geq (+++)$ 。血小板 $<100 \times 10^9$ 出现微血管溶血, 出现持续性头痛或视觉障碍, 持续性上腹部不适等。

29.答案: A

解析: 妊娠合并心脏病产后 72h 内严密观察生命体征, 安置心电监测, 心功能 I~II 级的产妇可以母乳喂养, III 级或以上应及时回乳, 遵医嘱继续使用抗生素预防感染, 不宜妊娠者在产后 1 周做绝育术。综上所述, BCDE 选项错误, A 对。

30.答案: B

解析: 血, 即血液, 是循行于脉中的富有营养的红色液态物质, 是人体神志活动的主要物质基础。

31.答案: B

解析：造口术后 1 周或造口处伤口愈合后，每日扩张造瘘口 1 次，防止造口狭窄当造口袋二分之一容量被排泄物充满时，需及时更换。造口周围皮肤应尽量保持干燥，及时清除流出的粪液，要定时训练排便习惯。

32. 答案：E

解析：浅昏迷：随意活动消失，对疼痛刺激有反应，各种生理反射（吞咽、咳嗽、角膜反射、瞳孔对光反应等）存在，体温、脉搏、呼吸多无明显改变，可伴谵妄或躁动。深昏迷：随意活动完全消失，对各种刺激皆无反应，各种生理反射消失，可有呼吸不规则、血压下降、大小便失禁、全身肌肉松弛、去大脑强直等，浅昏迷与深昏迷的主要区别是各种刺激反应是否存在。

33. 答案：E

解析：儿童后期卵巢有发育，也会逐渐分泌性激素；卵巢生殖内分泌功能最旺的时期是育龄期，月经初潮标志着女性已经步入了青春期，生殖器官发育成熟一般要到成年；绝经期是指月经停止，绝经之前已存在卵巢逐步衰退的阶段，大约 2~4 年，在不同的人长短不一，称为绝经前期。绝经之后卵巢功能更为低下，但不一定立即完全消失，一般也要经历 2~3 年，也有长达 6~8 年，甚至更长。

34. 答案：E

解析：乙肝母婴传播阻断法：孩子出生后尽快在不同的部位注射乙肝疫苗和乙肝免疫球蛋白，孩子满月时和 6 个月时再分别注射一次乙肝疫苗。

35. 答案：E

解析：该患者血压 170/105mmHg，眼花、恶心、呕吐，诊断为重度子痫前期。腹痛伴大量阴道出血，考虑为胎盘早剥。胎盘早期剥离临床表现为突发性持续性腹部疼痛，伴或不伴阴道出血，多发生于子病前期的产妇。高血压可引起全身血管痉挛、硬化，子宫底蜕膜也可发生螺旋小动脉痉挛或硬化，引起远端毛细血管缺血坏死而破裂出血，在底蜕膜层与胎盘之间形成血肿，导致胎盘从子宫壁剥离。

36. 答案：B

解析：女性的排卵日期一般在下次月经来潮前的 14 天左右。下次月经来潮的第 1 天算起，倒数 14 天或减去 14 天就是排卵日，排卵日及其前 5 天和后 4 天加在一起称为排卵期。该女性月经周期为 30 天，上月月经是 4 月 18 日，则下次月经是 5 月 18 号，5 月 18 号减去 14 天就是 5 月 4 号。

37. 答案：D

解析：口服避孕药漏服要在要在 12h 内补服。

38. 答案：A

解析：该护士申请外出学习是行使了《护士条例》中的享有学习、培训的权利，护士有参加专业培训、从事学术研究和交流、参加行业协会和专业学术团体的权利。护士的权利包括：享有获得物质报酬的权利，享有安全执业的权利，享有学习培训的权利，享有获得履行职责相关的权利，享有获得表彰、奖励的权利，享有人格尊严和人身安全不受侵犯的权利。

39. 答案：A

解析：试产时要专人看护（A 对），试产期间禁灌肠，不得使用镇静剂，肛查只能在宫缩间歇时进行（B、C、D 错），第一产程不能超过 2h，若超过应行会阴侧切或剖宫产。

40. 答案：E

解析：宫颈糜烂样改变是慢性宫颈炎最常见病理改变。宫颈糜烂样改变可能是宫颈原始鳞柱交接部的外移，为生理性宫颈糜烂，也可能是病理性的，如炎症时宫颈柱状上皮充血水肿等。（E 对）

41. 答案：E

解析：导致慢性呼吸衰竭的主要原因为呼吸系统疾病，如呼吸道疾病、肺组织病变、胸廓病变、肺血管疾病等，其中以支气管肺疾病（如慢性阻塞性肺疾病、肺间质纤维化）最为多见。

42.答案：D

解析：子宫收缩力是临产后的主要产力，贯穿于分娩全过程。临产后的宫缩能使宫颈管短缩消失、宫口扩张、先露下降和胎盘娩出。

43.答案：D

解析：该患者有化脓性胆管炎，又是剖腹术后，病情危重应入住 ICU 进行监护，密切观察生命体征和神志，该患者无肢体功能障碍，无需每 15min 观察 1 次肢体活动。

44.答案：D

解析：老年男性尿潴留最常见的原因是良性前列腺增生。主要病理改变为细胞增生，增生组织挤压外周的腺体，使前列腺尿道伸长、受压变窄尿道阻力增加，引起排尿困难。

45.答案：E

解析：口服补液盐成分是氯化钠 3.5g、碳酸氢钠 2.5g、枸橼酸钾 1.5g 和葡萄糖 20g，加水至 1000ml 后饮用，用于治疗小儿消化不良和秋季腹泻引起的轻度及中度脱水。

46.答案：A

解析：压力负荷（后负荷）过重主要见于左、右心室收缩期射血阻力增加的疾病：左心室后负荷增加的疾病有原发性高血压、主动脉瓣狭窄等右心室后负荷增加的疾病有肺动脉高压、肺动脉瓣狭窄、肺阻塞性疾病和肺栓塞等。

47.答案：A

解析：根据题干描述的情况，可判断为针头阻塞，此时应更换针头重新穿刺，禁忌强行冲注针头，防止血栓进入血管内。

48.答案：B

解析：心包摩擦音是急性纤维蛋白性心包炎早期表现中最具诊断价值的体征，呈抓刮样粗糙音，以胸骨左缘第 3、4 肋间、胸骨下段及剑突区最为明显，是由粗糙的壁层与脏层心包在心脏搏动时相互摩擦产生，坐位时身体前倾、深吸气或用力按压膜式听诊器更易闻及，当积液增多致两层心包分开，摩擦音即减弱或消失。胸痛是急性纤维蛋白性心包炎主要症状，也是最早出现的症状。

49.答案：E

解析：急性脓胸：致病菌进入胸腔引起感染炎性渗出，造成胸腔炎性或脓性积液，称为脓胸。急性脓胸辅助检查有 CT 检查、B 超、X 线，但脓腔穿刺抽得脓液可最后确切诊断。脓液的外观、性状、颜色及气味，对判断致病菌的种类有一定帮助。

50.答案：B

解析：腹膜炎形成后，腹腔渗液中大量的细菌与毒素经腹膜吸收、循淋巴管进入血液中，产生败血症的一系列症状，导致患者出现低血压及休克表现。

51.答案：B

解析：24h 尿量不足 100 时称为无尿，24h 尿量少于 400ml 为少尿，24h 尿量超过 2500ml 为多尿。（B 对）

52.答案：D

解析：心功能的分级：I 级：患者患有心脏病但活动量不受限制，平时一般活动不引起疲乏、心悸、呼吸困难或心绞痛。II 级：心脏病患者的体力活动受到轻度的限制，休息时无自觉症状，但平时一般活动下可出现疲乏、心悸、呼吸困难或心绞痛。III 级：心脏病患者体力活动明显限制，日常生活活动即引起上述的症状。IV 级：心脏病患者不能从事任何体力活动。休息状态下也出现心衰的症状，体力活动后加重。

53.答案：B

解析：急性心梗患者急性期应绝对卧床休息，保持安静；低盐、低热量饮食少量多餐，控制输液速度，防止心力衰竭发生，同时保持大便通畅。

54.答案：B

解析：每隔一个正常搏动后出现一次期前收缩称为二联律，每隔两个正常搏动后出现一次期前收缩，称为三联律间歇脉在一系列正常均匀的脉搏中，出现一次提前而较弱的搏动，其后有一较正常延长的间歇（即代偿性间歇）。水冲脉是指脉搏急促有力，骤起骤落，如潮水涨落。绌脉在同一单位时间内脉率少于心率。

55.答案：E

解析：膀胱破裂的早期可以出现病人休克，所以积极预防抢救休克是首先应该实行的措施。晚期治疗主要是膀胱修补和一般支持性的处理。（E对）

56.答案：A

解析：大量腹水会抬高膈肌，出现腹胀、呼吸困难，应取半卧位。少量腹水患者建议平卧位，以增加肝、肾血流量。

57.答案：B

解析：骨牵引有创口，不能清除针孔处的血痂，防止细菌从针孔处进入引起感染。

58.答案：C

解析：淋病具有传染性，必须告知其丈夫。治疗期间禁止性生活，注意隔离。污染物如内裤、浴巾以及其他衣物等应煮沸消毒，分开使用洗浴用具。

59.答案：C

解析：大面积烧伤的热力作用，使毛细血管通透性增加，导致大量血浆外渗至组织间隙、创面，引起有效循环血容量锐减，而发生低血容量性休克。

60.答案：A

解析：危重患者呼吸微弱，可用少许棉花置于患者鼻孔前，观察棉花被吹动的次数，计时应1分钟。

61.答案：B

解析：过滤除菌通过过滤器可除掉空气中0.5~5μm的尘埃，达到洁净空气的目的，用于烧伤病房、手术室、器官移植病房等。紫外线消毒法适用于空气、物品表面和液体的消毒。电离辐射灭菌法适用于不耐热的物品，如一次性医用塑料制品、食品、药品和生物制品等在常温下的灭菌。过氧乙酸能产生新生态氧，主要通过氧化和酸性作用等使细菌死亡，适用于一般物体表面、食品工具和设备、空气以及耐腐蚀医疗器械的消毒灭菌。臭氧灭菌灯消毒法适用于空气、医院污水、诊疗用水及物品表面的消毒。

62.答案：D

解析：自发性细菌性腹膜炎是腹腔内无脏器穿孔的腹膜急性细菌性感染，住院的腹腔积液患者中发生率为10%~30%，发生的主要原因是肝硬化时单核-吞噬细胞的噬菌作用减弱，肠道内细菌异常繁殖并经由肠壁进入腹膜腔，带菌的淋巴液漏入腹腔以及腹水抗菌能力下降引起感染，致病菌多为革兰阴性杆菌；常表现为短期内腹腔积液迅速增加，伴腹痛、腹泻、腹胀及发热等，少数患者伴血压下降、肝功能恶化或门腔分流性脑病加重体检可发现轻重不等的全腹压痛和腹膜刺激征。因此，该患者发热、腹痛的原因最可能为肝硬化并发自发性腹膜炎。

63.答案：D

解析：节力原则是运用人体力学原理，防止职业损伤。操作过程中应注意：铺床时身体靠近床边，上身保持直立两腿前后或左右分开以扩大支撑面，两膝稍弯曲以降低重心；使用肘部力量，动作平稳连续；先铺床头，再铺床尾，最后铺中部。

64.答案：B

解析：该患者进行温水坐浴时水温应调节为 40℃~45℃。

65. 答案：A

解析：该患者表现为头痛、头晕，血压 190/135mmHg 眼底检查可见视乳头水肿，心电图示左心室肥大，考虑为高血压急症，高血压急症是指原发性或继发性高血压患者，在某些诱因作用下，血压突然和明显升高，超过 180/120mmHg，同时伴有进行性心、脑、肾等重要靶器官功能不全的表现。高血压急症伴有重要器官组织如心、脑、肾、眼底、大动脉的严重功能障碍时，应迅速降低血压有高血压脑病时应给予脱水药，甘露醇快速静脉滴注。

66. 答案：E

解析：病房护士在接到住院处危重患者的入院通知后，应立即通知有关医生做好抢救准备。准备好急救物品及器材，如氧气、吸引器、无菌包等。将备用床改为暂空床，酌情加铺橡胶单和中单。手术后患者准备麻醉床。将患者尽量安排在已准备好床单位的危重病室或抢救室。配合医生抢救，密切观察病情，做好抢救记录。在医生到达之前，护士应根据病情作出初步诊断，给予必要的紧急处理，如通畅呼吸道、止血、建立静脉通路等。对语言障碍、听力障碍、意识不清的患者或婴幼儿，需暂留陪送人员，以便询问病史。

67. 答案：E

解析：外文缩写 PO，中文译意是口服。gn 为每晚 1 次。

68. 答案：B

解析：医务人员在诊疗活动中应当向患者说明病情和医疗措施。需要实施手术、特殊检查、特殊治疗的，医务人员应当及时向患者说明医疗风险、替代医疗方案等情况，并取得其书面同意不宜向患者说明的，应当向患者的近亲属说明，并取得其书面同意。以上相比，由患者丈夫签字最合适。

69. 答案：C

解析：肛瘘极少自愈，必须及时治疗，可采用堵塞法和手术治疗，肛瘘切除术为手术治疗的常见术式，是指切开瘘管并将痰管壁全部切除至健康组织，适用于低位单纯性肛瘘。堵塞法适用于单纯性肛瘘，用 0.5% 甲硝唑、生理盐水冲洗管后，自外口注入生物蛋白胶。

70. 答案：B

解析：根据病例，该患者已诊断为抑郁症。思维贫乏主要见于精神分裂症，不属于抑郁症的临床表现。抑郁症主要表现为持久性情绪低落，情绪低沉、苦恼忧伤，消极悲观，自杀观念与行为是严重抑郁的一个标志。身体可会出现乏力、疲劳、睡眠障碍、食欲减退等症状。

71. 答案：E

解析：该患者阑尾炎穿孔腹膜炎手术后，排便次数增多，混有黏液，伴有里急后重，故考虑该患者并发盆腔脓肿。发生在盆腔的脓肿由于刺激直肠，可有大便次数增多，混有黏液，伴里急后重等。膈下脓肿、盆腔脓肿、肠间脓肿多为阑尾炎未经及时治疗所导致，表现为术后 5~7 天出现压痛性肿块、麻痹性肠梗阻所致的腹胀及全身中毒症状。

72. 答案：A

解析：该患者休息时有胸闷、气急等症状，考虑为妊娠合并心脏病。妊娠合并心脏病患者在妊娠 32~34 周、分娩期及产后 3 天内全身血液循环变化最大、心脏负担最重的时期，极易诱发心力衰竭和心律失常。进入第二产程时产妇屏气腹压升高，能使内脏血液涌入心脏，肺循环压力增加，心脏负担最重，最易发生心力衰竭。病变程度严重、有发绀者往往由于缺氧，易发生胎儿生长受限、胎儿窘迫、早产。应保证充分休息，每天至少 10 小时睡眠且中午休息 2 小时，取左侧卧位或半卧位，避免劳累和情绪激动。

73. 答案：D

解析：胆囊结石患者可进食高蛋白、高维生素、高热量、低脂肪、易消化的食物，禁油腻、粗糙、辛辣饮食，戒烟、酒同时调节饮食种类，挑选符合口味的饮食，以增加食欲。

74.答案: A

解析: 急性再生障碍性贫血骨髓象为增生极度减低, 全血细胞减少, 为正细胞贫血, 皮肤出现紫癜, 该患者临床表现及骨髓象检查符合急性再生障碍性贫血诊断。

75.答案: E

解析: 糖皮质激素治疗期间患者抵抗力弱, 应尽量少到人多的地方, 以免引起感染; 在印刷厂工作接触的材料可能是引起特发性血小板减少性紫癜的因素, 应调换工种糖皮质激素治疗特发性血小板减少性紫癜主要是减少血小板抗体的生成、降低毛细血管脆性和刺激骨髓造血。对急性和慢性型的急性出血发作均有疗效。控制出血的作用明显, 多数患者在数天后出血停止, 两周内血小板数开始上升。但停药后易复发, 血小板正常后应小剂量维持 3~6 个月, 患者不可自行停药。

76.答案: B

解析: 患者行石膏绷带包扎后 3h 后出现手指发凉、发绀, 不能自主活动, 应考虑为石膏绷带包扎过紧, 导致手指供血不良导致。

77.答案: C

解析: 发生严重的输液反时应停止输液, 通知医生处理, 送检残液和输液器。

78.答案: D

解析: 患者在输液过程中出现肺栓塞, 最终导致死亡, 患者家属提出医疗事故鉴定申请。根据医疗事故处理条例第三十八条: 有下列情形之一的, 县级人民政府卫生行政部门应当自接到医疗机构的报告或者当事人提出医疗事故争议处理申请之日起 7 日内移送上一级人民政府卫生行政部门处理: 患者死亡; 可能为二级以上的医疗事故国务院卫生行政部门和省、自治区、直辖市人民政府卫生行政部门规定的其他情形。

79.答案: B

解析: 该患者因大便失禁致多次污染床单, 故应做好肛周皮肤护理。保持肛周皮肤清洁干燥, 必要时涂擦软膏保护, 预防皮肤破损、感染, 防止压疮。

80.答案: E

解析: 脑出血急性期一般不首先使用降压药物因患者血压升高是在颅内压增高的情况下, 为了保证脑组织供血出现的脑血管自动调节反应, 当颅内压下降后, 血压也随着下降, 故首先应脱水降低颅内压。但是, 当血压 $\geq 160/110\text{mmHg}$ 时, 为防止出血加重, 可在降低颅内压的同时慎重地采用降压治疗, 但幅度不可过大, 防止发生颅内低灌注。

81.答案: C

解析: 等渗电解质溶液有 0.9% 氯化钠、复方氯化钠溶液 (林格液)、乳酸钠林格液等。大量呕吐时, 平衡盐溶液 (乳酸钠林格液) 为最接近细胞外液的液体, 适合于迅速补充有效循环血量, 防止休克。

82.答案: C

解析: 血尿是膀胱肿瘤最常见、最早出现的症状, 常为间歇性全程无痛肉眼血尿, 全程肉眼血尿提示病变在膀胱。前列腺肿瘤约半数患者有肉眼血尿, 但肉眼血尿持续 1~2 周后转为镜下血尿。慢性肾小球肾炎尿液的主要特点为蛋白尿, 可有血尿, 但主要为镜下血尿。输尿管结石的典型表现为绞痛和镜下血尿, 血尿与活动有关。泌尿系感染的尿液特点为白细胞尿或脓尿, 可有镜下血尿。

83.答案: D

解析: 由疼痛特点和疼痛持续的时间基本判断该患者发生了心肌梗死, 护士在评估患者病情时应重点收集有无心绞痛病史, 而遗传史、吸烟史、酗酒史、生活习惯都是引起该患者临床表现的诱因, 不是直接因素。

84.答案: B

解析：大量饮酒和暴饮暴食是急性胰腺炎的第二位病因和重要诱因，也是导致其反复发作的主要原因。该患者大量饮酒后上腹部持续疼痛，考虑该患者为急性胰腺炎。腹痛是急性胰腺炎患者的主要表现和首发症状，疼痛剧烈而持续，护士应协助患者取弯腰屈膝侧卧位，减少腹部张力缓解疼痛。

85. 答案：A

解析：该患者表现为肢端发凉、怕冷及间歇性跛行，考虑为血栓闭塞性脉管炎。间歇性跛行是血栓闭塞性脉管炎局部缺血期的典型表现。肾上腺素常用于心肺复苏或过敏性休克抢救时使用，还可显著收缩皮肤、黏膜、肾等组织器官的血管，从而起到止血的作用。血栓闭塞性脉管炎患者下肢缺血，收缩血管可加重病情，肾上腺素是血栓闭塞性脉管炎的用药禁忌。治疗血栓闭塞性脉管炎可使用吗啡或哌替啶止痛，但易成瘾，应慎用，再配合血管扩张药烟酸、低分子右旋糖酐等，抑制血小板凝聚的药物阿司匹林、双嘧达莫等，亦可用 50% 硫酸镁外用湿敷，可达到消炎去肿的效果。

86. 答案：D

解析：根据题干描述，该患者在注射青霉素过程中发生了过敏性休克。一旦发生青霉素过敏性休克，应立即停止用药，协助患者平卧，保暖，报告医生：即刻皮下注射 0.1% 盐酸肾上腺素 0.5~1ml，以收缩血管、兴奋心肌、松弛支气管平滑肌等；给予氧气吸入，改善呼吸功能。

87. 答案：C

解析：肋骨骨折治疗要点为镇痛、固定胸廓和防治并发症。固定胸廓可采用多头胸带或弹性胸带固定。

88. 答案：B

解析：该患者为育龄妇女，其月经周期正常，经期延长，出现贫血，子宫正常大小等表现，可诊断为子宫内膜不规则脱落性功血。子宫内膜不规则脱落（黄体萎缩不全）即月经周期中有卵泡发育及排卵，黄体发育良好，但萎缩过程延长，导致子宫内膜不规则脱落，从而引起经期延长其主要表现为月经周期正常，但经后期出血，使经期可长达 9~10 天，出血量可增多，好发于产后或流产后。黄体功能不足可因黄体期孕激素分泌不足或黄体过早衰退，导致子宫内膜分泌反应不良，主要表现为月经周期缩短，月经频发，易并发不孕或妊娠早期流产史无排卵型功血（也称为无排卵性异常子宫出血）主要表现为月经周期乱、经期长短不一、流血量时多时少，甚至大量出血。稽留流产、不全流产应有明确的停经史，且子宫均小于孕周。

89. 答案：C

解析：该患儿将笔帽吸入气管，可出现吸气性呼吸困难。表现为吸气费力，吸气时间显著延长，鼻翼煽动，出现三凹征（即胸骨上窝、锁骨上窝和肋间隙或腹上角凹陷），由于上呼吸道部分梗阻所致，不可能出现呼气费力。

90. 答案：E

解析：糖尿病患儿在使用胰岛素治疗过程中应警惕低血糖的发生。低血糖反应多发生在服用胰岛素促泌剂和注射胰岛素等药物后，没有及时进食，其表现为疲乏、强烈饥饿感、出冷汗、脉速、恶心、呕吐，重者可致昏迷，甚至死亡。

91. 答案：A

解析：佝偻病患儿的健康指导：指导母乳喂养按时添加辅食，给予富含维生素 D、钙、磷和蛋白质的食物，如肝、蛋类、蘑菇等。维生素 D 注射制剂是油剂宜选择较粗的针头，操作轻柔以防断针指导家长带患儿多到户外活动，直接接受太阳照射。为预防患骨骼畸形和骨折，应避免过早过长时间地坐、站、走。

92. 答案：A

解析：阵发性剑突下钻顶样疼痛是胆道蛔虫病典型临床表现，剧烈的腹痛与轻微的腹部体征不相符是胆道虫病的特征。该患者阵发性剑突下钻顶样疼痛，查体剑突下压痛，无腹肌紧张，可考虑该患者为胆道蛔虫病。

93.答案：B

解析：该护士凭经验未查对药物，导致输错药物，造成患者死亡的行为属于过失犯罪。过失犯罪是应预见自己的行为可能发生危害社会的结果，因疏忽大意而没有预见，或已经预见而轻信能够避免，以致发生不良后果而构成犯罪。

94.答案：E

解析：小儿高热惊厥初次发病在2个月至5~6岁之间，在上呼吸道感染、发热性传染病等发热性疾病的初期，体温在38℃以上时突然出现惊厥，该患儿体温为39.5℃，所以该患儿最可能发生高热惊厥。

95.答案：C

解析：医嘱必须经医生签名后方为有效，如发现有明显错误的医嘱，护士有权拒绝执行，对有疑问的医嘱，护士不可盲目执行，必须核对清楚后再执行。

96.答案：B

解析：临时医嘱有效时间在24小时以内，一般只执行1次，有的需在限定时间内执行。临时备用医嘱仅在12小时内有效，必要时使用，只执行1次，过期未执行则失效。长期医嘱有效时间在24小时以上，医生注明停止时间后方失效。长期备用医嘱有效时间在24小时以上，必要时使用，医生注明停止时间后方失效。口头医嘱是指医生口头下达的医嘱，一般情况下不执行口头医嘱，紧急情况时，医生下达口头医嘱，执行护士应先复诵一遍，双方确认无误后方可执行，但医生要在6小时内补记在医嘱单上。

97.答案：B

解析：儿童生长发育的规律具有连续性和阶段性、不平衡性、顺序性、个体差异性和环境影响。

98.答案：D

解析：骨结核病多在发生病理性骨折、运动障碍时发现，主要侵犯脊椎骨、指骨及长骨骨髓（股骨下端和胫骨上端）等处。

99.答案：D.解析：国务院卫生主管部门负责全国的监督管理工作。县级以上地方人民政府卫生主管部门负责本行政区域内的监督管理工作。

100.答案：E

解析：慢性阻塞性肺疾病是一种具有气流受限特征的肺部疾病，主要为呼气时间延长。

101.答案：D

解析：产褥期妇女产后复查时间为产后6周，携婴儿进行产后健康检查。

102.答案：D

解析：X线检查可见膈下游离气体说明是空腔脏器穿孔，应为胃溃疡穿孔或其他空腔脏器溃疡穿孔。胆囊炎穿孔胆汁进入腹腔，不会有气体。

103.答案：B

解析：阿尔茨海默病（AD）是一组病因未明的原发性大脑退行性疾病，其发病与遗传因素有关，其主要表现为认知功能减退，如记忆障碍、失语、失用等，还可出现非认知性的精神症状，如妄想症，抑郁症，神经病理检查可出现AD患者的大脑皮层萎缩，脑回变平，脑沟增宽，脑室扩大，脑重量减轻。AD病程呈进行性，经历5~10年，积极治疗可减缓认知功能及社会功能下降的速度，病情不可逆。

104.答案：B

解析：根据世界卫生组织（WHO）规定白天病区较理想的噪声强度为 35~40dB，而我国规定病房白天噪声应控制在 40dB 以下。50~60dB 可影响休息和睡眠。90dB 以上的长时间暴露可导致焦躁、易怒、头痛、耳鸣、血压升高等症状噪声达到 120dB 可致听力损害。

105.答案：E

解析：3 岁小儿向妈妈执意表达自己的需要，其心理发展特征是明显自主性。1 岁左右的婴幼儿开始逐步认识作为生物实体的自我，2~3 岁时因社会经验和能力、语言的增长，逐步理解作为一个社会人的自我意识。

106.答案：B

解析：全血细胞是指红细胞、白细胞及血小板，白细胞根据形态差异可分为颗粒和无颗粒两大类，无颗粒的白细胞有淋巴细胞和单核细胞两种。颗粒白细胞（粒细胞中含有特殊染色颗粒，用瑞氏染料染色可分辨出三种颗粒白细胞即中性粒细胞、嗜酸性粒细胞和嗜碱性粒细胞。绝大部分的粒细胞是中性粒细胞。

107.答案：B

解析：白细胞也通常被称为免疫细胞，其主要作用是吞噬细菌、防御疾病。当病菌侵入人体体内时，白细胞能通过变形而穿过毛细血管壁，集中到病菌入侵部位，将病菌包围吞噬。绝大部分的粒细胞是中性粒细胞，中性粒细胞在抗感染中起重安的防御作用，嗜酸性粒细胞主要参与寄生虫的感染过程，淋巴细胞主要参与体内的免疫反应（B 对）

108.答案：B

解析：血小板在人体中主要参与止血、伤口愈合，血小板减少可导致出血。

109.答案：B

解析：护患关系的基本模式包括主动-被动型、指导合作型、共同参与型。该护士与患者的关系模式为指导-合作型。指导合作型是指护患双方在护理活动中都是主动的，但护士处于护患关系的主要方面，护患关系仍不平等；这种模式适用于病情较重但神志清楚、病程短的急性患者和外科手术术后恢复期的患者。主动-被动型是指护士处于主动的、主导地位，患者处于被动地接受护理的从属地位，是不平等的相互关系，适用于不能表达主观意愿的患者，如休克、昏迷等意识严重障碍患者，婴幼儿、智力严重低下及精神病患者。共同参与型是指护患双方都具有平等的权利，共同参与医疗护理的决策和实施，这种模式适用于受过良好教育的患者和慢性疾病患者如高血压、糖尿病等，了解自身所患疾病，有强烈的主动参与意识。

110.答案：D

解析：影响患者与责任护士沟通的因素不包括患者的籍贯。尊重是确保沟通顺利进行的首要原则。护士与患者沟通时，应尊重患者，顾及患者的感受，避免伤害患者的尊严，更不能侮辱患者的人格。在工作中护士应通过高尚的医德、熟练的护理技术和良好的服务态度，取得患者的信任，获得患者的配合，满足患者的需要。暂时性生理不适会暂时影响沟通效果，应在不适缓解后再进行沟通。

111.答案：E

解析：患者出院前的护理工作包括：通知患者和家属，办理出院手续根据患者的康复现状进行恰当适时的健康教育，指导出院后在休息、饮食、用药、功能锻炼、定期复查及心理调节等。自动出院的患者应在出院医嘱上注明“自动出院”并由家属签字确认征求患者意见以便改进护理工作质量：根据患者病情，采用适当的方法护送患者出院。

112.答案：D

解析：气性坏疽首要治疗是行清创引流。

113.答案：E

解析：患者抵抗力低下应给予保护性隔离，患者脾功能亢进可行脾切除，可应用抗生素抗感染如青霉素类，综合比较五项 E 项是最不合理的，不一定需要避光安静。

114.答案：B

解析：气性坏疽是由梭状芽孢杆菌所引起的一种严重急性特异性感染，主要发生在肌组织广泛损伤的病人，少数发生在腹部或会阴部手术后的伤口处。本病的防治包括早期彻底清创，敞开伤口，预防其发生。

115.答案：D

解析：十二指肠溃疡疼痛位置在上腹正中或稍偏右，疼痛时间为餐后 3~4h，为饥饿痛，夜间有明显上腹痛，进餐后可缓解（D 对）

116.答案：B

解析：患者有溃疡病史，突发剧烈腹痛，腹式呼吸表浅，肠鸣音消失，肝区浊音界消失，腹部呈板样强直伴压痛及反跳痛，考虑十二指肠球部溃疡穿孔。

117.答案：A

解析：皮试液浓度（ml）为：链霉素 2500 青霉素 200U 或 500U 破伤风抗毒素 150U。

118.答案：D

解析：该患者皮肤瘙痒，红肿，丘疹，应考虑其过敏的类型为荨麻疹。链霉素过敏时可表现为发热、荨麻疹、过敏性休克等。荨麻疹可由药物引起的机体变态反应而导致，表现为自觉皮肤瘙痒，出现大小不等、形态不规则的红色风团，重者伴心慌、烦躁、恶心、呕吐甚至血压降低等过敏性休克症状。

119.答案：E

解析：骨矿含量和骨矿密度测量是判断低骨量及确诊骨质疏松的重要手段，也是评价骨丢失率和疗效的重要客观指标。该患者骨密度测定低于正常年轻妇女峰值骨量，考虑该患者可能为骨质疏松症。维生素 D 可促进钙、磷在小肠内吸收，是预防骨质疏松的有效办法，因此服用多种维生素的药物不属于骨质疏松症的诱发因素。骨质疏松症是由于骨吸收过多或形成减少引起平衡失调，使骨丢失和骨质量下降所致。雌激素缺乏可使骨丢失加速，是绝经后骨质疏松症的主要病因。此外，骨质疏松症的发生还与遗传、高龄、肾功能减退、妊娠和哺乳、活性维生素 D 缺乏、钙摄入量不足、长期服用糖皮质激素、不良的生活方式和生活环境（如活动过少或过度运动、跌倒、吸烟、酗酒、高蛋白和高盐饮食、大量饮咖啡、光照减少等）有关。

120.答案：B

解析：泼尼松属糖皮质激素类长期大量使用可出现骨质疏松，其机制可能是抑制成骨细胞的活力，减少骨中胶原合成，促进胶原和骨基质的分解，使骨质形成发生障碍。骨质疏松症患者应补充钙剂和维生素 D，每天钙的总摄入量>800~1200mg，可同时服用维生素 D400~600u/d 雌激素是女性绝经后骨质疏松症的首选用药，可抑制破骨细胞介导的骨吸收，增加骨量。二磷酸盐、阿仑磷酸盐为抑制骨吸收药物，服药期间不加用钙剂。