

风湿与临床免疫学（中级）

〔专业代码:313〕

-
- 1、女性患者，16岁。晚餐进食一碗剩饭。1小时后出现上腹绞痛，并持续性恶心、呕吐。体温37.0度，上腹部压痛，肠鸣音活跃。白细胞总数正常、中性粒细胞占76%，便常规正常。诊断首先考虑为**急性胃炎**
 - 2、女性患者，20岁，持续高热1周，胸、腹部出现皮疹，经检查确诊为伤寒，其皮疹特征为**呈粉红色丘疹**
 - 3、急性细菌性痢疾的大便性状为**黏液性脓性鲜血便**
 - 4、男性患者，22岁，休克，测中心静脉压0.196kPa(2cm H₂O)，血压10.6/8kPa(80/60mmHg)，心率116次/分，尿量10ml/h，首选治疗为**补充血容量**
 - 5、上消化道出血呕出的血常呈咖啡样，这是因为**血液经胃酸作用而形成正铁血红蛋白所致**
 - 6、早期休克的表现为血压**11.97/9.31kPa(90/70mmHg)**
 - 7、估计血容量最好的指标是**中心静脉压**
 - 8、腹痛常放射至右肩的疾病是**胆系疾病**
 - 9、发绀的决定性因素是**血液中还原血红蛋白**
 - 10、男性患者，3岁，在独自玩玩具时突然出现刺激性咳嗽，呼吸困难，其病因最可能是**气管异物**
 - 11、女性患者，26岁，体检时发现舒张期杂音，伴第一心音亢进，在第二心音后有开瓣音，此种体征见于**二尖瓣狭窄**
 - 12、Virchow **淋巴结**指的是**左锁骨上淋巴结**
 - 13、咳嗽伴发热不常见于**自发性气胸**
 - 14、Dubin-Johnson 综合征属于**肝细胞对某些阴离子排泄障碍**
 - 15、预防偏头痛发作的常用药物是**苯噻啶**
 - 16、男性患者，28岁。近2年反复发作左下肢，红、肿、痛、热，用抗生素可缓解。查体：

二尖瓣区可闻及舒张期隆隆样杂音，左下肢肿胀，压之无痕，局部皮肤发红、皮温高，右下肢无异常。其肿胀的原因是慢性淋巴管炎所致水肿

17、正常淋巴结大小为 0.2~0.5cm

18、男性患者，24岁，下班途中突然倒地，意识不清，四肢阵发性手抽搐，小便失禁，约1分钟后逐渐清醒，最可能的病因是癫痫大发作

19、内源性致热源存在于单核细胞中

20、青年女性，参加工作1周，未进食早餐，紧张工作后突然晕倒，最可能的原因是低血糖休克

21、临床表现为突然无尿或间断无尿的肾功能不全患者，首先应考虑是肾后梗阻性疾病

22、检测HP感染属侵入法的是HP培养

23、呕吐伴眩晕、眼球震颤，应考虑是前庭器官疾病

24、男性患者，32岁，有十二指肠球部溃疡病史8年，一天前出现柏油便。检查：贫血。其贫血的类型为正细胞正色素性贫血

25、黏液性水肿患者，水肿主要表现为眼面

26、可出现周围性发绀的疾病是右心衰竭

27、女性患者，30岁，诉心悸胸闷。心尖区闻及收缩期杂音，经检查确诊为甲状腺功能亢进症，心脏无器质性病变，其心脏杂音应具有的特点是性质柔和

28、引起心源性休克最常见的病因是急性心肌梗死

29、男性患者，58岁，休息时突然出现右侧肢体无力，继而出现呼之不应。查体：深昏迷，压眶无反应，左侧瞳孔大于右侧瞳孔，血压24/12kPa。治疗首先考虑的是降颅压

30、男性患者，32岁，间断性上腹痛3年，时有反酸、嗝气，每于受凉后加重。近3天疼痛加重，今日患者突然呕咖啡样物500ml，同时感头晕、心悸，出汗。出血后腹痛缓解。患者出

血的原因考虑为**消化性溃疡**

31、头颅疼痛相对不敏感的结构是**视神经**

32、急性腹膜炎所致呕吐属于**反射性呕吐**

33、腹腔穿刺抽液最常用部位为**左下腹脐与髂前上棘连线的中外 1/3 处**

34、男性患者，32 岁，上腹部周期性节律性疼痛 2 周，今晨突然呕吐咖啡色液 2 次，解黑便 1 次，自觉头昏，乏力，出汗，心慌，脉率 96 次/分，该患者出血量估计为**<1000ml**

35、消化性溃疡常伴有**反酸、嗝气**

36、年轻人禁水 12 小时后，尿比重为 **1.025**

37、为及时治疗急性中毒，作为中毒诊断的主要依据是**毒物接触史+临床分析**

38、患者，女，56 岁，肝硬化伴大量腹腔积液，应首选的利尿剂为**螺内酯**

39、男性患者，28 岁，发热，关节疼痛半年，晒太阳后面部出现红斑。查体：全身淋巴结肿大，质软、活动、无压痛，尿蛋白(++)，抗链"O" (+)，抗核抗体阳性，抗双链 DNA 抗体阳性。

最可能的诊断为**全身坏死性淋巴结炎**

40、正常人每 24 小时进入小肠的液体量约为 **9L**

41、支气管扩张症往往于清晨或夜间变动体位时**咳嗽加重，并伴咳痰**

42、女性患者，23 岁，发作性头痛 5 年，每次头痛发作前出现眼前异彩，持续约 20 分钟，继之出现从一侧扩展到另一侧的头部跳痛。头痛睡眠后缓解，头颅 CT 正常，此时治疗首选药物

是**麦角胺咖啡因**

43、上消化道出血呕血常伴**黑便，而黑便不一定有呕血**

44、重度脾肿大的标准是**脾大，超过前正中线**

45、四肢对称性紫癜伴关节疼痛见于**血友病**

46、盐类泻药导泻的机制是使**肠腔内渗透压增高**

-
- 47、患者，女，20岁，昏睡、呕吐2小时，既往体健。查：皮肤潮红，呼吸不规则，有苦杏仁味，考虑可能为**氰化物中毒**
- 48、阿米巴痢疾的大便性状为**暗红色果酱样脓血便**
- 49、老年男性，在与人争吵后突然倒地不醒，最可能的病因是**脑血管意外**
- 50、男性患者，28岁，间断性上腹痛1年，以饥饿时和夜间为主，近1周腹痛加剧，伴黑粪，最可能的诊断是**十二指肠球部溃疡并出血**
- 51、引起干性咳嗽常见的疾病是**胸膜炎**
- 52、56岁女性，突发腹痛、发热，伴巩膜黄染，最可能的诊断是**急性胆囊炎**
- 53、23岁女性，查体可见下肢散在直径3~5mm皮下出血区，应称为**紫癜**
- 54、颅内高压症所致呕吐的特点是**喷射性，无恶心，呕吐后不轻松**
- 55、急性心肌梗死患者最常见的血细胞异常为**中性粒细胞增多**
- 56、中度脾肿大的标准为**脾肋下 $>2\text{cm}$ ，在脐平以上**
- 57、鉴别肾前性氮质血症和急性肾小管坏死有用的尿液诊断指标为**尿比重和尿渗透压**
- 58、左心功能不全呼吸困难产生的最主要因素是**肺淤血使气体弥散功能降低**
- 59、间停呼吸是由于**呼吸中枢兴奋性降低**
- 60、心浊音界变小，甚至叩不出见于**肺气肿**
- 61、毕奥呼吸常见于**呼吸中枢功能障碍**
- 62、甲状腺Ⅲ度肿大，表现为**肿大超过胸锁乳突肌外缘**
- 63、肝浊音界消失可见于**胃肠穿孔**
- 64、某患者，右胸痛，呼吸困难，喜右侧卧位。叩诊实音，呼吸音消失，最可能的诊断为**右侧大量胸腔积液**
- 65、提示左心室衰竭的是**交替脉**

-
- 66、女性患者，46岁，睡眠差，呼吸困难，常在正常呼吸中出现一次深大呼吸，其呼吸类型为 **Kussmaul 呼吸**
- 67、前区震颤是 **震颤系血液流经狭窄的瓣膜口或异常通道时产生的涡流所致**
- 68、男性患者，20岁，低热5天，右胸痛，深呼吸加剧，查体右侧呼吸音稍减弱，并闻及胸膜摩擦音，最可能的诊断为 **纤维素性胸膜炎**
- 69、痛风患者耳廓上见触痛性黄白色小结，原因为 **尿酸盐沉积**
- 70、黄疸、畏寒、发热、右上腹绞痛伴呕血，最可能是 **胆道结石伴梗阻**
- 71、对肝癌的诊断最有临床价值的是 **肝进行性肿大，表面不平**
- 72、呼吸深慢见于 **酸中毒**
- 73、外耳道中有血性或清亮液体流出，应考虑是 **颅底骨折**
- 74、发热伴皮肤黏膜出血、淋巴结肿大常见于 **急性白血病**
- 75、呼吸深快见于 **过度紧张**
- 76、2级高血压，血压水平为收缩压 **160~179mmHg**，舒张压 **100~109mmHg**
- 77、某患者，突发呼吸困难、发绀，右胸呈鼓音，呼吸音消失，最可能的诊断为 **右侧气胸**
- 78、面具面容见于 **震颤麻痹**
- 79、可在胸骨左缘第3~4肋间触及收缩期震颤的疾病是 **室间隔缺损**
- 80、正常成人胸廓前后径与左右径之比为 **1:1.5**
- 81、颅内出血，颅内压增高时可出现 **血压增高，呼吸浅慢**
- 82、一侧额纹和鼻唇沟变浅提示是 **面神经病变**
- 83、青年女性，间断发热20天，体温 $37.8\sim 39.3^{\circ}\text{C}$ ，查体面部蝶形红斑，肝脾大，此患者最可能的诊断为 **系统性红斑狼疮**
- 84、诊断 COPD 的必备条件是气流的不完全可逆受限，其确定标准是 **FEV1 < 80% 预计值**，

FEV1/FVC% < 70%

- 85、上消化道出血伴肝掌、蜘蛛痣、腹水，其出血原因为**食管胃底静脉曲张破裂**
- 86、心悸伴食欲增加、消瘦、出汗最常见于**甲状腺功能亢进**
- 87、呼吸有烂苹果味最常见于**糖尿病酮症酸中毒**
- 88、呕吐咖啡样液体最常见于**消化性溃疡**
- 89、女性患者，68岁，糖尿病3年，头昏乏力2个月，视力下降，眼科检查发现眼底动脉硬化，测血压168/80mmHg，尿蛋白(++)，最准确的诊断是**高血压2级，极高危**
- 90、服用阿司匹林后出现呕血，其原因是**急性胃黏膜病变**
- 91、男性患者，18岁，跑步或快步上楼后出现气喘，本人及周围的人可听到喘鸣声音，休息后逐步缓解，平时吸入烟雾也感胸闷、气急。门诊检查时患者呼吸平稳，双肺呼吸音清晰，心脏无杂音。提示最可能的病因是**支气管哮喘**
- 92、男性患者，58岁，吸烟20年，反复咳嗽咳痰8年，活动后气急3年，近日受凉后出现发热、咳嗽加剧，痰量多，白色泡沫样，查体双肺叩诊过清音，双肺底散在细湿啰音。提示最可能的病因是**慢性支气管炎急性加重**
- 93、女性患者，23岁，生气后突发呼吸困难，呼吸50次/分，伴手足抽搐，最可能的诊断是**癔病**
- 94、甲亢患者，FT3增高，FT4、TT4正常，应诊断为**T3型甲亢**
- 95、丁型肝炎病毒必需和**乙型肝炎病毒**在一起才可以感染人
- 96、右心衰竭引起呼吸困难的原因为**淤血性肝肿大等使运动受限而减少肺交换面积**
- 97、进食油腻食物后右上腹剧痛，辗转不安常见于**胆石症**
- 98、男性患者，34岁，骤起高热，持续几小时后大汗，体温降至正常，1天后再次出现高温骤起骤降，此患者诊断优先考虑是**疟疾**

-
- 99、典型的支气管哮喘的症状是**发作性喘息**
- 100、严密观察、精心治疗属于**手术后的道德要求**
- 101、医学行为是否有利于病人病情的缓解、治疗和康复是**医德评价的医疗标准**
- 102、**纪检监察纠风部门**负责对实施情况进行监督检查
- 103、组织实施医师资格考试的部门是**省级以上人民政府卫生行政部门**
- 104、对 MRSA 引起的肺炎首选抗生素是**万古霉素**
- 105、判断 COPD 患者病情轻重和病情发展趋势的最佳指标是**测定 FEV1%预计值**
- 106、支气管哮喘的肺功能异常，主要表现在**第一秒钟用力呼气量减少**
- 107、男性患者，20 岁。奔跑后出现呼吸困难，喘憋伴哮鸣音。查体双肺满布哮鸣音。诊断考虑为**运动性哮喘**
- 108、参与速发型支气管哮喘的主要免疫炎症细胞为**肥大细胞**
- 109、肺炎胸痛放射到上腹部时，病变常累及**膈胸膜**
- 110、慢性阻塞性肺气肿的主要症状为**逐渐加重的呼吸困难**
- 111、慢性肺源性心脏病发生的关键环节是**肺动脉高压**
- 112、胸腔抽液每次不宜超过 **1.0L 以上**
- 113、慢性支气管炎最重要的病因是**长期吸烟**
- 114、对于轻度和中度 AECOPD 患者，主要致病菌为**肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、卡他莫拉菌**
- 115、支气管哮喘与心源性哮喘不同点在于**咯粉红色泡沫痰**
- 116、胸腔积液抽液过程中出现剧咳、气促、大量泡沫痰、双肺满布湿性啰音，可能是**肺水肿**
- 117、**残气量，残气量/肺总量(%)**的测定对于诊断肺气肿最有价值
- 118、慢性支气管炎急性发作伴细菌感染时，最主要的临床表现是**咳脓性痰且痰量增加**

-
- 119、多数急性心肌梗死患者最早出现和最突出的症状是剧烈而持久的胸骨后疼痛
- 120、非器质性心脏病者一般不会出现室早二联律
- 121、风湿性心瓣膜病时最常被侵犯的瓣膜是二尖瓣
- 122、如果急性心肌梗死并发乳头肌断裂，出现的可能性最大的体征是心尖区出现收缩中晚期喀喇音和响亮的收缩期杂音
- 123、贫血与甲亢对心脏产生的影响使左室、右室容量负荷加重
- 124、风湿性心脏瓣膜病二尖瓣狭窄的特征性体征是心尖区舒张中晚期隆隆样杂音，递增型
- 125、收缩压 $\geq 140\text{mmHg}$ ，和（或）舒张压 $\geq 90\text{mmHg}$ 即诊断为高血压
- 126、左心衰竭的临床表现主要是由于肺淤血、肺水肿所致
- 127、硝酸异山梨酯的主要作用是扩张冠状动脉及外周静脉，降低心脏前负荷，减少心肌氧耗
- 128、降压作用缓慢，适用于轻中度高血压，降压同时使心律减慢的药物是美托洛尔
- 129、原发性高血压心脏并发症中首先出现的是心肌肥厚
- 130、女性患者，69岁。血压140/95mmHg，她的血压属于1级高血压
- 131、对风湿性二尖瓣关闭不全最具有诊断意义的体征是心尖区收缩期吹风样杂音
- 132、阵发性室上性心动过速患者的最佳治疗措施是静注毛花苷C
- 133、原发性高血压最常见的并发症是脑卒中
- 134、室性期前收缩次数为5次/分以上，可以诊断为"频发性室性期前收缩"
- 135、临床上抢救急性肺水肿给患者吸氧时，常在湿化瓶中加乙醇的目的是降低肺泡中泡沫的表面张力
- 136、心律失常在风湿性二尖瓣狭窄中常见的是心房颤动
- 137、引起左室压力负荷过重的是高血压
- 138、心肌梗死急性期患者，一旦出现室性期前收缩，应首选利多卡因

-
- 139、治疗高血压危象最好采用**硝普钠**
- 140、**排暗红色血便**证明仍有活动性出血
- 141、诊断消化性溃疡急性穿孔最有价值的临床表现是**肝浊音区消失**
- 142、急性胰腺炎时，尿淀粉酶在发病后**12~14**小时开始升高
- 143、肝癌引起的肝区疼痛的特点是**持续性钝痛或胀痛**
- 144、急性胰腺炎发病早期最敏感的指标是**血淀粉酶**
- 145、出血坏死型胰腺炎时的 Cullen 征是指**脐周皮肤青紫**
- 146、男性患者，35 岁。服用**吲哚美辛** 10 片后胃痛，今晨呕咖啡样胃内容物约 250ml 来诊，既往无胃病史。则首选的检查是**急诊胃镜**
- 147、女性患者，32 岁。突然发生右上腹阵发性绞痛，伴发热寒战，排柏油样便少量，查体急性面容，巩膜黄染。应考虑是**胆道出血**
- 148、胃癌的组织病理学分型中恶性程度最高的是**弥漫型癌**
- 149、十二指肠球后溃疡多发生在**十二指肠球部以下**
- 150、急性胰腺炎时，可减轻腹痛的体位是**弯腰抱膝位**