



2018年 临床执业医师考试真题



山东金英杰医学
SHANDONG JINYINGJIE



山东金英杰医学
SHANDONG JINYINGJIE



关注山东金英杰医学，查看更多医考资料



山东金英杰医学
SHANDONG JINYINGJIE

山东金英杰医学
SHANDONG JINYINGJIE

第一单元

A1 型选择题(1—43 题)

答 题 说 明

每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

- 要了解肾结核患者分肾功能、病变程度与范围。首选的检查方法是
A. CT 平扫
B. 静脉尿路造影
C. MRI
D. 逆行肾盂造影
E. B 超
- 不属于骨折特有体征的是
A. 畸形
B. 骨擦音
C. 局部肿胀
D. 局部异常活动
E. 骨擦感
- 下列抗菌药物中,可作为耐青霉素肺炎链球菌肺炎治疗首选的是
A. 阿奇霉素
B. 头孢曲松
C. 阿米卡星
D. 阿莫西林
E. 头孢呋辛
- 下列符合急性心包炎胸痛临床特点的是
A. 疼痛不放射
B. 随渗液量的增多而加重
C. 吞咽动作时减轻
D. 深呼吸时减轻
E. 咳嗽时加重
- 下列肺炎中最易并发肺脓肿的是
A. 真菌性肺炎
B. 干酪性肺炎
C. 金黄色葡萄球菌肺炎
D. 肺炎支原体肺炎
E. 肺炎链球菌肺炎
- 区别血红蛋白尿与血尿的主要方法是
A. 尿蛋白电泳
B. 尿比重
C. 尿沉渣镜检
D. 尿胆红素
E. 尿蛋白定性试验
- 尿路感染的易感因素不包括
A. 膀胱输尿管反流
B. 留置导尿管
C. 神经源性膀胱
D. 糖尿病
E. 青年男性
- 控制支气管哮喘气道慢性炎症最有效的药物是
A. 糖皮质激素
B. β_2 受体激动剂
C. 白三烯调节剂
D. M 受体拮抗剂
E. H 受体拮抗剂
- 关于骨软骨瘤临床表现的叙述,正确的是
A. X 线检查可见骨膜反应
B. 一般无症状,生长缓慢的骨性突起
C. 肿物与周围界线不清
D. 生长较快,伴明显疼痛
E. 肿块明显,皮肤有静脉怒张
- 支气管扩张患者因感染反复加重多次住院,再次因感染加重行抗感染治疗时,应特别注意覆盖的病原体是
A. 肠杆菌
B. 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌
C. 军团菌
D. 铜绿假单胞菌
E. 耐青霉素肺炎链球菌
- 关于原发性甲状腺功能减退症替代治疗,不正确的是
A. 从小剂量开始逐渐增至最佳剂量
B. 替代过程中需要定期监测

- C. 替代用量应注意个体化
D. 确诊后即刻足量替代
E. TSH 是评价疗效的最佳指标
12. 慢性阻塞性肺疾病患者存在的“持续气流受限”是指
A. 阻塞性通气功能障碍不能完全恢复
B. 支气管舒张试验阳性
C. 功能残气量显著增加
D. 支气管激发试验阳性
E. 存在限制性通气功能障碍
13. 主要引起动脉性肺动脉高压的疾病是
A. 睡眠呼吸障碍
B. 慢性阻塞性肺疾病
C. 二尖瓣狭窄
D. 特发性肺动脉高压
E. 肺动脉栓塞
14. 心尖部收缩中晚期喀喇音提示
A. 二尖瓣脱垂
B. 室壁瘤形成
C. 二尖瓣狭窄
D. 主动脉瓣关闭不全
E. 室间隔穿孔
15. Dugas 征表现阳性的是
A. 肩关节脱位
B. 肩锁关节脱位
C. 肱骨外科颈骨折
D. 肘关节脱位
E. 锁骨骨折
16. 股骨干下 1/3 骨折的典型移位是
A. 骨折远端向前移位
B. 骨折远端向前成角移位
C. 骨折远端向后移位
D. 骨折远端向内移位
E. 骨折近端向侧方移位
17. 下列不属于内分泌腺体功能减退常见原因的是
A. 肿瘤
B. 增生
C. 感染
D. 药物
E. 遗传
18. 目前最常用的评价肾小球滤过率的指标是
A. 尿 β_2 微球蛋白测定
B. 菊粉清除率
C. 内生肌酐清除率
D. 血肌酐
E. 血尿素
19. 低血糖症是指血浆葡萄糖浓度低于
A. 2.0mmol/L
B. 3.3mmol/L
C. 2.8mmol/L
D. 3.0mmol/L
E. 4.0mmol/L
20. 开放性气胸引起的病理生理紊乱表现为
A. 患侧胸膜腔压力高于大气压, 纵隔移向健侧
B. 患侧肺萎缩, 呼吸功能减退
C. 吸气时, 纵隔移向患侧
D. 呼气时, 患侧胸膜腔压力低于大气压
E. 引起反常呼吸运动, 导致呼吸、循环衰竭
21. 活动后左腰部绞痛, 伴肉眼血尿、恶心、呕吐。首先考虑的疾病是
A. 泌尿系结石
B. 慢性肾炎
C. 泌尿系肿瘤
D. 肾脏自发性破裂
E. 肾结核
22. 明确诊断肺血栓栓塞症首选的检查是
A. CT 肺动脉造影
B. 血 D-二聚体
C. 肺动脉造影
D. 肺通气灌注扫描
E. 超声心动图
23. 下列属于心力衰竭常见病因的是
A. 过度体力活动
B. 肺部感染
C. 精神紧张
D. 冠状动脉粥样硬化性心脏病
E. 洋地黄用量不当
24. 关于 Graves 病非浸润性突眼的描述, 下列正确的是
A. 病变常与甲亢治疗好转无关
B. 突眼是由于病变累及球后组织引起的
C. 患者常有视力疲劳、异物感、怕光、流泪等表现
D. 突眼常一般 $< 18\text{mm}$
E. 多有眼球胀痛、复视等
25. 治疗无血流动力学障碍的持续性室速, 下列药物应首选
A. 毛花苷丙
B. 腺苷
C. 利多卡因
D. 地尔硫革



- E. 比索洛尔
26. 属于感染性心内膜炎主要诊断标准的是
- A. 发热, 体温 $\geq 38^{\circ}\text{C}$
 - B. 细菌性动脉瘤
 - C. 原有心脏瓣膜病
 - D. 超声心动图发现赘生物
 - E. Osler 结节
27. 下列表现属于肺癌副癌综合征的是
- A. 一侧眼睑下垂、瞳孔缩小
 - B. 声音嘶哑
 - C. 胸壁静脉曲张
 - D. 吞咽困难
 - E. 杵状指
28. 尿道球部损伤合并尿外渗及阴囊血肿时, 有效的治疗方法是
- A. 导尿
 - B. 经会阴尿道吻合 + 清除血肿及尿外渗
 - C. 清除会阴部血肿
 - D. 耻骨上膀胱造瘘
 - E. 经会阴尿道修补
29. 35 岁前心脏性猝死的主要原因是
- A. 心肌病
 - B. 心脏瓣膜病
 - C. 心包炎
 - D. 长 QT 综合征
 - E. 先天性心脏病
30. 痛风患者合并泌尿系结石, 最可能是
- A. 碳酸盐结石
 - B. 尿酸结石
 - C. 黄嘌呤结石
 - D. 草酸钙结石
 - E. 磷酸盐结石
31. 低钾血症时利尿剂首选
- A. 氢氯噻嗪
 - B. 丁尿胺
 - C. 呋达帕胺
 - D. 呋塞米
 - E. 螺内酯
32. 变异型心绞痛抗心肌缺血治疗, 首选的药物是
- A. 抗血小板药
 - B. 长效硝酸酯类
 - C. 钙通道阻滞剂
 - D. β 受体阻滞剂
 - E. 低分子肝素
33. 关于原发性骨肿瘤的说法, 不正确的是
- A. 影像学发现骨质溶解、不规则破坏则恶性可能较大
 - B. 良性骨肿瘤突发疼痛, 可能出现了恶变或病理性骨折
 - C. 长管状骨恶性肿瘤行截肢术能保证肿瘤被彻底切除, 减少转移
 - D. 原发性骨肿瘤良性比恶性多见
 - E. 术后辅以放化疗可以提高部分恶性骨肿瘤的生存率
34. 对上、下尿路感染无鉴别意义的是
- A. 尿白细胞管型
 - B. 尿渗透压
 - C. 抗体包被细菌
 - D. 肾区叩痛
 - E. 尿培养
35. 可使梗阻性肥厚型心肌病患者的胸骨左缘 3 ~ 4 肋间收缩期杂音减轻的方法是
- A. 取站立位
 - B. 做 Valsalva 动作
 - C. 含服硝酸甘油
 - D. 应用强心药
 - E. 口服 β 受体拮抗剂
36. 慢性左心功能衰竭急性加重的最常见诱因是
- A. 输液过多
 - B. 输液过快
 - C. 心肌缺血
 - D. 情绪激动
 - E. 感染
37. 支气管哮喘患者出现气流受限的原因不包括
- A. 肺泡弹性回缩力下降及肺泡壁破坏
 - B. 腺体分泌亢进及黏液清除障碍
 - C. 气道壁炎性细胞浸润
 - D. 气道黏膜水肿
 - E. 气道平滑肌痉挛
38. 最有助于确定支气管扩张咯血患者出血部位的检查是
- A. 支气管镜
 - B. 肺动脉造影
 - C. 支气管动脉造影
 - D. 胸部高分辨 CT
 - E. 胸部增强 CT
39. 全身粟粒性结核病常常是肺结核经哪种途径播散的结果
- A. 淋巴道
 - B. 血道
 - C. 支气管

- D. 潜伏的病菌重新繁殖
E. 沿组织间隙蔓延
40. 急性尿潴留患者, 首选的处理方法是
A. 耻骨上膀胱穿刺抽吸尿液
B. 导尿管导尿
C. 热敷
D. 针灸
E. 膀胱穿刺造瘘
41. 脊柱结核主要的 X 线表现是
A. 椎弓根骨质破坏和椎间隙正常
B. 椎体骨质增生和椎间隙狭窄
C. 脊柱竹节样改变
D. 椎体骨质破坏和椎间隙狭窄
E. 椎体骨质破坏和椎间隙增宽
42. 风湿性心瓣膜病并发感染性心内膜炎时, 最支持感染性心内膜炎诊断的是
A. 体温 38.5℃
B. 胸痛并有胸膜摩擦音
C. 超声心动图显示有赘生物
D. 白细胞增高
E. 心电图 ST-T 改变
43. 属于左心衰竭临床表现的是
A. 活动后胸痛
B. 夜间阵发性呼吸困难
C. 眼睑水肿
D. 颈静脉怒张
E. 下肢水肿

A2 型选择题 (44—106 题)

答 题 说 明

每一道考题下面是一个小案例出现的, 其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案, 请从中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

44. 男, 22 岁。右上肢摔伤 4 小时。查体: 右上臂明显肿胀畸形, 肢体有缩短, 右腕不能背伸, 右手各指掌指关节不能伸直。X 线片示右肱骨干骨折, 骨折端有短缩位。最合适的治疗方案是
A. 手术切开复位内固定, 同时探查尺神经
B. 手术切开复位内固定, 同时探查桡神经
C. 手术切开复位内固定, 同时探查正中神经
D. 手法复位, 夹板外固定
E. 手法复位, 石膏外固定
45. 男, 56 岁。低热咳嗽, 咳痰 2 周, 胸部 X 线片示右肺下叶背段可见不规则斑片影及薄壁空洞。其内未见液平, 血常规正常, ESR 56mm/h。该患者首先考虑
A. 急性肺脓肿
B. 支气管扩张症
C. 肺结核
D. 肺癌
E. 金黄色葡萄球菌肺炎
46. 男, 28 岁。腰痛伴右下肢麻木疼痛 1 周。查体: 直腿抬高试验 (+)。CT 示 L4~5 椎间盘向右后侧突出, 压迫硬膜囊。目前首选的治疗方法是
A. 椎板减压髓核摘除术
B. 经皮髓核切吸术
C. 腰背肌功能锻炼
D. 腰椎内固定植骨融合术
E. 卧床休息、理疗
47. 男, 60 岁。发现心脏杂音 40 年。查体: 胸骨左缘第 3 肋间闻及舒张期叹气样杂音向心尖部传导, 周围血管征阳性。胸部 X 线片最可能出现的心影外形是
A. 球形
B. 靴形
C. 梨形
D. 普大型
E. 烧瓶形
48. 男, 65 岁。间断活动时喘憋 1 年余, 憋醒。既往高血压病 8 年余, 糖尿病 4 年余。查体: BP 150/100mmHg, 双肺呼吸音清, 心率 76 次/分, 心律齐。患者经药物治疗症状好转, 为改善预后需要长期使用药物是
A. 利尿剂
B. 钙通道阻滞剂
C. 洋地黄类药物
D. 磷酸二酯酶抑制剂
E. 血管紧张素转换酶抑制剂
49. 男, 31 岁。受凉感冒后出现双下肢软, 不能活动 1 小时。既往有甲状腺疾病史。就诊时急查血 K⁺ 2.3 mmol/L。补钾后 3 小时症状缓解, 复查血 K⁺ 4.3 mmol/L。入院后第二天, 患者可能出现的检查结果
A. 24h 尿钾降低, 血 TSH 升高
B. 24h 尿钾正常, 血 TSH 降低

- C. 24h 尿钾降低,血 TSH 降低
 D. 24h 尿钾升高,血 TSH 降低
 E. 24h 尿钾升高,血 TSH 升高
50. 女,56 岁。“脑出血血肿清除术”后第 10 天出现发热、咳嗽、咳脓臭痰。体温最高达 39.5℃。查体:T 39℃,左肺呼吸音粗,右下肺呼吸音减弱。血 WBC $12.5 \times 10^9/L$,N 0.87。胸部 X 线片见右肺下叶背段团片状浓密阴影。该患者抗感染治疗可首选的方案是
- A. 口服阿奇霉素
 B. 静脉滴注头孢曲松
 C. 静脉滴注万古霉素
 D. 静脉滴注左氧氟沙星
 E. 静脉滴注哌拉西林/他唑巴坦
51. 女,60 岁。间断咳嗽、咳痰 10 年,加重 1 周,少量痰中带血 2 天。查体:双肺呼吸音粗,双肺底可闻及少量细湿啰音。血常规及胸部 CT 未见异常。肺功能:FEV₁/FVC 67% (舒张后),FEV₁ 占预计值 76%。该患者最可能的诊断是
- A. 肺结核
 B. 支气管哮喘
 C. 支气管肺癌
 D. 慢性阻塞性肺疾病
 E. 支气管扩张
52. 男,31 岁。3 天前进食时突发剧烈呛咳。无咳痰、咯血、呼吸困难。使用抗感染及镇咳药治疗后效果欠佳。查体:T 36.8℃,右肺可闻及局限性哮鸣音。该患者应首先考虑的诊断是
- A. 慢性阻塞性肺疾病
 B. 支气管结核
 C. 支气管哮喘
 D. 支气管肺癌
 E. 支气管异物
53. 男,60 岁。1 年前行经尿道膀胱肿瘤电切术,病理诊断为高级别尿路上皮癌。后未随访,3 天前因肉眼血尿两次入院,膀胱镜发现膀胱内肿物,直径 3.0cm。病理诊断仍为高级别尿路上皮癌,盆腔 CT 提示肿瘤侵及膀胱全层。最佳的治疗方案是
- A. 经尿道肿瘤电切
 B. 膀胱根治性切除术
 C. 化疗 + 支持治疗
 D. 化疗 + 放疗 + 支持治疗
 E. 膀胱部分切除术
54. 女,40 岁。畏寒、高热伴腰痛,尿频、尿急、尿痛 2 天。查体:左侧肾区有压痛和叩击痛。尿 WBC 40~50/HP,白细胞管型 5/LP。血 WBC $15.4 \times 10^9/L$,N 0.87。最可能的诊断是
- A. 尿道综合征
 B. 尿路结石
 C. 急性肾小球肾炎
 D. 急性膀胱炎
 E. 急性肾盂肾炎
55. 女,65 岁。2 型糖尿病病史 20 年。查体:BP 160/95mmHg,心率 65 次/分。实验室检查:血 Cr $160 \mu\text{mol/L}$,血 K⁺ 4.2mmol/L,尿蛋白(+)。该患者降压药应首选
- A. 血管紧张素 II 受体拮抗剂
 B. β 受体拮抗剂
 C. 利尿剂
 D. 钙通道阻滞剂
 E. α 受体拮抗剂
56. 男,22 岁。高处坠落受伤,出现颈部活动受限,四肢麻木无力,胸骨角平面以下痛觉消失,不能自主排尿。最可能的诊断是
- A. 腰椎骨折伴神经损伤
 B. 臂丛神经损伤
 C. 颅内出血
 D. 胸椎骨折脱位伴脊髓损伤
 E. 颈椎骨折脱位伴脊髓损伤
57. 女,22 岁。受凉后咳嗽、发热伴右侧胸痛 3 天。咳少量脓痰,急性病容。右下肺叩诊浊音,可闻及湿啰音,语音共振增强。血 WBC $12 \times 10^9/L$,N 0.80。最可能的诊断是
- A. 金黄色葡萄球菌肺炎
 B. 肺炎支原体肺炎
 C. 肺炎链球菌肺炎
 D. 干酪性肺炎
 E. 急性肺脓肿
58. 男,65 岁。左胸切口食管癌根治术后 2 小时,胸腔引出淡血性液体 500ml。查体:神志清楚,表情淡漠, BP 90/65mmHg。心电监护示 HR 110 次/分,SpO₂ 99%。辅助检查:Hb 130g/L。目前最适合的处理是
- A. 口服美托洛尔
 B. 开胸探查
 C. 输全血
 D. 快速补液
 E. 胸腔引流加负压吸引
59. 女,22 岁。突发右侧胸痛伴胸闷 1 小时。搬重物时突发右侧胸痛,疼痛剧烈,深呼吸时加重,伴刺激性咳嗽,继之出现胸闷,急性加重。BP 100/65mmHg。最可能的诊断是

- A. 自发性气胸
B. 心肌梗死
C. 肋间神经痛
D. 主动脉夹层
E. 肺栓塞
60. 男孩,4岁。跑跳后左膝痛1周,未经诊治,1天前疼痛加重,伴发热,呕吐。查体:T 39.6°C, P 160次/分,左膝强迫微屈位,局部压痛(+),肿胀不明显。实验室检查:血 WBC $25 \times 10^9/L$, N 0.92。患膝及小腿X线片均未见异常。最可能的诊断是
A. 急性蜂窝织炎
B. 急性风湿性关节炎
C. 恶性肿瘤
D. 急性血源性骨髓炎
E. 半月板损伤
61. 男,65岁。慢性阻塞性肺疾病20年,突发病情加重1天。查体:T 36.7°C,端坐位,口唇发绀。右侧胸廓略膨隆,双肺叩诊呈过清音,右肺语颤明显减弱、呼吸音减弱,该患者呼吸困难加重最可能的病因是
A. 肺血栓栓塞症
B. 胸腔积液
C. 自发性气胸
D. 心力衰竭
E. 痰液阻塞
62. 女,40岁。双下肢水肿9天,尿量减少2天。查体:双下肢重度水肿。尿蛋白(+++),血 Alb 17g/L,给予口服泼尼松、间断静脉滴注白蛋白及呋塞米。应用白蛋白的目的为
A. 治疗原发病
B. 控制血压
C. 补充营养
D. 缩短激素的治疗
E. 提高血浆胶体渗透压
63. 男,45岁。高处坠落伤7小时,伤后未排尿,查体:神志清,BP 80/55mmHg,血氧饱和度90%,颈部、背部、腰部、胸部无压痛,心率122次/分,腹部无压痛、肌紧张,上肢感觉活动正常,骨盆分离挤压(+),髌关节活动受限,大腿见多处皮肤擦伤并有沙粒污染,下肢感觉运动正常,入院后首先要进行的处理是
A. 立即留置导尿
B. 临时固定骨盆
C. 立即清创,防止创面感染
D. 立即开通静脉补液通路
E. 立即完善相关检查,明确诊断
64. 男,71岁。活动时胸痛2天,停止活动后症状可迅速缓解。查体:BP 100/60mmHg。心电图示 $SV_1 + RV_5 > 4.0mV$,超声心动图示室间隔厚度1.5cm,左室后壁厚度1.5cm。最有诊断价值的体征是
A. 主动脉瓣区 S_2 减弱
B. 主动脉瓣区 S_2 逆分裂
C. 主动脉瓣区收缩期杂音
D. 心尖部闻及 S_4
E. 心尖抬举样搏动
65. 男,56岁,既往吸烟30年,活动后气短、乏力伴间断胸部咳嗽、咳少量白黏痰半年。查体:未见阳性体征,血常规大致正常。X线片检查肺纹理增粗,肋间隙增宽。对诊断最有意义的检查是
A. 超声心动图
B. 动脉血气分析
C. 胸部CT
D. 肺功能
E. 支气管镜
66. 男,24岁。发热伴心前区锐痛3天,3天前出现发热,体温38°C左右,伴心前区锐痛,休息后未减轻。既往体健。查体:BP100/60mmHg,双肺呼吸音清,心率107次/分,胸骨左缘第3肋间可闻及粗糙的双相性搔刮样声音。该患者疼痛最可能的病因是
A. 肺癌
B. 气胸
C. 主动脉夹层
D. 急性心包炎
E. 急性心肌梗死
67. 男,65岁。发热,咳嗽4天。查体:T 39°C,口唇发绀,双下肺可闻及湿啰音。既往体健,否认肺部疾病病史, SpO_2 85%,肺部X线片示双下肺感染,可作为经验性抗感染治疗首选的药物是
A. 三代头孢菌素
B. 碳青霉烯类
C. 大环内酯类
D. β -内酰胺类/ β -内酰胺酶抑制剂+喹诺酮类
E. 氟喹诺酮类+氨基糖苷类
68. 女,35岁。逐渐出现活动力下降半年,类风湿性关节炎病史5年,经规律使用NSAIDs药物症状控制尚可。查体:口唇略苍白,双肺呼吸音清,未闻及干湿啰音,心率85次/分, P_2 亢进,分裂,三尖瓣听诊区可闻及2/6级收缩期杂音,双下肢无水肿,该患者最可能出现的情况是
A. 肺血栓栓塞症
B. 间质性肺炎
C. 肺动脉高压
D. 贫血性心脏病



E. 感染性心内膜炎

69. 女, 31 岁。1 周前出现颈部痛和低热, 未加注意, 症状加重后来门诊检查, 发现甲状腺明显肿大, 触之疼痛, 有结节, 首先考虑的诊断是

- A. Graves 病
- B. 慢性淋巴细胞性甲状腺炎
- C. 亚急性甲状腺炎
- D. 甲状腺肿
- E. 甲状腺癌

70. 男, 22 岁。乏力, 纳差 1 个月, 水肿, 少尿伴血压升高 1 周, 尿蛋白 (+ +), 尿 RBC 30 ~ 50/HP, 血 Hb 76g/L, 补体 C3 正常, 肌酐 421 μmol/L。B 超提示双肾增大, 血清抗肾小球基底膜抗体阳性, 最可能的诊断是

- A. 急进性肾小球肾炎 II 型
- B. 急性肾小球肾炎
- C. 急进性肾小球肾炎 III 型
- D. 急进性肾小球肾炎 I 型
- E. 急性肾小管坏死

71. 女, 56 岁。干咳、呼吸困难 2 周, 逐渐加重, 现不能平卧, 无发热。查体: R 24 次/分, BP 85/70mmHg, 端坐位, 颈静脉怒张, 双肺呼吸音清, 心脏浊音界向两侧扩大, 心率 108 次/分, 心律齐, 心音低而遥远, 心脏各瓣膜听诊区未闻及杂音, 奇脉。心电图: 窦性心动过速, 各导联 QRS 波低电压, 该患者最关键的治疗方案是

- A. 口服美托洛尔
- B. 静脉滴注硝酸甘油
- C. 静脉注射呋塞米
- D. 静脉滴注多巴胺
- E. 心包穿刺

72. 女, 56 岁。急刹车受伤致髌关节剧痛 3 小时。查体: 右髌关节活动受限, 屈曲内收、内旋畸形, 右髌关节屈伸活动障碍, 最可能的损伤是

- A. 髌关节前脱位合并股神经损伤
- B. 髌关节后脱位
- C. 髌关节骨折
- D. 髌关节后脱位合并闭孔神经损伤
- E. 髌关节后脱位合并坐骨神经损伤

73. 男, 22 岁。右腹部胀痛伴血尿 3 月余, KUB + IVU 诊断右肾盂结石, 大小 1.8cm × 1.2cm, 右肾轻度积水, 肾功能正常, 首选的治疗方法是

- A. 药物排石
- B. 体外冲击波碎石 (ESWL)
- C. 右肾盂切开取石术
- D. 经皮肾镜激光碎石

E. 抗感染

74. 男, 71 岁。反复活动时心前区疼痛 3 个月, 5 小时前情绪激动时再次发作, 持续不缓解, 高血压病史 10 年。查体: BP 110/65mmHg, 双肺呼吸音清, 心率 96 次/分, 心律齐, 未闻及杂音, 血清肌钙蛋白升高, 心电图 V₁ ~ V₄ 导联 ST 段压低 0.1mV, T 波低平, 不适宜的治疗措施是

- A. 抗血小板及抗凝治疗
- B. 硝酸酯类药物
- C. 溶栓治疗
- D. β 受体拮抗剂
- E. 他汀类药物

75. 患者, 女, 71 岁。急性前壁心肌梗死 2 天, 轻微活动后喘憋。查体: BP 100/60mmHg, 双肺底可闻及少量细湿啰音, 心率 102 次/分。该患者的心功能分级为

- A. Killip 分级 I 级
- B. Killip 分级 III 级
- C. NYHA 分级 III 级
- D. Killip 分级 II 级
- E. NYHA 分级 II 级

76. 女, 22 岁。阵发性心悸、头痛、大汗 3 月余, 多在体位变化, 情绪激动时发作, 体重减轻约 5kg, 发作时面色苍白, 多汗, 血压最高时达 220/110mmHg, 心率 100 次/分, 静注酚妥拉明后 1 分钟血压可降至 150/100mmHg, 肾上腺 CT 示右肾上腺有一直径约 5cm 类球形占位。最可能的诊断是

- A. 肾病综合征
- B. 嗜铬细胞瘤
- C. 库欣综合征
- D. 甲状腺功能亢进
- E. 原发性醛固酮增多症

77. 女, 65 岁。体检时胸部 X 线右下肺直径约 2cm 大小的类圆形结节影, 患者无自觉症状, 否认吸烟史, 查体: 双肺呼吸音清, 未闻及干湿啰音, 为进一步明确诊断, 下列检查中应首选的是

- A. 痰细胞学检查
- B. 血清肿瘤标志物
- C. 支气管镜检查
- D. 胸部增强 CT
- E. 密切观察, 定期复查胸部 X 线片

78. 男, 56 岁。发热、咳嗽伴呼吸困难 3 天, 慢性阻塞性肺疾病 10 年。查体: T 38℃, 胸部 X 线示右上肺大片状影, 其内可见多个透亮区, 痰涂片革兰染色阳性球菌, 成簇分布, 该患者肺部最可能感染的病原菌是

- A. 金黄色葡萄球菌
B. 卡他莫拉菌
C. 溶血性链球菌
D. 厌氧菌
E. 肺炎链球菌
79. 男, 65 岁。活动时心前区闷痛 2 年, 加重 3 天, 休息 3~5 分钟后缓解, 每天发作 1~2 次, 近 3 天症状加重, 每天发作 3~4 次, 每次发作持续时间 15~20 分钟, 2 年来规律服用阿司匹林和单硝酸异山梨酯, 糖尿病史 8 年, 吸烟 20 余年, 血总胆固醇 6.5mmol/L, 肌钙蛋白 I 正常, 心电图 II、III、aVF 导联 ST 段下斜型压低 0.3mV, 就目前临床资料, 该患者最可能的诊断是
- A. 恶化型心绞痛
B. 静息型心绞痛
C. 变异型心绞痛
D. 初发型心绞痛
E. 非 ST 段抬高型心肌梗死
80. 男, 65 岁。1 小时前突发晕厥, 意识恢复后自觉胸闷、气短。1 周前行髌关节置换术治疗, 否认高血压、心脏病病史。查体: BP 90/65mmHg, 双肺呼吸音清, 未闻及干湿啰音。心率 96 次/分, P₂ 亢进, 对明确诊断最有价值的检查是
- A. 动脉血气分析
B. 头颅 CT
C. 超声心动图
D. 血 D-二聚体
E. CT 肺动脉造影
81. 男, 60 岁。体检时 B 超发现左肾下极不均质的中等回声实性肿块, CT 增强扫描显示左肾下极恶性肿瘤, 直径 3.5cm, 右肾萎缩。最适宜的治疗是
- A. 左肾切除术
B. 左肾动脉栓塞术
C. 左肾根治性切除术
D. 密切观察
E. 左肾部分切除术
82. 男, 65 岁。心房颤动及高血压病史 5 年, 糖尿病 2 年, 1 年前曾发作言语不利伴肢体活动障碍, 该患者长期抗栓治疗的药物应是
- A. 低分子肝素
B. 华法林
C. 双嘧达莫
D. 氯吡格雷
E. 阿司匹林
83. 男, 65 岁。4 小时前情绪激动后突发极度气急, 咳白色泡沫痰, 伴大汗, 不能平卧, 既往高血压病史 15 年, 无慢性支气管炎病史。查体: 200/120mmHg, 神志清, 表情焦虑, 口唇发绀, 双肺可闻及喘鸣音及湿啰音, 心率 110 次/分, 心律齐, 心脏及各瓣膜听诊区未闻及杂音, 该患者的抢救措施不正确的是
- A. 皮下注射吗啡
B. 口服美托洛尔
C. 取坐位、吸氧
D. 静脉注射呋塞米
E. 静脉注射硝普钠
84. 女, 45 岁。1 天前感冒后出现发热, 全身无力, 厌食, 口渴, 既往席汉综合征 15 年。口服泼尼松 5mg/d 治疗。查体: T 38.1℃, BP 82/40mmHg, 神志淡漠, 肺部听诊未见异常, 心率 92 次/分, FBG (空腹血糖) 3.3mmol/L, 目前最有效的治疗是
- A. 静脉补液治疗
B. 静注葡萄糖
C. 静注升压药物
D. 静注氢化可的松
E. 口服泼尼松增加剂量
85. 男, 22 岁, 学生。受凉后畏寒、高热 3 天, 右胸痛及右上腹痛 2 天, 深吸气时加剧。查体: T 39.5℃, P 120 次/分, R 36 次/分, BP 80/50mmHg, 巩膜轻度黄染, 右下肺叩诊浊音, 右下肺可闻及支气管呼吸音, 心率 120 次/分, 心律不齐, 偶有期前收缩, 中上腹轻度压痛, 肢端湿冷, 此患者除抗感染治疗外, 应首先采取的诊疗措施是
- A. 液体复苏
B. 胸腹部 CT 检查
C. 机械通气治疗
D. 静脉注射碳酸氢钠
E. 急诊腹部 B 超检查
86. 女, 31 岁。发热伴刺激性干咳 3 天, 一周前陪伴 5 岁女儿住院, 女儿 4 天前好转已出院。查体: T 38.5℃, 心肺正常, 血常规正常, 胸部 X 线片示右下肺少许薄片状阴影, 该患者经验性治疗首选的药物是
- A. 阿莫西林
B. 阿奇霉素
C. 头孢呋辛
D. 奥司他韦
E. 阿米卡星
87. 男, 71 岁。突发胸闷, 气短, 呼吸困难 2 小时。查体: 平卧位, 双肺可闻及湿啰音, 应首先完成的辅助检查是
- A. B 型钠尿肽

- B. 动脉血气分析
C. 心电图
D. 超声心动图
E. 胸部 X 线片
88. 女, 56 岁。4 年前车祸外伤导致左股骨颈骨折, 急诊行闭合复位螺钉内固定术, 1 年前逐渐出现左髋疼痛, 行走时加重, 髋部活动受限, 最可能出现的情况是
A. 髋关节感染
B. 股骨头坏死
C. 股骨颈骨折不愈合
D. 骨关节炎
E. 股骨颈再次骨折
89. 女, 3 岁。被牵拉前臂后, 出现肘部疼痛, 不愿用手取物, 桡骨近端压痛。X 线片检查未见骨折征象。最适宜的治疗方法是
A. 手法复位
B. 外敷药物
C. 切开探查
D. 石膏固定
E. 肩部固定带悬吊
90. 男, 19 岁。初发肾病综合征, 应用泼尼松 60mg/d 治疗 8 周, 水肿无明显好转。复查尿蛋白仍大于 3.5g/d, 肾活检提示微小病变型肾病。下一步最适宜的治疗是
A. 加入入血白蛋白
B. 大剂量静脉使用免疫球蛋白
C. 加用 ACEI
D. 加用免疫抑制剂
E. 增加泼尼松剂量
91. 男, 56 岁。右侧阴囊部隐痛 2 个月。查体: 右侧阴囊比左侧稍增大, 触之有硬结与睾丸粘连, 边界不清, 有轻微触痛, 首先应考虑的诊断是
A. 睾丸结核
B. 睾丸肿瘤
C. 腹股沟斜疝
D. 睾丸鞘膜积液
E. 睾丸炎
92. 女, 45 岁。颈肩部伴左上肢放射痛 1 周。查体: Eaton 试验 (+)。颈部 MRI 显示 C5~6, C6~7 椎间盘向左后突出 5mm, 关节突增生。颈椎斜位 X 线检查显示 C5~6 椎间孔稍变窄。首选的治疗措施是
A. 颈横肌锻炼
B. 椎板切除减压术
C. 前路椎间盘切除
D. 后路椎间盘切除
E. 颌枕吊带牵引
93. 女, 28 岁。心悸 3 天。约 2 周前曾咳嗽、流涕。查体: 心界不大, 心率 96 次/分, 可闻及早搏 10 次/分。心脏各瓣膜听诊区未闻及杂音和附加音。心电图示频发室性期前收缩。血清肌钙蛋白升高。该患者最可能的诊断是
A. 病毒性心肌炎
B. 感染性心内膜炎
C. 急性心肌梗死
D. 急性心包炎
E. 风湿性心脏病
94. 男, 65 岁。反复劳力性胸痛 3 月余。每次持续 5~10 分钟, 休息 2~3 分钟可自行缓解, 既往体健。查体: BP 150/90mmHg, 心率 110 次/分, 心律齐, 心电图示窦性心律。为控制心率宜首选的药物是
A. 普罗帕酮
B. 美西律
C. 维拉帕米
D. 胺碘酮
E. 美托洛尔
95. 男, 60 岁。突发持续性胸痛 5 小时。查体: BP 100/50mmHg, 心率 40 次/分, 心律齐。心电图示急性下壁、右室心肌梗死, 三度房室传导阻滞。最适宜的治疗措施是
A. 静脉滴注异丙肾上腺素
B. 静脉滴注肾上腺素
C. 静脉滴注多巴酚丁胺
D. 植入临时心脏起搏器
E. 植入永久心脏起搏器
96. 男, 45 岁。进行性呼吸困难半年。无咳嗽, 咯血及胸痛。查体: BP 110/75mmHg, 口唇发绀, 颈静脉怒张。双肺呼吸音清, 心界无扩大, 心率 92 次/分。P₂ 亢进, 三尖瓣区可触及抬举样搏动。双下肢轻度水肿。为明确诊断, 首选的检查是
A. 超声心动图
B. 心电图
C. 肺通气/灌注扫描
D. 肺功能
E. CT 肺动脉造影
97. 男, 15 岁。2 个月无意中发现右小腿近端肿物, 无疼痛及活动障碍。查体: 右小腿近端可触及约 3cm×2cm 肿物, 质地较硬, 无活动, 无明显压痛。X 线检查见右胫骨干垢端有蒂的骨性突起, 无骨质破坏及骨膜反应, 最适宜的处理方法为
A. 中药外敷

- B. 切开取病理
C. 随诊观察
D. 穿刺活检
E. 手术切除
98. 男,60岁。尿频半年,夜尿3~4次。直肠指检:前列腺增大,局部质地偏硬,未触及硬结,血清PSA 16.7ng/ml;B超提示前列腺增生,残余尿量为20ml,CT尿路造影(CTU)显示双肾无积水,前列腺增生,下一步诊治方案应首选
A. 经尿道前列腺电切
B. 药物治疗
C. 前列腺穿刺活检
D. 根治性前列腺切除
E. 经尿道球囊高压扩张术
99. 女,80岁。高血压病史20年。间断头晕。既往有痛风史。查体:BP 180/90mmHg,心率52次/分,心律齐,心脏各瓣膜听诊区未闻及杂音。实验室检查:血肌酐 $100\mu\text{mol/L}$,血钾正常。该患者的最适宜降压治疗方案是
A. 缬沙坦与美托洛尔
B. 氨氯地平与美托洛尔
C. 缬沙坦与氢氯噻嗪
D. 氨氯地平与氢氯噻嗪
E. 缬沙坦与氨氯地平
100. 男,65岁。人工膝关节置换术后膝关节周围加压包扎。1天后发现右足不能背屈,跖屈正常,足背动脉搏动正常。最可能的原因是
A. 腓总神经损伤
B. 坐骨神经损伤
C. 深静脉血栓
D. 胫神经损伤
E. 骨筋膜室综合征
101. 女,35岁。间断咳嗽,咳痰10余年,加重5天。每次发作均咳出大量脓性痰,5天前再次发作,并逐渐加重,普查胸部X线片示右下肺多发薄壁囊腔,部分可见液平。查体:右下肺可闻及湿啰音,该患者最可能的诊断是
A. 肺囊肿
B. 慢性肺脓肿
C. 肺包虫病
D. 支气管扩张
E. 纤维空洞性肺结核
102. 女,65岁。右膝关节内侧严重疼痛,下蹲和下楼困难,步行距离500米。查体:右膝关节明显内翻畸形,屈伸受限,关节活动度(ROM) $100^{\circ}\sim 200^{\circ}$ 。负重位双膝关节X线片显示右膝内侧间隙明显狭窄,关节周边骨赘增生,关节软骨磨损,关节面硬化,股骨上下极骨赘形成。最合适的治疗方案是
A. 人工膝关节置换术
B. 关节镜清理术
C. 关节腔药物注射
D. 关节融合术
E. 口服非甾体抗炎药
103. 男,35岁。2个月前因风湿性心脏病主动脉瓣狭窄并关闭不全性主动脉瓣膜置换术,术后30天出现发热,体温波动于 $38\sim 39^{\circ}\text{C}$ 。查体:主动脉瓣听诊区可闻及舒张期杂音,脾大,两次血培养均(+),该患者最可能的诊断是
A. 感染性心内膜炎
B. 术后吸收热
C. 结核病
D. 肺部感染
E. 急性风湿热
104. 男,31岁。乏力、皮肤颜色变黑2年,1周前受凉后出现恶心、呕吐。血 Na^{+} 120mmol/L ,血 K^{+} 5.8mmol/L 。该患者最可能的病变部位是
A. 肾上腺
B. 肾脏
C. 垂体前叶
D. 垂体后叶
E. 下丘脑
105. 男,22岁。剧烈活动时突发心悸1小时。既往体健。BP 90/60mmHg,心电图示心室率220次/分,节律较规整,QRS波群时限0.16秒,可见心室夺获和室性融合波。最可能的诊断是
A. 室性心动过速
B. 心房扑动
C. 房性心动过速
D. 窦性心动过速
E. 阵发性室上性心动过速
106. 男,65岁。反复咳嗽、咳痰20年,加重伴心悸、气短1周,咳大量脓痰,心悸、气短于夜间平卧时更明显,高血压病史3年。查体:BP 150/90mmHg,双肺呼吸音低,三尖瓣区可闻及3/6级收缩期杂音。脊柱后凸畸形,心电图示 $\text{RV}_1 + \text{SV}_5 = 1.18\text{mV}$,右束支传导阻滞。该患者最可能的诊断是
A. 风湿性心脏瓣膜病
B. 原发性心肌病
C. 高血压性心脏病
D. 冠心病
E. 慢性肺源性心脏病

A3/A4 型选择题 (107—133 题)

答 题 说 明

以下提供若干个案例,每个案例下设若干道试题。请根据案例提供的信息,在每一道试题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(107—108 题共用题干)

男,71 岁。间断咳嗽、咳痰 20 余年,加重伴喘憋 1 周,近 2 天出现嗜睡。查体:意识模糊,口唇发绀,球结膜水肿,双肺满布哮鸣音,双下肢水肿。

107. 该患者出现意识障碍最主要的机制是

- A. 心源性休克
- B. 电解质紊乱
- C. 肺性脑病
- D. 感染中毒性脑病
- E. 脑出血

108. 患者经吸氧治疗后呼吸困难进一步加重。血气分析示 pH 7.10, PaCO₂ 65mmHg, PaO₂ 102mmHg, 查体:昏睡,口唇发绀,双肺散在干湿性啰音。此时,应首选的治疗措施是

- A. 糖皮质激素静脉滴注
- B. 大剂量利尿剂静脉滴注
- C. 呼吸兴奋剂静脉滴注
- D. 静脉应用广谱抗生素
- E. 机械通气

(109—110 题共用题干)

男,22 岁。受凉后出现咽痛,咳嗽,发热,1 天后出现全程肉眼血尿 2 次,无尿频,尿急,尿痛。尿常规:蛋白(++),尿沉渣镜检:RBC 满视野。血 Scr 74 μmol/L。

109. 最可能的疾病是

- A. 急性间质性肾炎
- B. 急性肾盂肾炎
- C. 急进性肾小球肾炎
- D. 急性肾小球肾炎
- E. IgA 肾病

110. 下列最有助于诊断的检查是

- A. 肾穿刺活检
- B. 尿培养
- C. 膀胱镜
- D. 泌尿系统 B 超
- E. 腹部 CT

(111—113 题共用题干)

女,75 岁,胸痛 5 小时。心电图示 V₁~V₅ 导联 ST 段抬高 0.5mV。

111. 对明确诊断最有价值的实验室检查指标是

- A. 血糖
- B. 血脂分析
- C. 肝肾功能
- D. 血常规
- E. 血肌钙蛋白

112. 对改善预后最有效的措施是

- A. 卧床休息
- B. 静脉注射瑞替普酶(rt-PA)
- C. 静脉滴注硝酸甘油
- D. 静脉滴注丹红注射液
- E. 静脉滴注极化液

113. 【假设信息】住院第 7 天,患者突感呼吸困难,不能平卧。查体:双肺闻及细湿啰音,胸骨左缘第 4 肋间闻及收缩期吹风样杂音。对明确诊断最有意义的辅助检查是

- A. 胸部 X 线片
- B. 血 B 型钠尿肽水平
- C. 血气分析
- D. 心电图
- E. 超声心动图

(114—116 题共用题干)

女,55 岁。早上小便后用纸擦见纸上都是血。诉就诊前一天去某养老院按摩,按摩师在给腰部按摩时特别用力,按摩后自我感觉腰部疼痛。检查:血常规正常,尿+++/HP。B 超提示:肾增大,肾破裂,CT 诊断一致。

114. 考虑出血的原因最可能的是

- A. 肾囊肿
- B. 多囊肾
- C. 肾癌
- D. 肾积水
- E. 肾错构瘤

115. 为明确诊断,应进一步行哪项检查

- A. 尿路造影
- B. 穿刺活检
- C. MRI
- D. 肾动脉造影
- E. KUB

116. 首选的治疗措施是

- A. 血肿去除手术

- B. 肾部分切除
- C. 肾切除
- D. 介入治疗
- E. 观察

(117—119 题共用题干)

男,28岁。6小时前从4米高处坠落,不能站立行走。查体:左小腿明显肿胀,中段畸形,足背动脉搏动减弱,皮肤温度较对侧降低,被动屈伸足趾时疼痛加重。

117. 下列治疗方法首选的是
- A. 镇痛剂,激素治疗
 - B. 小腿石膏托固定
 - C. 骨筋膜室切口减压
 - D. 小夹板固定
 - E. 跟骨结节骨牵引
118. 此类临床表现的最主要原因是
- A. 胫腓骨骨折不稳定
 - B. 骨折压迫动脉影响供血
 - C. 骨折压迫静脉影响回流
 - D. 骨筋膜室内压力增高
 - E. 小腿部广泛软组织挫伤
119. 预后状况最主要取决于
- A. 手术减压的早晚
 - B. 外固定时间的长短
 - C. 内固定方式的选择
 - D. 有无应用脱水抗感染治疗
 - E. 有无及早抬高患肢

(120—121 题共用题干)

男,40岁。1小时前游泳时溺水送来急诊。查体: P 120次/分, R 34次/分, BP 90/60mmHg, 神志尚清, 烦躁不安, 口唇发绀, 两肺可闻及广泛湿性啰音, 动脉血气分析 ($\text{FiO}_2 = 50\%$); pH 7.52, PaCO_2 30mmHg, PaO_2 60mmHg。

120. 该患者出现严重呼吸衰竭最主要的原因是
- A. 肺泡通气量下降
 - B. 弥散功能障碍
 - C. 呼吸中枢活动减弱
 - D. 肺内分流显著增加
 - E. 通气/血流比例失调
121. 为改善其呼吸衰竭,应首选的措施是
- A. 静脉滴注呼吸兴奋剂
 - B. 储氧面罩吸氧
 - C. 无创通气
 - D. 快速利尿
 - E. 静脉滴注糖皮质激素

(122—123 题共用题干)

男,28岁。车祸后胸痛、呼吸困难40分钟。曾咳出少量血痰,无恶心、呕吐,无腹胀、腹痛,无意识障碍。查体:P 118次/分,R 26次/分,BP 90/60mmHg。气管右偏,左侧胸壁皮肤瘀青,无皮下气肿,左侧4、5、7肋骨触痛明显,可触及骨擦感,左胸叩诊鼓音,呼吸音减弱,心律齐,未闻及心脏杂音。腹软,无压痛,肝脾肋下未触及。四肢活动尚可,病理反射未引出。辅助检查:Hb 100g/L, RBC $3.2 \times 10^{12}/\text{L}$,胸部X线片示左侧4、5、7侧肋骨骨折,左侧气胸,肺组织压缩约70%,左侧胸腔中等量积液。

122. 需要立即给予的处理是

- A. 加压包扎固定胸壁
- B. 胸腔闭式引流
- C. 静脉输血
- D. 剖腹探查
- E. 穿刺排气减压

123. 根据患者目前病情推断,最有可能合并存在的情况是

- A. 连枷胸
- B. 张力性气胸
- C. 创伤性窒息
- D. 肺裂伤
- E. 心包破裂

(124—126 题共用题干)

男,56岁。尿中泡沫增多2年,间断双下肢水肿,晨轻暮重半年。既往患2型糖尿病15年,目前使用二甲双胍(1.5g/日)联合胰岛素(早、晚餐前皮下注射)治疗。冠心病病史10年,2年前行PTCA治疗。查体:BP 155/85mmHg,腹型肥胖,心肺无显著异常,双下肢轻度凹陷性水肿。尿蛋白(+++)。

124. 入院后监测血压波动于140~150/75~85mmHg,首选的降压药物是

- A. α 受体拮抗剂
- B. ACEI或ARB类
- C. β 受体拮抗剂
- D. 利尿剂
- E. 钙通道阻滞剂

125. 患者24小时尿蛋白定量2.3g, eGFR 70ml/min, Hb A1c 7.0%。下一步降糖治疗最恰当的是

- A. 停用二甲双胍,改用阿卡波糖联合胰岛素治疗
- B. 停用二甲双胍,单独使用胰岛素治疗
- C. 停用二甲双胍,改用格列吡嗪联合胰岛素治疗
- D. 继续维持二甲双胍联合胰岛素治疗
- E. 加用罗格列酮联合治疗

126. 患者凌晨噩梦惊醒,胸闷,监测血糖:睡前6.4mmol/L,

3 点时 3.6mmol/L,空腹血糖 9.8mmol/L,空腹血糖升高最可能的原因是

- A. 清晨胰岛素拮抗激素增多
- B. 夜间可疑心绞痛发作后的应激现象
- C. 胰岛素剂量不足
- D. 二甲双胍未达足量
- E. 低血糖后反应性高血糖

(127—128 题共用题干)

女,65 岁。因大量蛋白尿外院肾活检,病理提示膜性肾病一期,予以泼尼松 60mg/天治疗 2 周,突发右侧腰痛伴肉眼血尿 1 天。查体:右肾区叩击痛(+).尿蛋白(++++) ,尿沉渣镜检 RBC 满视野,血 Alb 18g/L,血肌酐 95 μ mol/L, B 超提示右肾增大。

127. 对明确诊断血尿原因最有价值的检查是

- A. 清洁中段尿培养
- B. 重复肾活检
- C. 静脉肾盂造影
- D. 肾脏 MRI
- E. 肾血管超声

128. 最可能的诊断是

- A. 肾静脉血栓形成
- B. 急性肾盂肾炎
- C. 肾炎型肾病综合征
- D. 肾脏肿瘤
- E. 并发肾脏结石

(129—130 题共用题干)

女,36 岁。慢性肾衰竭 4 年。1 周来水肿加重伴恶心呕吐、胸痛、呼吸困难。查体:T 38.1 $^{\circ}$ C, BP 180/110mmHg,心前区可闻及心包摩擦音。血红蛋白 63g/L, BUN 28.6,血肌酐 870.9 μ mol/L。

129. 此患者病情危重的主要表现是

- A. 内分泌失调
- B. 水肿

C. 呼吸困难

- D. 贫血
- E. 高血压

130. 目前治疗错误的是

- A. 控制血压
- B. 抗感染
- C. 血液透析
- D. 快速补充血容量
- E. 利尿

(131—133 题共用题干)

女,45 岁。肢体软弱无力,夜尿增多 2 年余,今晨起双下肢不能活动。查体:血压 170/100mmHg,轻度肥胖,血钾 2.4mmol/L。

131. 最可能的诊断是

- A. 单纯性肥胖
- B. 库欣综合征
- C. 原发性醛固酮增多症
- D. 低钾性周期性麻痹
- E. 嗜铬细胞瘤

132. 为明确诊断首先应测定

- A. 尿钾
- B. 血肌酐
- C. 血 ACTH、皮质醇
- D. 血肾素、醛固酮
- E. 血肾上腺素、去甲肾上腺素

133. 对诊断最有帮助的影像学检查是

- A. 肾盂造影
- B. 肾上腺核素扫描
- C. 肾动脉造影
- D. 肾上腺 CT
- E. 垂体 MRI

B1 型选择题 (134—150 题)

答 题 说 明

以下提供若干组试题,每组试题共用在试题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中选择一个与问题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某一个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(134—135 题共用备选答案)

- A. 噻嗪类抑制剂
- B. 血管紧张素转换酶抑制剂
- C. α 受体抑制剂
- D. β 受体抑制剂

E. 钙离子通道抑制剂

134. 合并低钾血症的高血压患者,降压不宜选用的药物是

135. 合并糖尿病的高血压患者,血清肌酐正常,降压治疗宜选用的药物是

(136—138 题共用备选答案)

- A. 房间隔缺损
- B. 室间隔缺损
- C. 动脉导管未闭
- D. 法洛四联症
- E. 主动脉缩窄

136. 肺动脉瓣区第二心音(P_2)亢进、固定分裂见于

137. 肺动脉瓣区第二心音(P_2)减低见于

(138—140 题共用备选答案)

- A. “爪”形手畸形
- B. 垂腕畸形
- C. “银叉”畸形
- D. “枪刺样”畸形
- E. “天鹅颈”畸形

138. 桡骨远端骨折侧面观察的畸形是

139. 桡神经损伤最容易出现的畸形是

140. 尺神经损伤最容易出现的畸形是

(141—142 题共用备选答案)

- A. 心电图
- B. 胸部 X 线片
- C. 血 D-二聚体
- D. 下肢深静脉彩超
- E. 动脉血气分析

141. 阴性结果最有助于排除肺血栓栓塞的检查

142. 阳性结果最有助于肺血栓栓塞的检查

(143—144 题共用备选答案)

- A. 氢氯噻嗪
- B. 贝那普利
- C. 美托洛尔
- D. 缬沙坦
- E. 可乐定

143. 高血压伴低血钾不宜选用的药物是

144. 高血压伴窦性心动过速宜选用的药物是

(145—146 题共用备选答案)

- A. 柯萨奇 B 组病毒
- B. 巨细胞病毒
- C. 金黄色葡萄球菌
- D. 草绿色链球菌
- E. EB 病毒

145. 亚急性心内膜炎最常见的病原微生物是

146. 病毒性心肌炎最常见病原体是

(147—148 题共用备选答案)

- A. CT
- B. 放射性核素显像
- C. KUB
- D. 腹部 B 超
- E. MRI

147. 男,71 岁。间断无痛肉眼血尿伴腰部钝痛 1 个月,对明确诊断最有帮助的检查为

148. 男,14 岁。反复左腰部胀痛 1 年。查体:左腰部包块,质软,呈囊性感。B 超提示左肾积水,肾皮质变薄。为了解左肾实质损害程度及分侧肾功能,首选的检查是

(149—150 题共用备选答案)

- A. 惊恐面容
- B. 丑陋面容
- C. 苦笑面容
- D. 满月脸
- E. 黏液水肿面容

149. 肢端肥大症常见的面容是

150. 库欣综合征常见的面容是

第二单元

A1 型选择题(1—75 题)

答 题 说 明

每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

- 下列不属于医学伦理学研究对象的是
A. 医务人员与患者之间的关系
B. 医务人员与医学发展之间的关系
C. 医务人员与其家庭成员间的关系
D. 医务人员与社会之间的关系
E. 医务人员相互之间的关系
- 预防接种异常反应是指
A. 心理因素引起的个体心性反应
B. 疫苗本身特性引起的接种后一般反应
C. 合格疫苗在实施规范接种过程中给受种者造成损害
D. 受种者在接种时正处于某种疾病的前驱期,接种后偶合发病
E. 接种单位违反预防接种方案给受种者造成损害
- 最先到达病原体感染部位的免疫细胞是
A. T 细胞
B. 巨噬细胞
C. NK 细胞
D. B 细胞
E. 中性粒细胞
- HIV 感染导致大量减少的细胞是
A. 单核细胞
B. $CD8^+$ T 细胞
C. 粒细胞
D. NK 细胞
E. $CD4^+$ T 细胞
- 患者有损害,但医疗机构不承担赔偿责任的情况是
A. 在抢救生命垂危患者等紧急情况下未尽到合理诊疗义务
B. 患者或者其近亲属不配合医疗机构进行符合诊疗规范的诊疗
C. 未经患者同意公开其病历资料
D. 未尽到与当时医疗水平相应的诊疗义务
E. 对筛检试验阳性和可疑阳性的人必须进行确诊检查,确诊后的病人进行治疗
- 下列关于胆色素的叙述,正确的是
A. 以血红素为主要成分
B. 胆汁酸为其代谢终产物
C. 在血中主要与球蛋白结合而运输
D. 铁卟啉化合物的分解代谢产物
E. 可以转变成细胞色素
- 有关筛检,错误的是
A. 筛检试验应费用低廉
B. 应能迅速出结果
C. 目的是早期发现罕见病例
D. 检查对象为表面上无病的人
E. 筛检试验应对人体无害
- 医患交流中,能够使得沟通更为有效与顺畅的方法是
A. 尽量多用书面沟通
B. 避免表达态度和情感
C. 善用问句引导话题
D. 尽量使用医学术语
E. 提供的信息越多越好
- 为尽量发现病人,在制订筛选方法标准过程中,常采用
A. 提高假阴性率
B. 降低假阳性率
C. 提高方法的特异度
D. 提高方法的灵敏度
E. 使假阴性率与假阳性率相等
- 一般情况下,需要由主治医师申请、上级医师审核、科主任核准签发的输血备血量是
A. 200ml 到 400ml
B. 600ml 至 800ml
C. 400ml 到 600ml

- D. 100ml 到 200ml
E. 800ml 至 1600ml
11. 医师在旅游途中救治了 1 位突发心脏病的旅客, 该医师行的是
A. 岗位职责
B. 医师职权
C. 政治义务
D. 法律义务
E. 道德义务
12. 编制统计表时, 做法错误的是
A. 同一指标的小数位数保留一致
B. 表内数据一律用阿拉伯数字表示
C. 统计表需要标题
D. 表中必须有竖线
E. 表中若缺失或未记录可用“…”表示
13. 高浓度降钙素能迅速降低血钙的作用环节是
A. 减少肠对钙的吸收
B. 抑制甲状旁腺激素分泌
C. 抑制破骨细胞溶骨活动
D. 刺激成骨细胞成骨活动
E. 抑制肾小管对钙的重吸收
14. 描述一组正态分布资料离散程度大小的最佳指标是
A. 四分位数间距
B. 标准差
C. 极差
D. 离均差平方和
E. 百分位数
15. 下列属于补体系统缺陷导致的疾病是
A. 急性肾小球肾炎
B. 过敏性休克
C. 接触性皮炎
D. 遗传性血管神经性水肿
E. 桥本甲状腺炎
16. 甘油异生成糖时最主要的中间产物是
A. 草酰乙酸
B. 磷酸二羟丙酮
C. 脂肪酸
D. 柠檬酸
E. 乙酰乙酸
17. 在假设检验中为了减小犯 II 型错误的概率, 应
A. 严格做到均衡
B. 保留有效数字更多位数
C. 减小犯 II 型错误的概率
D. 增加样本量
E. 更好随机抽样
18. 最常发生湿性坏疽的器官是
A. 四肢
B. 肝
C. 脾
D. 肾
E. 肺
19. 以肾小球壁层上皮细胞增生为主的肾炎类型是
A. 膜增生性肾小球肾炎
B. 微小病变型肾小球肾炎
C. 新月体性肾小球肾炎
D. 系膜增生性肾小球肾炎
E. 急性弥漫性增生性肾小球肾炎
20. 流行性脑脊髓膜炎典型的病理变化是
A. 神经细胞变性坏死
B. 淋巴细胞血管周围袖套状浸润
C. 蛛网膜下腔脓性渗出物聚积
D. 噬神经细胞现象
E. 脑软化灶形成
21. 淋病奈瑟菌的形态特点是
A. 革兰阳性链球菌
B. 革兰阴性球杆菌
C. 革兰阴性螺形菌
D. 革兰阳性四联球菌
E. 革兰阴性双球菌
22. 实验设计的对照原则是为了
A. 控制非实验因素的干扰, 显现实验因素效应
B. 提高实验效应
C. 控制实验因素的干扰, 增强可比性
D. 提高组间均衡性
E. 保证组间均衡性
23. 人正常生活的最基本的心理条件是
A. 人际和谐
B. 情绪稳定
C. 人格完整
D. 智力正常
E. 适应环境
24. 反映均数抽样误差大小的指标是
A. 全距
B. 标准误
C. 均数
D. 标准差
E. 变异系数



25. 生长因子作用的直接靶点是
- 进入体内的致病菌
 - 细胞膜表面的相应受体
 - 血液中的各种激素
 - 细胞分裂时的染色体
 - 代谢途径中的关键酶
26. 城镇职工基本医疗保险费用的缴付方式主要为
- 职工个人和国家
 - 用人单位和职工个人
 - 用人单位
 - 国家和用人单位
 - 国家
27. 侵蚀性葡萄胎与葡萄胎病理的主要区别点是
- 绒毛细胞滋养层细胞增生
 - 绒毛合体滋养层细胞增生
 - 子宫深肌层见水泡状绒毛
 - 绒毛间质血管消失
 - 绒毛水肿呈水泡状
28. 协调医务人员之间关系的首要思想基础和道德要求是
- 彼此信任, 相互协作
 - 共同维护患者利益和社会公益
 - 彼此独立, 相互支持
 - 彼此平等, 相互尊重
 - 互相学习, 共同提高
29. 接触职业性有害因素的劳动者是否发生职业性疾病, 主要取决于
- 有害因素种类
 - 接触方式
 - 接触机会
 - 接触的浓度(强度)和时间
 - 人体的健康状况
30. 在我国最多见的淋巴瘤类型是
- 弥漫性大 B 细胞淋巴瘤
 - NK/T 细胞淋巴瘤
 - MALT 淋巴瘤
 - 蕈样霉菌病
 - 滤泡性淋巴瘤
31. 初次体液免疫应答产生抗体的特点是
- 滴度高
 - 主要为 IgA
 - 主要为 IgG
 - 亲和力低
 - 持续时间长
32. 肺的有效通气量是
- 肺活量
 - 每分通气量
 - 肺泡通气量
 - 补吸气量
 - 无效腔气量
33. 精神分析学派认为, 在心理地形图中, 当前能被注意到的各种心理活动为
- 想象
 - 前意识
 - 意识
 - 表象
 - 潜意识
34. 按照假药论处的药品是
- 未标明有效期的药品
 - 擅自添加矫味剂的药品
 - 更改生产批号的药品
 - 超过有效期的药品
 - 被污染的药品
35. 某地区死因统计发现, 成年人的首位死因是心脏病。下列各项措施中不是该地区优先策略的是
- 建设健康步道, 提高人群身体活动水平
 - 加强室内公共场所、工作场所的控烟工作
 - 对社区人群进行减少心脏病危险因素咨询
 - 以高胆固醇血症和家族史为指标, 划定高危人群并开展干预
 - 大力发展心脏专科医院, 为病人提供血管成形术或旁路移植的治疗
36. 可抑制细胞氧化磷酸化速率的物质是
- 磷酸戊糖
 - 胰岛素
 - 细胞色素 C
 - 一氧化碳
 - 磷酸激酶
37. 《精神卫生法》关于精神障碍医学鉴定的要求是
- 鉴定人应当对鉴定过程进行实时记录并签名
 - 就诊者未经精神障碍医学鉴定, 医疗机构不得实施住院治疗
 - 不能确定就诊者为严重精神障碍的应当经医学鉴定
 - 鉴定报告应当经精神障碍患者或者其监护人签字同意
 - 鉴定人不应当到收治精神障碍患者的医疗机构面见、询问患者
38. 参与构成蛋白质合成场所的 RNA 是

- A. 信使 RNA
B. 核糖体 RNA
C. 核内小 RNA
D. 催化性 RNA
E. 转运 RNA
39. 下列神经反射活动中,存在正反馈调节的是
A. 肺牵张反射
B. 屈肌反射
C. 排尿反射
D. 减压反射
E. 压力感受性反射
40. 个体在试图逃避某种威胁情境时,或在明确预知某种危险即将发生而又无法应对时,会产生的基本情绪是
A. 悲哀
B. 苦闷
C. 恐惧
D. 焦虑
E. 愤怒
41. 以下相对数指标中,属于频率指标的是
A. 死亡率
B. 人口年龄构成
C. 门诊病历中内科病例的百分比
D. 抚养比
E. 性别比
42. 患者查阅医疗记录和复印部分病历的权利属于
A. 平等就医权
B. 特殊干涉权
C. 隐私保护权
D. 损害赔偿权
E. 知情同意权
43. 病毒感染机体后,在体内由局部向远处扩散的方式不包括
A. 沿神经播散
B. 经血行播散
C. 经淋巴播散
D. 经组织间隙播散
E. 经免疫系统播散
44. 直接影响基因转录的蛋白质是
A. 载脂蛋白
B. 脂蛋白
C. 血红蛋白
D. 白蛋白
E. 组蛋白
45. 一般情况下法定传染病报告人不包括
A. 疾病预防控制中心的医师
B. 出入境检验检疫工作人员
C. 体检中心的医师
D. 医疗机构的就诊者
E. 血站的护士
46. 下列符合动物实验伦理要求的是
A. 对医学研究中的低等动物无须考虑人道问题
B. 用尽可能少的实验动物获得尽可能多的实验数据
C. 医学研究的科学性不能以牺牲动物的福利为代价
D. 尽可能用活体动物代替无知觉的实验材料
E. 尽可能用高等动物代替低等动物
47. 以下既属于第一级预防,也属于第三级预防的是
A. 体力活动促进
B. 环境有害因素的整治
C. 脑卒中病人的功能锻炼
D. 高血压管理
E. 控烟
48. 下列关于蛋白质理化性质的描述,正确的是
A. 变性后溶解度提高
B. 溶液 pH 值为等电点时形成兼性离子
C. 复性时产生分子杂交
D. 具有 260nm 特征吸收峰
E. 溶于高浓度乙醇
49. 下列食物中,铁的良好来源是
A. 小麦
B. 动物肝脏
C. 鱼
D. 蛋
E. 大豆
50. 患者虽已住院,但仍坚持工作,并要求提前出院。这种患者角色转变的类型为
A. 角色行为强化
B. 角色行为异常
C. 角色行为冲突
D. 角色行为减退
E. 角色行为缺如
51. 中医典籍中有“天人合一”“天人相应”的观点。该观点所反映的医学模式为
A. 神灵主义医学模式
B. 整体医学模式
C. 生物医学模式
D. 生物-心理-社会医学模式

- E. 自然哲学医学模式
52. 关于身体活动的说法, 不正确的是
- A. 不同的身体活动类型促进健康的作用不相同
 - B. 适度增加身体活动可以获得更大的健康效益
 - C. 高强度的身体活动可能造成损伤
 - D. 成人每周应至少参加五次以上中等强度的身体活动
 - E. 高血压患者不应该参加身体活动
53. 能引起骨骼肌神经-肌接头处产生终板电位的神经递质是
- A. 去甲肾上腺素
 - B. 乙酰胆碱
 - C. 谷氨酸
 - D. 多巴胺
 - E. 肾上腺素
54. 某人患有脚气病, 可能是由于缺乏
- A. 维生素 A
 - B. 核黄素
 - C. 叶酸
 - D. 维生素 D
 - E. 硫胺素(维生素 B₁)
55. 新生儿出生后, 监护人应在规定时限内为其办理预防接种证, 该时限是
- A. 6 个月
 - B. 1 个月
 - C. 4 个月
 - D. 3 个月
 - E. 2 个月
56. 可分解产生尿酸的物质是
- A. 鸟嘌呤
 - B. β -丙氨酸
 - C. 乳清酸
 - D. 阿糖胞苷
 - E. 胞嘧啶
57. 胎儿娩出前 2~4 小时内不宜使用的镇痛药物是
- A. 喷他佐辛
 - B. 丙磺舒
 - C. 布洛芬
 - D. 对乙酰氨基酚
 - E. 哌替啶
58. 属于营养必需氨基酸的是
- A. 甘氨酸
 - B. 酪氨酸
 - C. 丙氨酸
 - D. 甲硫氨酸
 - E. 谷氨酸
59. 根据沙赫特有关情绪研究的观点, 对个体情绪的性质和程度起决定性作用的是
- A. 心理应对方式
 - B. 认知的方式
 - C. 人格的特点
 - D. 社会支持程度
 - E. 智力的水平
60. 流行病学的基本研究方法包括
- A. 统计学检验、控制偏性、观察性研究
 - B. 实验性研究、干预性研究、分析性研究
 - C. 描述性研究、统计学检验、观察性研究
 - D. 描述性研究、分析性研究、实验性研究
 - E. 分析性研究、病例对照研究、队列研究
61. 月经周期中, 促进卵泡发育成熟的主要激素是
- A. 卵泡刺激素
 - B. 人绒毛膜促性腺激素
 - C. 黄体生成素
 - D. 雌激素
 - E. 孕激素
62. 肝硬化时, 脾肿大的主要原因是
- A. 脾窦巨噬细胞增多
 - B. 脾索纤维组织增生
 - C. 脾窦扩张红细胞淤滞
 - D. 淋巴小结内大量中性粒细胞浸润
 - E. 脾窦淋巴细胞聚集
63. 可致出血性结肠炎的细菌是
- A. 霍乱弧菌
 - B. 副溶血性弧菌
 - C. 金黄色葡萄球菌
 - D. 大肠埃希菌 O157: H7
 - E. 伤寒沙门菌
64. 按照我国“人类辅助生殖技术伦理原则”的要求, 目前允许实施的辅助生殖技术是
- A. 人卵胞浆移植
 - B. 精子捐赠助孕
 - C. 胚胎赠送助孕
 - D. 人卵核移植
 - E. 非商业性代孕
65. 属于 II 型超敏反应性疾病的是
- A. 新生儿溶血
 - B. 血清病
 - C. 荨麻疹



- D. 过敏性鼻炎
E. 过敏性休克
66. 普萘洛尔的药理作用为
A. 松弛支气管平滑肌
B. 升高眼内压
C. 拮抗交感神经活性
D. 促进肾素释放
E. 促进血小板聚集
67. 临床预防服务的主要内容不包括
A. 健康咨询
B. 筛查
C. 药物治疗
D. 化学预防
E. 免疫接种
68. 与月经周期中分泌期体温升高相关的激素是
A. 孕酮
B. 雌三醇
C. 雌二醇
D. 雄烯二酮
E. 雌酮
69. 机体免疫系统识别和清除突变细胞的功能是
A. 免疫监视
B. 免疫耐受
C. 免疫缺陷
D. 免疫调节
E. 免疫防御
70. 延缓普鲁卡因局部吸收的药物是
A. 肾上腺素
B. 异丙肾上腺素
C. 胰岛素
D. 去甲肾上腺素
E. 庆大霉素
71. 慢性支气管炎患者发生阻塞性通气功能障碍的病变基础是
A. 支气管上皮细胞变性、坏死
B. 支气管平滑肌萎缩
C. 支气管软骨萎缩、纤维化
D. 支气管腺体增生、肥大
E. 细支气管炎及细支气管周围炎
72. 体内甘油三酯的合成部位是
A. 神经细胞
B. 脂肪细胞
C. 肾细胞
D. 脾细胞
E. 乳腺细胞
73. 根据行为改变阶段模式,如果某服务对象处在行为维持阶段,应该采取的干预措施是
A. 改变环境以消除或减少诱惑
B. 促使他们针对危险行为对自身、他人和环境的影响做出评判
C. 促使参与者作出改变行为的承诺
D. 促使他们进行思考,认识到危险行为的危害、权衡改变行为的利弊
E. 从情感上评估自己的健康风险行为对自身和环境的影响
74. CO_2 在血液中最主要的运输形式是
A. 去氧血红蛋白
B. 氨基甲酰血红蛋白
C. 物理溶解
D. 碳酸氢盐
E. 氧合血红蛋白
75. 医务人员收受药品生产企业的财物,情节尚不严重时,依法应对其给予的处罚是
A. 没收违法所得
B. 罚款
C. 吊销执业证书
D. 追究刑事责任
E. 警告

A2型选择题(76—118题)

答 题 说 明

每一道考题下面是一个小案例出现的,其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

76. 男,60岁。因剧烈胸痛4小时入院治疗,心电图示窦性心律,心率55次/分,Ⅱ、Ⅲ、aVF导联ST段抬高0.3mV,其余导联ST段正常。介入治疗前植入临时起搏器起搏心室,以60次/分频率起搏时,监测动脉血压由100/70mmHg降低至85/60mmHg。导致这种血压变化的最可能原因是
A. 起搏心律时外周血管阻力降低致血压下降
B. 合并右心室梗死,右室排血量减少致左室充盈

减少

- C. 起搏心律时心率增快,舒张期缩短导致回心血量减少
- D. 起搏心律时心肌收缩力较弱致心排量降低
- E. 起搏时失去心房收缩对心室的充盈作用,左室充盈减少
77. 某地级市卫生行政部门接到举报,称市中心医院妇产科主治医师陶某违反《母婴保健法》及其实施办法相关规定,未经市级卫生行政部门批准擅自从事母婴保健专项技术服务,经查证举报属实,依法给予陶某行政处罚。陶某的违法行为是
- A. 擅自开展宫腔镜手术
- B. 擅自从事助产技术服务
- C. 擅自开展孕妇营养咨询和指导
- D. 擅自开展婴儿保健
- E. 擅自从事婚前医学检查
78. 女,50岁。双下肢水肿10余年,晨轻暮重,无眼睑水肿和泡沫尿。查体:BP 130/70mmHg,双肺呼吸音清,心界不大,心率87次/分,心律齐,腹软,肝脾肋下未触及,移动性浊音阴性,双下肢凹陷性水肿,浅静脉蚯蚓状改变。该患者下肢水肿的最可能原因是
- A. 下肢静脉压增高
- B. 血浆胶体渗透压降低
- C. 淋巴液回流受阻
- D. 血浆晶体渗透压降低
- E. 心肌收缩力降低
79. 在居民小区建设健康步道,改善小区绿化环境,以鼓励他们参加体育锻炼,这种方法属于
- A. 健康促进
- B. 卫生宣传
- C. 社区启蒙
- D. 健康教育
- E. 临床预防服务
80. 某学者在某镇开展了一项持续多年的啤酒狂欢节饮酒者与心血管疾病死亡关系的研究。研究初,有70名啤酒狂欢节饮酒者和1500名未饮酒者,在研究结束时,70名啤酒狂欢节饮酒者死于心血管疾病,45名啤酒狂欢节未饮酒者死于心血管疾病。该研究为
- A. 生态学研究
- B. 临床试验
- C. 病例对照研究
- D. 队列研究
- E. 横断面研究
81. 男,56岁。间断发热1个月,进行性少尿、咯血10天,查体:BP 165/100mmHg,双肺听诊可闻及湿啰音,双下肢水肿。尿常规:蛋白(++)。尿沉渣镜检:RBC 40~50/HP。血肌酐455 μ mol/L,血尿素18.5mmol/L,ANA(-),抗中性粒细胞胞浆抗体(+)。B超示双肾增大。该患者肾脏最可能的病理特征是
- A. 肾小球纤维化、玻璃样变
- B. 新月体形成
- C. 弥漫性GBM增厚,钉突形成
- D. 系膜局灶性节段性增宽或弥漫性增宽
- E. 系膜局灶性节段性硬化、玻璃样变
82. 男,45岁。HBsAg(+)20年。超声检查:肝脏回声不均匀,脾大,门静脉增宽,中等量腹水。肝穿刺病理的特征性发现是
- A. 肝细胞变性坏死
- B. 弥漫性肝纤维化
- C. 肝细胞气球样变
- D. 毛细胆管胆汁淤积
- E. 假小叶形成
83. 王某,女,19岁。最近因高考失利而出现情绪低落和失眠的情况。王某的母亲知道王某有位表哥是心理治疗师,比较熟悉和了解王某的情况,要求其给王某做心理治疗,但被这位表哥拒绝了。其表哥拒绝提供治疗服务所依据的原则为
- A. 保密原则
- B. 回避原则
- C. 发展原则
- D. 灵活原则
- E. 中立原则
84. 男,65岁。腹部手术后出现疼痛,使用吗啡镇痛治疗,复查血气示pH 7.32, PaCO₂ 50mmHg, PaO₂ 54mmHg,该患者低氧血症最可能的发生机制是
- A. 肺内分流
- B. 氧耗量增加
- C. 肺泡通气量下降
- D. 弥散功能障碍
- E. 通气/血流比例失调
85. 男,22岁,因为怕脏和反复洗手等被诊断为强迫症。心理治疗师要求患者触摸地面、门把手等,之后不允许其洗手并要求其必须接着做事。经治疗,该患者的强迫症状逐渐减轻。这种治疗方法属于
- A. 系统脱敏疗法
- B. 行为塑造

- C. 厌恶疗法
D. 冲击疗法
E. 逐级暴露疗法
86. 女, 28岁。腹痛、发热、呕吐1天。查体: T 38.9°C, P 120次/分, 双肺呼吸音清, 未闻及干湿性啰音, 心率120次/分, 心律齐, 右下腹麦氏点压痛、反跳痛(+)。血常规: Hb 120g/L, WBC $10.2 \times 10^9/L$, N 0.85, Plt $202 \times 10^9/L$ 。行阑尾切除术, 手术标本病理检查可见阑尾壁各层大量弥漫性浸润的细胞是
- A. 淋巴细胞
B. 巨噬细胞
C. 嗜碱性粒细胞
D. 嗜酸性粒细胞
E. 中性粒细胞
87. 男, 50岁。因高血压, 高脂血症服用阿司匹林3个月, 1个月来反复出现上腹胀痛, 查体: 腹软, 中上腹胀痛, 下列治疗药物中首选的是
- A. 阿莫西林
B. 克拉霉素
C. 奥美拉唑
D. 多潘立酮
E. 硫酸镁
88. 男, 50岁, 高血压5年。规律服用培哚普利、美托洛尔和阿司匹林治疗, 无胸痛。查体无异常。实验室检查: 血 TC 3.8mmol/L, LDL-C 2.0mmol/L, TG 5.9mmol/L, HDL-C 0.9mmol/L, 首选的降脂药物是
- A. 依折麦布
B. 考来烯胺
C. 普罗布考
D. 非诺贝特
E. 阿托伐他汀
89. 男, 28岁。胸闷气促3年, 支气管激发试验阳性。剧烈运动后气促加重, 应用沙丁胺醇气雾剂吸入后可缓解症状。其主要作用机制是
- A. 抑制嗜酸粒细胞聚集
B. 对抗过敏介质的作用
C. 舒张支气管平滑肌
D. 抑制肥大细胞释放过敏介质
E. 减少支气管黏液分泌
90. 男, 40岁。右足底外伤5小时, 伤口深, 及时彻底清创后, TAT(破伤风抗毒素)皮试阳性。首先考虑给予注射
- A. 破伤风人体免疫球蛋白
B. 青霉素
C. 破伤风类毒素
D. 破伤风抗毒素(脱敏注射)
E. 白喉、百日咳、破伤风三联疫苗
91. 女, 35岁。1年前出现左眼睑下垂、视物成双, 伴四肢无力, 休息后减轻, 疲劳后加重。半年前出现右眼睑下垂, 伴饮水呛咳、声音嘶哑。该病的产生机制是
- A. 终板膜因胆碱酯酶失活而持续去极化
B. 神经-骨骼肌接头处乙酰胆碱释放减少
C. 终板膜上的乙酰胆碱受体受到破坏
D. 骨骼肌膜上的电压门控 Na^+ 通道失活
E. 运动神经末梢电压门控 Ca^{2+} 通道失活
92. 男, 22岁。反复发作上腹部疼痛6个月。胃镜检查见十二指肠球部溃疡。该患者不会出现的生理变化是
- A. 迷走神经功能亢进
B. 促胃液素水平升高
C. 内因子分泌减少
D. 胃蛋白酶分泌增加
E. 胃酸分泌增加
93. 男, 28岁。乏力、纳差10余天。伴厌油及干呕、小便浓茶色。查体: 皮肤、巩膜黄染、剑突下轻压痛, 无反跳痛, 肝脾肋下未触及。实验室检查: AST 1585U/L, ALT 1847U/L, TBil 85.20 $\mu\text{mol/L}$ 。乙肝表面抗原、乙肝E抗原、乙肝核心抗体均阳性。该患者肝脏最可能的病变是
- A. 肝细胞淤胆和羽毛状坏死
B. 肝细胞桥接坏死和碎片状坏死
C. 肝细胞广泛变性和点灶状坏死
D. 肝细胞大片坏死并结节状再生
E. 仅汇管区淋巴细胞浸润
94. 男, 35岁。牙龈出血、皮肤瘀斑, 间断鼻出血10天, 既往体健。血常规: Hb 64g/L, WBC $10.5 \times 10^9/L$, Plt $26 \times 10^9/L$ 。骨髓细胞学检查: 增生明显活跃, 胞浆中有较多颗粒且MPO染色强阳性的细胞占0.65, 其中有的可见成堆Auer小体, 若进行流式细胞术检查, 此种细胞最可能的细胞免疫学表型是
- A. CD14 阳性、HLA-DR 阳性
B. CD41 阳性、CD61 阳性
C. CD10 阳性、CD19 阳性
D. CD13 阳性、HLA-DR 阳性
E. CD33 阳性、HLA-DR 阴性
95. 某患者因肺部感染入院, 经多种抗菌药物治疗效果不明显。主治医师刘某值夜班时发现患者病情

危重,需要使用特殊使用级抗菌药物治疗。依照《抗菌药物临床使用管理办法》规定,刘某越级使用了抗菌药物,同时详细记录用药指征,并在规定时限内补办了越级使用抗菌药物的必要手续。该时限是

- A. 12 小时
- B. 3 小时
- C. 24 小时
- D. 6 小时
- E. 2 小时

96. 女,35 岁。颈部肿块 4 年余,随吞咽上下移动。近 3 个月肿块增大明显。手术切除后病理诊断为甲状腺滤泡状腺癌。其最主要的病理诊断依据是

- A. 甲状腺滤泡上皮细胞明显异型性
- B. 甲状腺间质中出现大量淀粉样物质
- C. 甲状腺滤泡上皮细胞侵犯包膜
- D. 甲状腺滤泡上皮细胞核呈毛玻璃样改变
- E. 甲状腺组织内出现乳头结构

97. 已知人体血铅值仅以过高为异常,且其服从正偏态分布,若要估计某地成年人血铅含量的 95% 医学参考值范围,宜采用

- A. $>P_5$
- B. $P_{2.5} \sim P_{97.5}$
- C. $P_5 \sim P_{95}$
- D. $<P_{95}$
- E. $<P_{97.5}$

98. 男,28 岁。反复,上腹痛 2 年,以夜间及空腹时为主,加重并呕吐宿食 2 周,伴口渴及少尿。该患者可能存在的电解质紊乱类型是

- A. 低钠高氯
- B. 高钾高氯
- C. 高钙
- D. 高钠低氯
- E. 低钾低氯

99. 男,66 岁。反复咳嗽、咳痰 12 年,呼吸困难进行性加重半年。查体:桶状胸,双肺呼吸音减弱。胸部 X 线片示双肺野透亮度增高:膈肌低平。该患者肺功能检查项目中数值最可能增加的是

- A. VC
- B. FEV_1
- C. FVC
- D. FEV_1/FVC
- E. FRC

100. 8 月某日,某婚宴有 80% 用餐者先后因腹痛、腹泻就诊。大部分患者出现上腹和脐周阵发性绞

痛,继而腹泻,5~10 次/天,粪便呈洗肉水样。调查发现聚餐的主要食物为海鲜类食品,引起该食物中毒的病原菌最有可能是

- A. 葡萄球菌
- B. 副溶血性弧菌
- C. 沙门菌
- D. 李斯特菌
- E. 肉毒梭菌

101. 女,60 岁。5 天前无明显诱因出现右上腹胀痛,伴畏寒、寒战、发热,最高体温 39.2℃,食欲不振,乏力。查体:T 38.5℃,P 90 次/分,R 20 次/分,BP 140/80mmHg,双肺未闻及干湿性啰音,心律齐,腹软,无肌紧张,肝肋下 5cm,有压痛。血常规: Hb 120g/L, WBC $12.2 \times 10^9/L$, N 0.92, Plt $122 \times 10^9/L$ 。腹部 B 超:右肝内多个直径 2cm~3cm 液性暗区。抗感染治疗主要针对的细菌是

- A. 大肠埃希菌
- B. 表皮葡萄球菌
- C. 鲍曼不动杆菌
- D. 铜绿假单胞菌
- E. 梭状芽孢杆菌

102. 在 800 名病例与 800 名对照的病例对照研究中,有 300 名病例和 100 名对照有暴露史,OR 值应为

- A. 1.4
- B. 2.3
- C. 4.2
- D. 无法计算
- E. 5

103. 女,22 岁。在与恋人的一次激烈争吵之后,倍感气愤、烦闷,次晨出现双下肢瘫痪、无法起立行走的症状,经检查无神经系统器质性病变的临床依据。如欲对该患者实施尝试性心理治疗,首选的方法为

- A. 暗示疗法
- B. 认知疗法
- C. 自由联想
- D. 支持疗法
- E. 放松训练

104. 某吸烟者,从上个月开始戒烟。按行为改变的阶段模式,他目前处于

- A. 打算阶段
- B. 维持阶段
- C. 无打算阶段
- D. 准备阶段



E. 行动阶段

105. 男, 65 岁。既往有胆石症病史 10 年, 突发右肝区绞痛, 伴右肩部疼痛。右肩部疼痛的性质是
- 牵涉痛
 - 躯体痛
 - 痉挛性痛
 - 体腔壁痛
 - 扩散性疼痛
106. 男, 35 岁。持续高热、恶心、呕吐、食欲不振伴腹泻 5 天入院。查体: 皮肤、巩膜轻度黄染, 胸部可见数枚淡红色斑丘疹, 脾脏肋下可触及。实验室检查: 血 WBC $3.2 \times 10^9/L$, Plt $100 \times 10^9/L$, ALT 140U/L, TBil $45 \mu\text{mol/L}$ 。肥达反应 O1: 32。该疾病的特征性病理变化是
- 全身单核巨噬细胞系统增生
 - 肠黏膜淤血水肿
 - 嗜酸性脓肿
 - 中性粒细胞浸润
 - 干酪样坏死性肉芽肿形成
107. 男, 60 岁。恶心、呕吐 1 周。查体 BP 160/100mmHg, 肋骨压痛。尿常规: 蛋白尿 (+)。尿沉渣镜检: RBC (-)。尿蛋白定量 3.2g/d。血肌酐 $350 \mu\text{mol/L}$, 血钾 3.3mmol/L 。B 超示双肾增大。其最可能出现的血清学异常是
- 蛋白电泳示多种免疫球蛋白升高
 - 抗肾小球基底膜抗体阳性
 - 抗核抗体阳性
 - 免疫固定电泳示单克隆免疫球蛋白
 - 抗中性粒细胞胞浆抗体阳性
108. 女, 17 岁。脑部受伤住院, 入院后虽经积极救治, 但 3 天后患者进入脑死亡状态。医师告知其父母, 并建议撤掉呼吸机。其父母看到女儿在呼吸机支持下仍有呼吸, 并能触及女儿的脉搏, 坚决不接受医师的建议。此时, 该医师符合伦理的做法是
- 尊重其父母的意愿并不惜一切代价救治
 - 执行脑死亡标准并劝说其父母捐献患者器官
 - 直接撤掉呼吸机并填写死亡报告
 - 请公证机关来公证患者已经死亡
 - 向患者父母解释脑死亡, 征得其同意后撤掉呼吸机
109. 男, 40 岁。高热、头痛 2 天。1 周前到南方地区参加抗涝救灾。查体: T 39°C , 皮肤黄染, 双下肢可见少许出血点, 结膜充血, 肝肋下 2cm, 压痛阳性, 脾肋下未触及, 腓肠肌压痛明显。血常规: WBC $15.0 \times 10^9/L$, N 0.88, Hb 100g/L, Plt $220 \times 10^9/L$ 。ALT 215U/L, AST 120U/L, TBil $106 \mu\text{mol/L}$ 。尿常规: 尿蛋白 (+ +)。尿沉渣镜检: WBC (+), RBC (+ +)。最可能感染的病原体是
- EB 病毒
 - 伯氏疏螺旋体
 - 新布尼亚病毒
 - 钩端螺旋体
 - 汉坦病毒
110. 男, 45 岁。间断上腹部不适 1 年。血 Hb 85g/L, 粪隐血 (+)。胃黏膜活组织病理检查: 慢性炎症, 间质中见散在印戒细胞。诊断是
- 消化性溃疡
 - 慢性肥厚性胃炎
 - 慢性萎缩性胃炎
 - 胃癌
 - 慢性浅表性胃炎
111. 检验科医师贾某为交流业务信息, 在朋友圈上传了一名艾滋病患者的检验数据, 并进行了解读, 其中包括患者的工作单位, 有人提醒他此行为侵犯了患者的法定权利。贾某侵犯的患者权利是
- 健康权
 - 姓名权
 - 身份权
 - 知情权
 - 隐私权
112. 某大学三年级医学生, 学习成绩一直不理想, 来到学校心理咨询室, 诉其在大学生活中不知道自己该干什么, 没有主见, 经常轻信他人, 轻率改变自己的方向。该心理咨询师分析该医学生在意志力上出现的问题是
- 动摇
 - 武断
 - 执拗
 - 独断
 - 盲从
113. 王某, 女, 75 岁。患病后始终不愿就诊, 而是在家中烧香拜佛祈求病愈。王某的儿子见母亲病情加重, 便请社区医师到家里为其母诊治, 但遭到王某拒绝。医师符合伦理的做法是
- 鉴于患者拒绝, 社区医师应放弃诊治
 - 对患者信佛不信医的行为进行批评
 - 向患者进行耐心解释, 规劝其接受相应诊治
 - 在家属协助下, 对患者实施强制诊治
 - 患者行为影响健康, 应及时报告派出所处置

114. 男, 35 岁, 动物园鸟类饲养员。发热、咳嗽伴头痛、眼痛 1 周。查体: T 40°C, 睑结膜充血, 双肺可闻及湿啰音。血常规正常, 胸部 X 线片示间质性肺炎。其感染的病原体最可能是
- 肺炎支原体
 - 腺病毒
 - 肺炎链球菌
 - 呼吸道合胞病毒
 - 肺炎衣原体
115. 女, 22 岁, 医学生。最近与男友发生了激烈争执, 以致两人分手, 情绪极度低落, 也十分愤恨, 来找学校心理咨询师寻求帮助。心理咨询师针对其情绪的调节提出的办法中不适合的是
- 不断宣泄
 - 降低期望
 - 心理应对
 - 改变认知
 - 放松训练
116. 某医师给住院患者开具了药物医嘱后, 很快发现自己的医嘱有误, 但判断其不会给患者造成严重后果。此时该医师的最佳做法是
- 失误不会造成严重后果, 可隐瞒以避免纠纷
 - 不告知患者失误的实情, 后续治疗中适当弥补
 - 不告知其他人, 对患者进行密切观察
 - 纠正医嘱, 并对出现的失误予以积极补救
 - 先不告知患者, 若其知晓再为自己的失误辩护
117. 男, 35 岁。反复发作血尿 1 年, 加重 3 周。多出现在急性咽炎后 1 ~ 3 天。查体: BP 150/100mmHg, 下肢轻度水肿。尿沉渣镜检: RBC 5 ~ 10/HP。尿蛋白定量 1.25g/d。肌酐 88μmol/L。最可能的肾脏病理诊断是
- 膜增生性肾小球肾炎
 - 微小病变型肾病
 - 膜性肾病
 - IgA 肾病
 - 新月体性肾小球肾炎
118. 某医疗机构 1 周内收治多名患手足口病的小学生, 未按规定履行报告职责, 也未及时采取控制措施, 致使疫情扩散。县卫生行政部门得知此情况后立即启动应急预案, 及时控制了疫情, 同时对事件进行调查, 认为该医疗机构行为违法且情节严重, 依法做出了处理。该处理是
- 责令改正
 - 通报批评
 - 吊销《医疗机构执业许可证》
 - 给予警告
 - 暂停执业活动

A3/A4 型选择题 (119—126 题)

答 题 说 明

以下提供若干个案例, 每个案例下设若干道试题。请根据案例提供的信息, 在每一道试题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(119—120 题共用题干)

女, 65 岁。诊断 2 型糖尿病 1 年, 饮食运动控制, 检测空腹血糖 7.5mmol/L, 餐后 2h 血糖 11.4mmol/L。既往体健。查体: 身高 160cm, 体重 70kg, 心肺查体未见异常。

119. 其降血糖药首选

- 格列本脲
- 二甲双胍
- 格列吡嗪
- 胰岛素
- 阿卡波糖

120. 患者服药后 2 个月复诊, 糖化血红蛋白 6.3%。患者目前降糖治疗方案首选是

- 加用瑞格列奈

- 加用阿卡波糖
- 维持二甲双胍
- 换用格列喹酮
- 换用胰岛素

(121—123 题共用题干)

业务员纪某因身体不适去医院就诊, 被初步诊断为疑似传染性非典型肺炎, 并被实施单独隔离治疗。2 天后, 纪某厌倦了被隔离治疗的状态, 要求出院; 医院反复劝说, 不予批准。纪某于当晚溜出医院并回家; 医院发现纪某失踪后立即向有关部门报告。家人得知纪某情况后动员其尽快返回医院接受隔离治疗, 被纪某拒绝。

121. 根据《传染病防治法》, 有权协助医疗机构对纪某采取强制隔离治疗措施的是

- A. 卫生监督机构
B. 卫生行政部门
C. 街道办事处
D. 疾病预防控制机构
E. 公安机关
122. 纪某接受隔离治疗后又擅自脱离医院的角色行为属于
- A. 角色行为冲突
B. 角色行为缺如
C. 角色行为强化
D. 角色行为减退
E. 角色行为异常
123. 纪某作为患者未履行的主要道德义务是
- A. 交纳医疗费用
B. 尊重医生劳动
C. 支持医学发展
D. 配合医师诊治
E. 报告所在单位

(124—126 题共用题干)

用一种筛检乳腺癌的试验,对 400 例患有乳腺癌

的妇女和 400 名正常妇女进行筛检,结果前者中 80 例阳性,后者中 40 例阳性。

124. 该试验的灵敏度为

- A. 25%
B. 12%
C. 67%
D. 20%
E. 80%

125. 该试验的特异度为

- A. 80%
B. 20%
C. 50%
D. 90%
E. 10%

126. 该试验的阳性似然比为

- A. 0.5
B. 5
C. 4
D. 10
E. 2

B1 型选择题 (127—150 题)

答 题 说 明

以下提供若干组试题,每组试题共用在试题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中选择一个与问题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某一个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(127—128 题共用备选答案)

- A. 真菌
B. 衣原体
C. 支原体
D. 病毒
E. 立克次体

127. 无细胞壁的原核细胞型微生物是
128. 具有典型细胞核和完善细胞器的微生物是

(129—130 题共用备选答案)

- A. 3 日
B. 2 日
C. 1 日
D. 5 日
E. 7 日

129. 急诊处方的用药日数一般不得超过
130. 普通处方的用药日数一般不得超过

(131—133 题共用备选答案)

- A. 卫生服务需求
B. 卫生服务提供
C. 卫生服务需要
D. 卫生服务利用
E. 卫生服务购买

131. 需求者实际利用卫生服务的数量是
132. 从经济和价值观念出发,在一定时期内、一定价格水平上人们愿意而且有能力消费的卫生服务量是
133. 依据人们的实际健康状况与“理想健康状态”之间存在差距而提出的对预防、保健、医疗、康复等服务的客观要求是

(134—135 题共用备选答案)

- A. 颈部淋巴瘤
B. 皮肤恶性黑色素瘤
C. 乳腺髓样癌

- D. 子宫绒毛膜癌
- E. 睾丸精原细胞瘤

134. 上皮组织分化的肿瘤是
135. 间叶组织分化的肿瘤是

(136—137 题共用备选答案)

- A. 乙琥胺
- B. 地西泮
- C. 氯丙嗪
- D. 苯妥英钠
- E. 异丙嗪

136. 治疗脊髓损伤引起肌强直的药物是
137. 治疗癫痫大发作和局限性发作的药物

(138—140 题共用备选答案)

- A. Na^+
- B. 葡萄糖
- C. 菊粉
- D. 肌酐
- E. 对氨基马尿酸

138. 能被肾小管全部重吸收的物质是
139. 能被肾小管大部分重吸收的物质是
140. 当血液流经肾一次后,血浆中该物质几乎完全被肾清除的是

(141—142 题共用备选答案)

- A. 纤维蛋白及血小板
- B. 血小板及粒细胞
- C. 纤维蛋白及淋巴细胞
- D. 纤维蛋白及粒细胞
- E. 纤维蛋白及红细胞

141. 血栓头部的主要成分是
142. 血栓尾部的主要成分是

(143—144 题共用备选答案)

- A. DNA 连接酶

- B. 核酸内切酶
- C. 引物酶
- D. DNA 聚合酶
- E. RNA 聚合酶

143. 参与转录过程的酶是
144. 仅在复制过程中合成短链 RNA 分子的酶是

(145—146 题共用备选答案)

- A. 耐心倾听,正确引导
- B. 对症下药,剂量安全
- C. 严谨求实,防止差错
- D. 尊重患者,心正无私
- E. 尊重患者,知情同意

145. 医师在询问病史过程中应遵循的主要伦理要求是

146. 男医师给女患者进行妇科检查时需有护士或其他医务人员在场的规定遵循的伦理要求是

(147—148 题共用备选答案)

- A. 乙酰乙酸
- B. 丙二酸
- C. 丙酮酸
- D. α -酮戊二酸
- E. 草酰乙酸

147. 可以直接转变为谷氨酸的物质是

148. 属于酮体的物质是

(149—150 题共用备选答案)

- A. IgD
- B. IgE
- C. IgA
- D. IgG
- E. IgM

149. 适应性体液免疫应答中最早产生的抗体分子是

150. 能透过血-胎屏障的抗体分子是

第三单元

A1 型选择题(1—45 题)

答 题 说 明

每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

- 以下关于腹股沟直疝的描述正确的是
 - 多数能进入阴囊
 - 多见于儿童和青壮年
 - 回纳后压住股沟内环,疝块不再突出
 - 极少发生嵌顿
 - 疝囊颈在腹壁下动脉外侧
- 甲状腺癌根治术时,VI区(中央组)淋巴结清扫是指清扫
 - 颈内静脉中群淋巴结
 - 颈后三角淋巴结
 - 颌下和颌下淋巴结
 - 前上纵隔淋巴结
 - 颈总动脉内缘至气管旁的淋巴结
- 病理类型可属于 T 细胞淋巴瘤的是
 - 间变性大细胞淋巴瘤
 - 滤泡性淋巴瘤
 - 黏膜相关性淋巴样组织淋巴瘤
 - 套细胞淋巴瘤
 - 边缘区淋巴瘤
- 瘢痕性幽门梗阻最突出的临床表现是
 - 消瘦
 - 呕吐胃内容物及胆汁
 - 移动性浊音阳性
 - 呕吐宿食,不含胆汁
 - 持续呃逆
- 急性弥漫性腹膜炎手术治疗的步骤不包括
 - 关腹前均在腹腔内用抗生素控制感染
 - 用生理盐水冲洗腹腔至清洁
 - 寻找引起腹膜炎的原发灶
 - 术后一般放置腹腔引流
 - 根据病变脏器的部位确定手术切口
- 鉴别肝癌与肝血管瘤最佳的检查方法是
 - 腹部 MRI
 - 腹部多普勒超声
 - 放射性核素肝扫描
 - 腹部 CT 平扫
 - 内镜检查
- 肠梗阻非手术治疗中,矫正全身生理紊乱的主要措施是
 - 纠正水、电解质紊乱和酸碱失衡
 - 胃肠减压
 - 禁食
 - 吸氧
 - 抗感染治疗
- 诊断溶血性贫血最可靠的实验室检查异常结果是
 - 血清红细胞生成素减低
 - 血清间接胆红素升高
 - 红细胞渗透脆性增加
 - 红细胞寿命缩短
 - 外周血红细胞形态异常
- 确诊胃十二指肠溃疡首选的检查是
 - 上消化道造影
 - 腹部超声
 - 胃镜
 - 腹部增强 CT
 - 内镜超声
- 对女性生殖器尖锐湿疣,不适宜的治疗是
 - 局部用三氯醋酸
 - 冷冻
 - 微波
 - 口服红霉素
 - 激光
- 维生素 K 缺乏时,不会出现的实验室检查结果是
 - PT 延长
 - FDP 增加
 - CT 延长
 - INR 升高
 - APTT 延长

12. 日本血吸虫病的临床分型不包括
- 急性血吸虫病
 - 异位血吸虫病
 - 晚期血吸虫病
 - 肝硬化型血吸虫病
 - 慢性血吸虫病
13. 手术创伤并术后禁食期间,患者机体代谢变化为
- 蛋白分解减少、糖异生减少、脂肪分解减少
 - 蛋白分解增加、糖异生减少、脂肪分解增加
 - 蛋白分解增加、糖异生增加、脂肪分解增加
 - 蛋白分解增加、糖异生减少、脂肪分解减少
 - 蛋白分解减少、糖异生增加、脂肪分解增加
14. 下列情况可以行乳腺癌保乳手术的是
- 不同象限的多个病灶
 - 患侧乳腺内有弥漫钙化灶
 - 合并有硬皮病的患者
 - 外上象限直径 2cm 肿瘤
 - 曾接受过胸部放疗的患者
15. 引起流行性脑脊髓膜炎的脑膜炎菌群的特点不包括
- 在体外易自溶
 - 革兰染色阳性
 - 多数由 A、B、C 群引起
 - 13 个血清群
 - 奈瑟菌属
16. 下列病毒性疾病中,血白细胞总数及中性粒细胞比例升高的是
- 病毒性肝炎
 - 麻疹
 - 艾滋病
 - 流行性腮腺炎
 - 流行性乙型脑炎
17. 狼疮肾炎诱导期治疗中,以下免疫抑制剂中首选的是
- 硫唑嘌呤
 - 甲氨蝶呤
 - 环磷酰胺
 - 来氟米特
 - 雷公藤
18. 肝硬化门静脉高压最常见的并发症是
- 自发性细菌性腹膜炎
 - 原发性肝癌
 - 肝肾综合征
 - 上消化道出血
 - 肝性脑病
19. 胃腺癌的最好发部位是
- 胃窦
 - 幽门
 - 胃体
 - 贲门
 - 胃底
20. 属于胃十二指肠溃疡手术后早期并发症的是
- 术后胃瘫
 - 营养不良性并发症
 - 早期倾倒综合征
 - 残胃癌
 - 碱性反流性胃炎
21. 治疗和预防创伤发生气性坏疽的关键措施是
- 注射破伤风抗毒素
 - 快速补液与输血
 - 应用大剂量青霉素
 - 即刻予高压氧治疗
 - 尽早行彻底清创术
22. 下列贫血性疾病中,属于大细胞性贫血的是
- 再生障碍性贫血
 - 地中海贫血
 - 慢性病性贫血
 - 缺铁性贫血
 - 恶性贫血
23. 下列疾病中最少发生急性肝衰竭的是
- 药物性肝病
 - 慢性乙型肝炎
 - 右半肝切除术后
 - 非酒精性脂肪性肝病
 - 四氯化碳中毒
24. 不符合乙状结肠扭转临床特点的是
- 呕吐早且频繁
 - 可见不对称腹胀或肠型
 - 钡灌肠钡影尖端呈“鸟嘴”形
 - 腹部压痛及肌紧张不明显
 - 腹部 X 线可见马蹄状充气肠袢
25. 手术区皮肤消毒范围边缘至少距手术切口
- 15cm
 - 13cm
 - 10cm
 - 20cm
 - 17cm
26. 关于创伤时应用止血带,正确的是
- 止血带一般使用时间不超过 4 小时
 - 止血带每隔 2 小时松开 2~3 分钟
 - 紧急时可用电线充当止血带
 - 松开止血带时,伤口处不应加压,以免影响血供
 - 止血带的位置应在伤处的上一个关节处
27. 下列开放性创伤中可以进行清创缝合的是
- 面部锐器伤 6 小时的伤口
 - 已有脓性分泌物的伤口

- C. 有明显局部红、肿、热、痛的伤口
D. 刚被手术缝针刺伤的伤口
E. 四肢损伤超过 18 小时的伤口
28. 以下关于腹部闭合性损伤导致肠损伤的描述, 错误的是
A. 小肠损伤后腹腔穿刺常呈阳性
B. 小肠损伤后易出现腹膜刺激征
C. 肠损伤后均有膈下游离气体
D. 小肠损伤多于结肠损伤
E. 结肠损伤后的感染表现一般较晚但严重
29. 肠外营养的技术性并发症中最严重的是
A. 神经损伤
B. 空气栓塞
C. 胸导管损伤
D. 气胸
E. 血胸
30. 胃癌最常见的病理类型是
A. 鳞状细胞癌
B. 小细胞癌
C. 未分化癌
D. 印戒细胞癌
E. 腺癌
31. 抗休克治疗中, 下列提示微循环改善的指标中, 临床上最有意义的是
A. 脉率减慢
B. 尿量已达 30ml/h
C. 肤色转红润
D. 神志变清楚
E. 肢端温度上升
32. 慢性乙型肝炎最重要的治疗药物是
A. 扶正化瘕胶囊
B. 恩替卡韦
C. 甘草酸二胺
D. 利巴韦林
E. 胸腺肽
33. 肛裂“三联征”为
A. 肛裂, 前哨痔和肛周脓肿
B. 肛裂, 肛乳头肥大和肛周脓肿
C. 肛裂, 前哨痔和肛乳头肥大
D. 肛裂, 大便失禁和肛乳头肥大
E. 肛裂, 前哨痔和大便失禁
34. 造成阑尾管腔阻塞从而诱发急性阑尾炎的最常见原因是
A. 阑尾肿瘤压迫
B. 食物残渣进入阑尾管腔
C. 阑尾壁淋巴滤泡增生
D. 蛔虫进入阑尾管腔
E. 粪石阻塞管腔
35. 肝硬化腹水形成的决定性因素是
A. 中心静脉压增高
B. 门静脉高压
C. 醛固酮分泌增加
D. 抗利尿激素增加
E. 肝内淋巴液容量增加和淋巴回流不畅
36. 病情恢复后不发生病原携带状态的传染病是
A. 乙型肝炎
B. 甲型肝炎
C. 细菌性痢疾
D. 丙型肝炎
E. 伤寒
37. 甲状腺功能亢进症手术治疗的适应证是
A. 中度甲亢内科治疗无效者
B. 青少年患者
C. 甲状腺 I 度肿大
D. 症状较轻者
E. 合并不稳定型心绞痛者
38. 消毒用医用酒精的常用浓度是
A. 40%
B. 30%
C. 90%
D. 70%
E. 50%
39. 血栓闭塞性脉管炎查体的特异性体征是
A. 足背动脉搏动消失
B. Homans 征阳性
C. Trendelenburg 试验阳性
D. Perthes 试验阳性
E. Buerger 试验阳性
40. 急性胰腺炎最常见的临床表现是
A. 腹泻
B. 呕吐
C. 停止排气排便
D. 黄疸
E. 上腹部疼痛
41. 升结肠癌的主要表现是
A. 便秘
B. 肠梗阻
C. 便血
D. 贫血
E. 腹泻
42. 下腹部手术拆线时间一般为术后
A. 7~9 天
B. 4~5 天
C. 13~14 天
D. 6~7 天
E. 10~12 天
43. 可出现血液中抗壁细胞抗体阳性的疾病是
A. 慢性非萎缩性胃炎
B. 急性胃炎
C. 慢性萎缩性胃炎



- D. 反流性食管炎
- E. 十二指肠溃疡

44. 类风湿性关节炎的临床特点不包括

- A. 类风湿因子常阳性
- B. 晨僵持续时间大于 1 小时
- C. 非甾体抗炎药能改善关节疼痛
- D. 反复发作虹膜睫状体炎

- E. 多关节、小关节受累

45. 重度 CO 中毒时,COHb 血浓度至少应达到

- A. 10%
- B. 40%
- C. 20%
- D. 30%
- E. 60%

A2 型选择题 (46—105 题)

答 题 说 明

每一道考题下面是一个小案例出现的,其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

46. 女,40 岁。2 天前体检超声提示胆囊内 3cm 强回声团,后伴声影,胆囊壁厚 6mm,平素无不适。糖尿病病史 5 年,目前血糖控制良好。无腹部手术史。其他检查未见异常,最适合患者的治疗方案是

- A. 腹腔镜胆囊切除术
- B. 保守治疗
- C. ERCP 取石
- D. 开腹胆囊切除术
- E. 胆囊造瘘术

47. 女,65 岁。多关节肿痛 2 年,晨僵约 1 小时,查体:双手掌指关节对称性肿胀,压痛,双手 X 线示:双侧第 2、3 掌指关节骨破坏,该疾病主要治疗药物不包括

- A. 羟氯喹
- B. 来氟米特
- C. 柳氮磺吡啶
- D. 甲氨蝶呤
- E. 别嘌醇

48. 男,60 岁,上腹胀、隐痛伴有皮肤黄染,食欲不振、厌油腻饮食 1 个月,症状进行性加重,体重减轻 5kg,10 天前开始出现大便颜色变浅,近 2 天大便呈陶土样,查体:巩膜明显黄染,肝脾肋下未触及,右肋下缘可触及肿大的胆囊底部,无压痛。实验室检查:血总胆红素 340 μ mol/L,血 AFP 5 μ g/L,最可能的诊断为

- A. 胆囊结石
- B. 肝门部胆管癌
- C. 肝癌
- D. 胆总管下段癌
- E. 胆总管结石

49. 男,50 岁。呕血黑便 4 小时,发病前曾食硬质食物,发现 HBsAg(+)30 年,查体:P 108 次/分,BP

90/60mmHg,烦躁,面色苍白、皮肤湿冷。应首先考虑的出血原因是

- A. 食管胃底静脉曲张破裂
- B. 食管肿瘤
- C. 胃溃疡
- D. 十二指肠溃疡
- E. 急性胃黏膜病变

50. 女,31 岁。甲状腺次全切除术后 6 小时,觉憋气、烦躁,迅速加重。查体:BP 120/90mmHg,神志清楚,颈部肿胀,口唇发绀,无声音嘶哑,觉呼吸急促伴双肺呼吸音粗,未闻及啰音。此时应给予的紧急处理措施是

- A. 立即面罩高流量吸氧
- B. 开放伤口,根据情况行气管切开
- C. 立即注射呼吸兴奋剂
- D. 保持引流管通畅
- E. 半坐位,充分吸痰

51. 女,31 岁。发热伴乏力,牙龈出血 1 周,化验血常规: Hb 100g/L,WBC $2.1 \times 10^9/L$,骨髓细胞学检查:骨髓增生极度活跃,可见 Auer 小体,MPO 染色(+),PAS 染色(-),NSE 染色(+),且不被氟化钠抑制,流式细胞术免疫表型: CD34(+),CD33(+),最可能诊断为

- A. AML - M₅
- B. AML - M₆
- C. AML - M₄
- D. AML - M₂
- E. AML - M₃

52. 男,56 岁。皮肤黄染 1 个月,逐渐加重,伴有皮肤瘙痒,大便灰白色,无发热。查体:T 36.8 $^{\circ}$ C, P 85 次/分, R 18 次/分, BP 130/80mmHg,巩膜皮肤黄染,双肺呼吸音清,未闻及干湿啰音,心律齐。腹软,肝肋下 4cm,未触及肿大胆囊, Murphy 征(-)。腹部 CT 示肝总管上段 2~1.5cm 占位病变。最适宜的术式是

- A. 肝门胆管、胆囊、部分肝外胆管及部分肝门区的肝组织切除
 B. 全胰腺切除术
 C. ERCP 取石术
 D. 胰头十二指肠切除术
 E. 左三叶肝切除术
53. 男, 45 岁。突发呕鲜血 2 小时, 约 400ml。发现 HBsAg (+) 20 年。查体: T 36.5°C, P 80 次/分, R 18 次/分, BP 120/80mmHg。巩膜无黄染, 双肺呼吸音清, 未闻及干湿性啰音, 心律齐。腹膨隆, 无压痛、反跳痛、肌紧张, 肝脏肋下未触及, 脾脏肋下 4cm, 移动性浊音 (+)。准备急症手术治疗, 术前检查中不包括
 A. 腹水常规检查
 B. 肾功能测定
 C. 出、凝血功能测定
 D. 血清电解质测定
 E. 肝功能测定
54. 男, 50 岁。头晕、乏力伴腰痛 3 个月。血常规: Hb 72g/L, WBC $6.4 \times 10^9/L$, Plt $125 \times 10^9/L$, ESR 106mm/h, 血清蛋白电泳见 M 蛋白带。尿蛋白 (+)。骨髓细胞学检查: 幼稚浆细胞占 0.42, 腰椎 X 线检查见第 2、3 椎体压缩性骨折。最可能的诊断是
 A. 反应性浆细胞增多症
 B. 多发性骨髓瘤
 C. 骨转移癌
 D. 慢性肾小球肾炎
 E. 霍奇金淋巴瘤
55. 男, 31 岁。反酸伴上腹胀 2 个月, 胸骨后烧灼样痛 3 天。最适当的处理措施是
 A. 口服阿司匹林, 胸痛时舌下含硝酸甘油
 B. 冠状动脉造影
 C. 食管 24 小时 pH 监测
 D. 多潘立酮及枸橼酸铋钾口服
 E. 口服奥美拉唑
56. 女, 45 岁。突发右上腹疼痛 6 小时。发病前曾进食油腻食物, 伴发热, 无寒战。查体: T 39.6°C, P 130 次/分, BP 86/60mmHg, 神志淡漠, 巩膜黄染。心肺未见明显异常。右上腹胀痛、反跳痛、肌紧张阳性。实验室检查: WBC $20 \times 10^9/L$, 总胆红素 $110\mu\text{mol/L}$, 直接胆红素 $78\mu\text{mol/L}$, 腹部 B 超提示肝内外胆管扩张。该病人治疗的首要措施是
 A. 胆道引流
 B. 应用抗生素
 C. 保护肝功能
 D. 抗休克治疗
 E. 解痉镇痛
57. 女, 31 岁。口服有机磷农药 30ml 后出现口吐白沫、呼吸困难, 立即入院, 经洗胃、碘解磷定及阿托品治疗后症状有所缓解, 但 24 小时后再次出现呼吸困难。查体: R 16~18 次/分, BP 112/65mmHg, 昏迷, 呼吸浅慢, 皮肤湿冷, 瞳孔针尖样, 双肺可闻及湿啰音, 心率 50~60 次/分。急诊处理正确的是
 A. 立即气管插管机械通气治疗 + 解毒剂治疗
 B. 立即解毒治疗, 导泻, 必要时气管插管
 C. 立即解毒治疗, 重复洗胃, 必要时气管插管
 D. 立即气管插管机械通气, 强心、利尿剂治疗
 E. 立即给予呼吸兴奋剂 + 解毒剂治疗
58. 男, 56 岁。上腹不适, 进食后饱胀 2 个月, 时有恶心、呕吐, 上腹部隐痛, 无烧心、反酸, 查体: T 36.5°C, P 80 次/分, R 18 次/分, BP 120/80mmHg。身高 170cm, 体重 52kg, 心肺查体未见异常, 上腹部深压痛, 无肌紧张、反跳痛。胃镜在胃体小弯侧见直径 2.5cm 溃疡, 上覆有污秽苔, 质脆易出血, 其转移灶最常见的部位是
 A. 骨
 B. 胰
 C. 肺
 D. 肝
 E. 脑
59. 男, 40 岁, 乏力、反复牙龈出血及皮肤出血点 1 年。乙型肝炎病史 10 余年。查体: 左肋下可触及包块, 边界清、质地韧、有切迹, 随呼吸移动, 无压痛。该包块可能是
 A. 左肾
 B. 胰腺癌
 C. 脾脏
 D. 胃癌
 E. 肝脏左叶
60. 女, 28 岁。发现左颈前包块 1 个月。无多食、易饥、怕热、消瘦。查体: T 36.5°C, P 80 次/分, R 18 次/分, BP 120/80mmHg, 甲状腺左叶可触及直径约 1cm 质硬肿物, 表面不光滑, 颈部未触及肿大淋巴结。双肺呼吸音清, 未闻及干湿性啰音, 心律齐, 腹软, 无压痛。最有助于确诊的检查是
 A. 颈部增强 CT
 B. 甲状腺核素静态显像
 C. 颈部彩色多普勒超声
 D. 细针穿刺细胞学检查
 E. 血清甲状腺素水平
61. 男, 35 岁, 农民。发热 5 天, 尿少 1 天。查体: 体温 37.5°C, 面部潮红, 结膜充血水肿, 腋下可见数个出血点。实验室检查: 血 WBC $19 \times 10^9/L$ 。有异型淋巴细胞, 尿蛋白 (+++)。最可能的诊断是

- A. 肾综合征出血热
 B. 地方性斑疹伤寒
 C. 钩端螺旋体病
 D. 败血症
 E. 急性肾盂肾炎
62. 男, 50 岁。烦躁、昼睡夜醒 2 天。肝炎肝硬化病史 5 年。对明确意识障碍病因最有意义的实验室检查是
 A. 血糖
 B. ALT/AST
 C. 血清蛋白电泳
 D. 血氨
 E. 血电解质
63. 男, 50 岁。吃海鲜后夜间突发左足第一跖趾关节剧烈疼痛 1 天。查体: 关节局部红肿, 压痛明显。既往无类似发作。化验: 血尿酸 $602 \mu\text{mol/L}$ 。目前最主要的治疗药物是
 A. 苯溴马隆
 B. 别嘌吟
 C. 抗生素
 D. 非甾体抗炎药
 E. 甲氨蝶呤
64. 女, 45 岁。1 年来久站或长时间行走时觉左下腹部胀痛不适。查体: T 36.5°C , P 80 次/分, R 18 次/分。BP 120/80mmHg, 双肺呼吸音清, 未闻及干湿性啰音, 心律齐, 腹软, 无压痛, 立位左腹股沟韧带下方内侧突起半球形肿物, 平卧时可缩小, 咳嗽时无明显冲击感, 压迫内环后肿物仍可复出。该患者最适宜的手术方法是
 A. Shouldice 法疝修补术
 B. McVay 法疝修补术
 C. Bassini 法疝修补术
 D. Halsted 法疝修补术
 E. Ferguson 法疝修补术
65. 男, 28 岁。在气温 34°C 时, 负重跑步 5 公里后突发意识不清伴痉挛、抽搐 2 小时。查体: T 41.5°C , P 166 次/分, R 28 次/分, BP 100/42mmHg, 瞳孔等大等圆, 心尖部第一心音低钝。四肢肌张力高。最关键的治疗措施是
 A. 应用抗癫痫药物
 B. 应用镇静药
 C. 降温治疗
 D. 氧疗
 E. 应用甘露醇
66. 男, 40 岁。干农活时刺伤右足 10 天, 伤后未就医, 张口困难 2 天, 颈项紧, 频繁抽搐, 呼吸道分泌物较多, 有窒息的危险, 为保持呼吸道的通畅。最有效的措施是
 A. 气管切开
 B. 协助拍背咳嗽
 C. 环甲膜穿刺
 D. 气管插管
 E. 吸痰
67. 女, 40 岁。确诊为急性胰腺炎, 内科正规治疗 2 周后体温仍在 $38^{\circ}\text{C} \sim 39^{\circ}\text{C}$, 左上腹部压痛明显。血淀粉酶 256U/L , 血 WBC $16 \times 10^9/\text{L}$ 。可能性最大的是
 A. 败血症
 B. 病情迁延未愈
 C. 合并急性胆囊炎
 D. 并发胰腺假性囊肿
 E. 并发胰腺脓肿
68. 男, 35 岁。10 天前淋雨后出现发热, 按“感冒”治疗效果不佳。1 天前突发寒战、右上腹痛。查体: T 39°C , BP 120/80mmHg, 双肺未闻及干湿性啰音, 心律齐。肝肋下可触及, 压痛明显, 右腋前线第 8 肋间有叩痛。为明确诊断, 应首选的检查是
 A. 肝功能
 B. 胸部 X 线片
 C. 肝炎病毒标志物检测
 D. 腹部 B 超
 E. 血甲胎蛋白
69. 女, 22 岁。左额被刀划伤 12 小时就诊。直体: 左额部有 3cm 长伤口, 深及骨膜, 有血痂, 伤口周边无红肿。宜采取的处理方法是
 A. 清创后二期缝合
 B. 清创后一期缝合
 C. 清创后放置橡胶片引流
 D. 伤口敷料覆盖
 E. 局部应用抗生素
70. 男, 35 岁。被倒塌的房屋压伤左下肢 6 小时入院。查体: T 37°C , P 108 次/分, R 28 次/分, 左小腿大片肌肉撕脱, 伤口处留有大量污物。急诊行清创处理。术后 3 天。患者体温逐步上升, 烦躁不安, 大量出汗, 尿量明显减少。观察伤口: 左下肢明显肿胀, 见大量恶臭浆液血性渗出物, 皮下可触及捻发音。下面处理措施不正确的是
 A. 整块切除受累肌肉
 B. 术后勤换敷料
 C. 应用高压氧治疗
 D. 首选氨基糖苷类抗生素
 E. 病变区多处切开



71. 男, 22岁。咳嗽伴发热3天, 给予青霉素静脉滴注抗感染治疗, 用药后患者突然出现气急、胸闷、烦躁不安。查体: T 38.5℃, P 140次/分, R 32次/分, BP 75/40mmHg, 面色苍白, 大汗淋漓, 两肺可闻及哮鸣音, 身体多部位红色皮疹。最可能的原因是
- 感染性休克
 - 哮喘急性发作
 - 急性呼吸窘迫综合征
 - 过敏性休克
 - 急性左心衰竭
72. 女, 40岁。突发上腹痛、恶心8小时。疼痛由局部逐渐波及全腹, 伴发热。既往十二指肠溃疡病史20年。查体: T 38.4℃, P 104次/分, R 26次/分, BP 110/70mmHg, 双肺呼吸音清, 未闻及干湿性啰音, 心律齐。全腹肌紧张, 压痛和反跳痛阳性, 肠鸣音消失。对这种疾病的描述, 错误的是
- 保守治疗无效后需剖腹探查
 - 若诊断和治疗延误易致中毒性休克
 - 常常伴有代谢性碱中毒
 - 继发性腹膜炎较原发性腹膜炎多见
 - 大多数合并麻痹性肠梗阻
73. 男, 35岁。反复上腹痛3年, 疼痛向背部放射, 多在空腹及夜间出现。既往体健, 日常工作紧张。查体: T 36.5℃, P 80次/分, R 18次/分, BP 120/80mmHg。双肺呼吸音清, 未闻及干湿性啰音, 心律齐。腹软, 无压痛。最可能的诊断是
- 胃癌
 - 十二指肠溃疡
 - 胰腺癌
 - 胃溃疡
 - 食管溃疡
74. 女, 56岁。1小时前无诱因呕血一次, 量约400ml, 混有食物。既往体健, 否认胃肠道疾病病史。1年前因双侧膝关节疼痛开始服用吲哚美辛。查体: T 36.5℃, P 90次/分, R 18次/分, BP 120/80mmHg。双肺呼吸音清, 未闻及干湿性啰音, 心律齐。腹软。无压痛。粪常规: 未见白细胞, 粪隐血(+)。除停用吲哚美辛外, 应首选的治疗是
- 口服胃黏膜保护剂
 - 静脉应用H₂受体拮抗剂
 - 静脉应用质子泵抑制剂
 - 静脉应用止血芳酸
 - 肌注维生素K
75. 女, 31岁。间断腹痛、腹泻10个月。大便3~4次/天, 无发热。粪镜检: 红细胞及白细胞满视野。应用甲硝唑、左氧氟沙星治疗2周症状无缓解。最可能的诊断是
- 阿米巴肠病
 - 肠易激综合征
 - 慢性细菌性痢疾
 - 结肠癌
 - 溃疡性结肠炎
76. 男, 28岁。急性化脓性阑尾炎。接受阑尾切除术后5小时, 再次出现腹痛, 伴烦躁、焦虑。查体: T 37.8℃, P 130次/分, BP 80/60mmHg, 面色苍白, 皮肤湿冷, 双肺呼吸音清, 未闻及啰音, 腹胀, 全腹轻度压痛, 轻度肌紧张, 未闻及肠鸣音。该病人首先要注意排除的危急情况是
- 术后出血
 - 肠瘘
 - 粘连性肠梗阻
 - 盆腔脓肿
 - 切口裂开
77. 男, 65岁。间断左下肢疼痛3年, 加重1个月。疼痛于较长时间行走后加重, 休息后可好转。近1个月来休息后疼痛无好转, 既往高血压、血脂异常病史15年。查体: T 36.5℃, P 80次/分, BP 150/90mmHg, 双肺呼吸音清, 未闻及干湿性啰音, 心律齐, A₂ > P₂。腹软, 无压痛, 左足苍白, 左足及左下肢皮温明显降低, 左股动脉可触及搏动, 左腘动脉、足背动脉搏动消失。左下肢病变首先应考虑的诊断是
- 动脉硬化性闭塞症
 - 深静脉血栓形成
 - 血栓性浅静脉炎
 - 急性动脉栓塞
 - 血栓闭塞性脉管炎
78. 女, 45岁。被汽车撞伤4小时, 出现右上腹及背部疼痛。向右肩部放射, 呕吐物为血性。查体: T 36.5℃, P 100次/分, R 18次/分。BP 110/70mmHg。神志清楚。双肺呼吸音清, 未闻及干湿性啰音, 心律齐, 上腹部轻压痛, 无明显肌紧张, 直肠指检可在骶前触及捻发感, 腹部平片见腹膜后积气。应首先考虑损伤的脏器为
- 右肺部损伤
 - 肝脏损伤
 - 右肾损伤
 - 十二指肠损伤
 - 脾脏损伤
79. 男, 22岁。大量饮酒后突发上腹部胀痛, 伴恶心、呕吐2小时。查体: P 102次/分, BP 110/60mmHg, 双肺

- 呼吸音清,未闻及干湿性啰音,心律齐。上腹部压痛明显,反跳痛(+),肠鸣音减弱。血、尿常规及尿淀粉酶检查,立位腹部 X 线平片均未见明显异常。最可能的诊断是
- 急性肠梗阻
 - 胆囊结石
 - 急性胰腺炎
 - 急性胆囊炎
 - 上消化道穿孔
80. 男,56 岁。无痛性黄疸 2 个月,呈渐进性加重。手术探查时见胆囊肿大。胆总管增粗。直径约 1.8cm,胰头部可触及质硬肿块,尚能推动。正确的手术方式是
- 胰头十二指肠切除术
 - 胰空肠吻合术
 - 胰头部分切除术
 - 全胰切除术
 - 胆囊空肠吻合术
81. 男,50 岁。面色苍白、乏力半年,牙龈出血 1 周。化验血常规:Hb 72g/L, WBC $2.8 \times 10^9/L$, Plt $32 \times 10^9/L$ 。骨髓细胞学检查:增生明显活跃,原始细胞占 0.02,全片见巨核细胞 40 个,铁染色示细胞外铁(++),环形铁粒幼细胞占 0.01,诊断为骨髓增生异常综合征(MDS)。根据 WHO 分型标准,还需要进行检查的项目是
- 骨髓细胞染色体
 - 骨髓活检
 - 骨髓细胞流式细胞术
 - 骨髓细胞融合基因
 - 骨髓干细胞培养
82. 女,25 岁。宫颈管分泌物涂片见中性粒细胞内有革兰阴性双球菌。首选的治疗药物是
- 多西环素
 - 青霉素
 - 红霉素
 - 头孢曲松
 - 克林霉素
83. 女,28 岁。肛门持续剧痛 1 天。查体:T 36.5℃, P 80 次/分, BP 120/80mmHg, 双肺呼吸音清,未闻及干湿性啰音,心律齐,腹软,无压痛,未触及包块,肛门口有直径 0.8cm 的肿物。呈暗紫色、质硬,触痛明显,最可能的诊断是
- 内痔脱出
 - 肛周脓肿
 - 肛裂
 - 直肠息肉
 - 血栓性外痔
84. 男,40 岁。腹胀、乏力 5 个月。嗜睡、言语混乱 2 天。既往患乙型肝炎 20 年。查体:T 36.5℃, P 80 次/分, R 18 次/分, BP 120/80mmHg, 神志不清,消瘦,皮肤巩膜黄染。双肺呼吸音清,未闻及干湿性啰音,心律齐,腹软,无压痛,移动性浊音(+). 诱发患者出现神经精神症状的因素中,最不可能的是
- 应用苯二氮革类镇静剂
 - 摄入大量蛋白质
 - 摄入大剂量维生素 C
 - 应用大剂量利尿剂
 - 便秘
85. 男,60 岁。1 小时前突发呕血 500ml,既往有慢性乙肝病史。查体:P 105 次/分, BP 95/70mmHg,轻度烦躁。目前首要的处理是
- 输注胶体扩容
 - 输注晶体扩容
 - 输红细胞悬液
 - 应用止血药
 - 输全血
86. 女,22 岁。间断腹泻半年。大便 3~4 次/天,伴下腹部疼痛。既往有肺结核病史。查体:T 37.5℃, P 90 次/分,心肺未见异常。右下腹压痛(+),可触及边界不清包块。实验室检查:ESR 60mm/h, PPD(+++)。最可能的诊断是
- 克罗恩病
 - 结肠病
 - 肠结核
 - 肠易激综合征
 - 细菌性痢疾
87. 男,40 岁。半日来腹泻 20 多次,稀水样便。于 8 月明显发热及腹痛。查体:T 36℃, P 100 次/分, R 20 次/分, BP 90/60mmHg, 神智清,轻度脱水,腹软无压痛,肠鸣音活跃。粪便常规检查白细胞 0~1/HP。最可能的诊断是
- 急性肠炎
 - 阿米巴痢疾
 - 胃肠型食物中毒
 - 霍乱
 - 急性细菌性痢疾
88. 男,28 岁。右上腹撞伤后腹痛 2 小时。查体:P 140 次/分, R 24 次/分, BP 80/40mmHg, 神智清,面色苍白,双肺呼吸音清,腹部膨隆,腹式呼吸减弱,全腹压痛,以右上腹为著,伴反跳痛,肝区叩诊(+),诊断为

- A. 右肺损伤
B. 肝脏损伤
C. 右肾损伤
D. 十二指肠损伤
E. 脾脏损伤
89. 男, 35 岁, 4 个月前从非洲旅行回国出现寒战、高热、大汗。当地医院考虑为疟疾。给予氯喹治疗后体温正常。之后再次去过流行区。1 周前再次出现寒战、高热、大汗。应考虑为
- A. 再燃
B. 疟原虫产生耐药
C. 再次感染疟原虫
D. 混合感染
E. 复发
90. 男孩, 4 岁。发热、头痛、皮疹 12 小时, 频繁抽搐、昏迷 2 小时。查体: 全身可见大量瘀点瘀斑, 双下肢有部分融合成片, 血压测不出, 右侧瞳孔散大, 对光反射消失。下列处理不正确的是
- A. 吸氧及心电图监护
B. 瘀点涂片检菌
C. 立刻腰椎穿刺做脑脊液常规检查
D. 20% 甘露醇立即静脉滴注
E. 急查 DIC 指标
91. 男, 28 岁。左下肢疼痛 6 个月, 加重 1 个月。初起长时间行走后加重, 休息后可缓解, 1 个月前起休息时亦觉疼痛。曾间断发生左下肢不同部位红线状病灶。无高血压、糖尿病病史, 吸烟 10 年。查体: T 36.5°C, R 18 次/分, BP 120/80mmHg, 心肺腹未见异常, 左足苍白, 左足背动脉搏动消失, 左股、腘动脉可触及搏动。左下肢病变应首先考虑的诊断是
- A. 急性动脉栓塞
B. 血栓性浅静脉炎
C. 动脉硬化性闭塞症
D. 深静脉血栓形成
E. 血栓闭塞性脉管炎
92. 男, 56 岁。反复上腹痛 2 年, 加重 3 个月。腹痛无明显规律性, 伴乏力, 间断黑便。3 个月以来体重减轻 10kg, 查体: T 36.5°C, P 80 次/分, R 18 次/分, BP 120/80mmHg。皮肤巩膜无黄染, 双肺呼吸音清, 未闻及干湿性啰音, 心律齐, 腹软, 无压痛。血常规: Hb 110g/L, WBC $9.6 \times 10^9/L$, N 0.86, Plt $158 \times 10^9/L$ 。对明确诊断最有价值的检查是
- A. 胃液分析
B. 胃镜
C. 腹部 B 超
D. 腹部 CT
E. 胃脱落细胞检查
93. 男, 71 岁。乏力伴食欲不振半年。查体: 贫血貌, 心肺腹部未见异常。化验血常规: WBC $3.0 \times 10^9/L$, Hb 88g/L, Plt $75 \times 10^9/L$, MCV 122fl, MCH 34pg, Ret 0.04。该患者最可能的诊断是
- A. 缺铁性贫血
B. 慢性病性贫血
C. 脾功能亢进
D. 巨幼细胞性贫血
E. 再生障碍性贫血
94. 男, 65 岁。间断腹痛伴呕吐、乏力、少尿 6 小时, 呕吐量大, 无口渴。5 年前行“急性重症胰腺炎腹腔引流术”。此时患者最可能的水电解质平衡紊乱是
- A. 等渗性缺水
B. 高渗性缺水
C. 低渗性缺水
D. 高钾血症
E. 稀释性低钠血症
95. 女, 35 岁。发热 10 天, 体温 37.9°C, 周身不适, 乏力。2 天后体温恢复正常, 但乏力加重, 尿色变黄, 伴食欲不振, 腹胀。既往无肝炎病史。实验室检查: ALT 1 008U/L, TBiL $87 \mu\text{mol/L}$, HBsAg (+), HBeAg (+), 抗 HBeIgM (+)。抗 HAV IgG (+), 抗 HAV IgM (+), HAV Ag (-)。最可能的诊断是
- A. 病毒性肝炎, 甲乙型病毒混合感染, 急性黄疸型
B. 病毒性肝炎, 乙型, 急性黄疸型, HAV 既往感染
C. 病毒性肝炎, 乙型, 急性黄疸型, HAV 携带者
D. 病毒性肝炎, 甲型, 急性黄疸型, HBV 携带者
E. 病毒性肝炎, 甲型, 急性黄疸型, HBV 既往感染
96. 男, 31 岁。5 天前因十二指肠球部溃疡行毕 II 式胃大部切除术, 今晨突然右上腹部剧痛、腹胀、恶心、呕吐少量血性液体。查体: 腹肌紧张, 伴压痛、反跳痛, 右侧显著。血常规: Hb 120g/L, WBC $11.2 \times 10^9/L$, N 0.85, Plt $112 \times 10^9/L$, 最可能的诊断是
- A. 十二指肠残端破裂
B. 胃肠吻合口漏
C. 急性胰腺炎
D. 胆囊穿孔
E. 应激性溃疡穿孔
97. 男, 60 岁。慢性乙型病毒性肝炎病史 35 年, 3 次查血甲胎蛋白升高。肝功能异常。腹部 B 超示肝脏内见直径 2cm 占位性病变。对诊断及治疗最有意义的检查是
- A. 腹部增强 CT
B. MRCP
C. 放射性核素扫描

- D. 腹部 CT 平扫
E. 腹部 X 线平片
98. 女, 56 岁。间断上腹胀 10 年, 加重 1 周。无腹泻、便秘、恶心、呕吐。既往体健。查体: T 36.5℃, P 80 次/分, R 18 次/分, BP 120/80mmHg。双肺呼吸音清, 未闻及干湿性啰音, 心律齐。腹软, 无压痛。胃肠镜检查: 胃黏膜菲薄, 黏膜下血管透见。黏膜活组织病理检查可见肠上皮化生。适当的治疗措施是
- A. 内镜下治疗肠上皮化生病灶
B. 应用抗胆碱能药物
C. 应用促胃肠动力药物
D. 应用质子泵抑制剂
E. 胃大部切除术
99. 女, 35 岁, 体健。超声提示胆囊内强回声光团, 直径 0.5mm, 后伴声影, 随体位改变而移动。既往无右上腹疼痛、发热及黄疸等症状。血常规正常, 血糖正常。该患者适当的处理是
- A. 体外震波碎石
B. 给予利胆排石药物
C. 腹腔镜胆囊切除术
D. 观察随诊
E. 胆囊切开取石
100. 男, 22 岁。上腹痛 1 日, 次日转至右下腹, 伴恶心, 无呕吐。查体: T 38.5℃, 双肺呼吸音清, 未闻及干湿性啰音, 心律齐, 腹平软, 右下腹明显压痛, 反跳痛(+), 未触及包块。血 WBC $15.6 \times 10^9/L$, N 0.86, 尿沉渣镜检: RBC 1~3/HP, WBC 2~3/HP。最可能的诊断是
- A. 急性胆囊炎
B. 右侧输尿管结石
C. 急性肠系膜淋巴结炎
D. 急性化脓性阑尾炎
E. 十二指肠溃疡急性穿孔
101. 女, 35 岁。血常规检查发现三系细胞减少 1 月余, 发热 3 天。查体: T 38.5℃, 肝脾肋下未触及。骨髓细胞学检查: 增生极度低下, 可见较多脂肪滴。首先考虑的诊断是
- A. 淋巴瘤
B. 骨髓增生异常综合征
C. 急性白血病
D. 阵发性睡眠性血红蛋白尿
E. 再生障碍性贫血
102. 女, 40 岁。烧伤 1 小时。查体: T 37.8℃, P 131 次/分, R 27 次/分, BP 82/53mmHg。双侧臀部、双侧大小腿及足部皮肤烧伤, 创面无水泡, 呈蜡白色, 痛觉消失。体重 60kg。该患者第一个 24 小时补液理论上应是
- A. 血浆 1 380ml, 平衡盐溶液 2 760ml, 5% 葡萄糖溶液 2 000ml
B. 全血 1 380ml, 平衡盐溶液 2 760ml, 5% 葡萄糖溶液 2 000ml
C. 血浆 2 000ml, 平衡盐溶液 3 000ml, 5% 葡萄糖溶液 1 500ml
D. 血浆 2 000ml, 平衡盐溶液 2 000ml, 5% 葡萄糖溶液 1 500ml
E. 血浆 2 760ml, 平衡盐溶液 1 380ml, 5% 碳酸氢钠溶液 2 000ml
103. 男, 35 岁, 农民。发热 5 天, 入院体温持续在 39℃ 以上, 伴寒战、全身乏力, 明显头痛。近 2 天出现腹泻, 每日 3~5 次, 水样便。既往体健。查体: T 39.4℃, P 104 次/分, R 22 次/分, BP 135/80mmHg。结膜充血, 巩膜轻度黄染, 咽红, 腹股沟淋巴结轻度肿大, 有压痛, 质软, 心肺未见异常, 腹软, 压痛及反跳痛(-), 肝肋下压痛明显, 有触痛, 脾肋下未触及, 腓肠肌压痛明显, 双侧 Babinski(-)。实验室检查: 血 WBC $10.5 \times 10^9/L$, 中性粒细胞 0.80。淋巴细胞 0.20, ALT 210U/L, TBil 40μmol/L。尿蛋白(+). 该患者最可能的诊断是
- A. 败血症
B. 伤寒
C. 钩端螺旋体病
D. 病毒性肝炎急性黄疸型
E. 肾综合征出血热
104. 男, 56 岁。反复上腹痛伴暖气 10 年, 无反酸, 曾行胃镜及病理检查提示重度萎缩性胃炎。近期出现乏力及消瘦。胃镜发现胃角巨大溃疡, 周边不规则隆起, 中心有较大血凝块附着, 其余部位无出血病变。行手术治疗。术后病理最可能为
- A. 胃淋巴瘤
B. 胃间质瘤
C. 胃癌
D. 胃溃疡
E. 胃结核
105. 女, 56 岁。宫颈癌行子宫切除术后 3 天, 晨起时突发左下肢肿胀, 左腿皮温增高, 股三角区有深压痛, 足背动脉搏动存在。最可能的诊断是左下肢
- A. 血栓性浅静脉炎
B. 动脉栓塞
C. 淋巴水肿
D. 大隐静脉曲张
E. 深静脉血栓形成

A3/A4 型选择题 (106—134 题)

答 题 说 明

以下提供若干个案例,每个案例下设若干道试题。请根据案例提供的信息,在每一道试题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(106—107 题共用题干)

女,22 岁。右手及前臂沸水烫伤 1 小时。查体:右手及前臂红肿明显,有水疱,部分水疱皮脱落,可见创面红白相间,疼痛迟钝。

106. 理论上判断该患者烧伤面积占体表面积百分比是
- 5.5%
 - 4.5%
 - 3%
 - 6.5%
 - 9%
107. 该患者烧伤深度及严重程度分度是
- 深 II°, 中度烧伤
 - 浅 II°, 中度烧伤
 - 浅 II°, 轻度烧伤
 - 深 II°, 轻度烧伤
 - 深 II°, 重度烧伤

(108—110 题共用题干)

男,35 岁。纳差、腹胀 2 个月。查体:浅表淋巴结未触及,巩膜无黄染,肝肋下未触及,脾肋下 8.5cm,质硬。化验血常规:Hb 100g/L, WBC $67.7 \times 10^9/L$,原始细胞 0.02,早幼粒细胞 0.02,中幼粒细胞 0.13,晚幼粒细胞 0.18,杆状核粒细胞 0.08,分叶粒细胞 0.37, E 0.06, B 0.09, L 0.04, M 0.01, Plt $543 \times 10^9/L$ 。

108. 该患者最可能的诊断是
- 急性早幼粒细胞白血病
 - 巨幼细胞贫血
 - 骨髓纤维化
 - 慢性粒细胞白血病
 - 慢性淋巴细胞白血病
109. 该患者最可能的染色体改变是
- t(8;16)(p11;p13)
 - t(9;22)(q34;q11)
 - t(9;21)(q34;q21)
 - t(8;21)(q22;q22)
 - t(15;17)(q22;q21)
110. 应首选的治疗药物是
- 羟基脲,甲磺酸伊马替尼
 - 亚砷酸,全反式维甲酸
 - 苯丁酸氮芥,糖皮质激素

- 维生素 B₁₂, 叶酸
- 沙利度胺,红细胞生成素

(111—112 题共用题干)

男,56 岁。突发呕吐 1 小时。呕吐量约 500ml,鲜红色,可见血块,伴大汗、心慌。查体:T 38.5°C, P 112 次/分, R 26 次/分, BP 114/80mmHg, 巩膜轻度黄染,肝掌(+),胸壁可见蜘蛛痣,心肺未见明显异常,腹胀,肝肋下未触及。脾肋下 3cm,移动性浊音(+). 血常规:Hb 95g/L, WBC $3.6 \times 10^9/L$, Plt $46 \times 10^9/L$ 。半年前上消化道 X 线钡剂造影示食管虫蚀状改变,可见蚯蚓状及串珠状影。

111. 该患者上述表现中最有诊断意义的临床特点是
- 呕吐及黑便
 - 上消化道 X 线钡餐造影示食管串珠样表现
 - 移动性浊音阳性
 - 肝掌及蜘蛛痣
 - 脾大、脾亢
112. 如该患者未及时治疗,最易出现的并发症是
- 急性肾衰
 - 急性肝脓肿
 - 肝性脑病
 - 急性心衰
 - 局限性腹膜炎

(113—115 题共用题干)

女,45 岁。腹泻 10 年。精神紧张时加剧,排便前腹痛,排便后腹痛可缓解。大便为糊状,发病以来体重无明显变化。既往体健,平素进食好,睡眠差。查体:T 36.5°C, P 80 次/分, R 18 次/分, BP 120/80mmHg。未见皮疹,双肺呼吸音清,未闻及干湿性啰音,心律齐。腹软,无压痛。

113. 最有可能的诊断是
- 肠易激综合征
 - 克罗恩病
 - 慢性细菌性痢疾
 - 肠结核
 - 结肠癌
114. 为明确诊断,首选的检查是
- 结肠镜
 - 全消化道 X 线钡餐造影
 - 腹部 CT

- D. 腹部血管造影
- E. 小肠镜

115. 适宜的治疗措施是

- A. 微生态制剂
- B. 抗结核治疗
- C. 手术治疗
- D. 抗生素
- E. 糖皮质激素

(116—118 题共用题干)

女,45岁。乏力、纳差、眼黄、尿黄6天入院,病前2个月外出旅游20多天,多在餐馆用餐及进食生冷食物。实验室检查:ALT 860U/L, AST 620U/L, TBil 260 μ mol/L, DBil 160 μ mol/L, PTA 85%。

116. 为明确诊断,应追问的病史不包括

- A. 饮酒史
- B. 服用损肝药物史
- C. 输血史
- D. 既往肝炎病史
- E. 宠物接触史

117. 如查体发现患者有肝掌,脾大。化验抗 HAV-IgM、抗 HEV 均(-), HBsAg、HBeAg 及抗 HBc(+), HBV-DNA 5.1×10^6 copies/ml。应诊断为

- A. HBsAg 携带者
- B. 肝衰竭
- C. HBV 携带者
- D. 急性乙型肝炎
- E. 慢性乙型肝炎

118. 最重要的治疗是

- A. 中药治疗
- B. 抗 HBV 治疗
- C. 对症治疗
- D. 抗肝纤维化治疗
- E. 保肝治疗

(119—121 题共用题干)

男,65岁。排便次数增加6个月,伴里急后重、排便不尽感。1个月来大便变细,偶有大便表面带血,自觉乏力,体重减轻4kg。

119. 首选的检查方法是

- A. 粪隐血
- B. 直肠指检
- C. 腹部超声
- D. 结肠镜
- E. 腹部 CT

120. 决定该病人手术方式的要点是

- A. 是否合并肠周淋巴结转移
- B. 病灶浸润肠壁的深度

C. 病灶下缘距齿状线距离

D. 病灶浸润肠壁的周长

E. 病灶浸润肠壁的长度

121. 该疾病最常见的远处转移部位是

- A. 脾
- B. 肝脏
- C. 骨骼
- D. 脑
- E. 肺

(122—124 题共用题干)

女,22岁,突发腹痛12小时。腹痛呈持续性,先以脐部为主,后固定于右下腹,逐渐加重,伴恶心,无呕吐。查体:T 37.5 $^{\circ}$ C, P 100次/分, R 22次/分, BP 110/70mmHg。痛苦面容,双肺未闻及啰音,心律齐。腹软,右下腹压痛,无反跳痛, Murphy 征阴性,肝脾肋下未触及,肠鸣音减弱。血常规:Hb 120g/L, WBC 13×10^9 /L, N 0.85, Plt 200×10^9 /L, 拟手术治疗。

122. 如腰大肌试验阳性,则术中阑尾最可能的位置是

- A. 盆位
- B. 回肠前位
- C. 盲肠后位
- D. 盲肠下位
- E. 回肠后位

123. 如该患者为妊娠期,以下处理不正确的是

- A. 手术切口需偏高
- B. 围手术期应加用黄体酮
- C. 临产期可行剖宫产同时切除阑尾
- D. 常规放置引流管
- E. 术后使用广谱抗生素

124. 【假设信息】该患者术后10天,排便、排尿频繁,伴里急后重感。T38.5 $^{\circ}$ C, 直肠指诊在直肠前壁触及有波动感的包块,触痛明显。最主要的治疗方法是

- A. 充分引流
- B. 温盐水灌肠
- C. 应用抗生素
- D. 热水坐浴
- E. 物理透热

(125—126 题共用题干)

男,31岁。双侧臀区交替性疼痛9年余,间断腰痛6年,疼痛主要发生在夜间,伴有晨僵。近3周症状加重,有夜间痛醒现象。查体:腰部活动受限,右侧“4”字试验阳性。实验室检查:血沉 24mm/h, HLA-B27 (+)。

125. 最可能的诊断是

- A. 腰椎间盘突出症

- B. 类风湿性关节炎
- C. 腰椎肿瘤
- D. 腰椎管狭窄症
- E. 强直性脊柱炎

126. 最恰当的治疗是

- A. 骨科牵引
- B. 骨科手术
- C. 口服甲氨蝶呤
- D. 休息理疗
- E. 口服非甾体抗炎药

(127—128 题共用题干)

女,36岁。腹痛、腹胀1个月。伴发热,下午较明显,无寒战,无恶心、呕吐、腹泻。查体:T 37.5℃,P 80次/分,R 18次/分,BP 120/80mmHg。双肺呼吸音清,未闻及干湿性啰音,心律齐。腹部膨隆,全腹弥漫性压痛,无反跳痛,移动性浊音(+).胸部X线检查:右上肺可见钙化灶。

127. 应首先考虑的诊断是

- A. 腹膜转移癌
- B. 结核性腹膜炎
- C. 腹膜间皮瘤
- D. 肝硬化腹水
- E. 心源性腹水

128. 为明确诊断,应首先进行的检查是

- A. PPD 试验
- B. 血白蛋白
- C. 血常规+血沉
- D. 腹腔穿刺及腹水化验
- E. 腹部CT

(129—130 题共用题干)

男,56岁,左臀部注射青霉素后红肿、剧痛伴发热10天。曾作切开排脓,但引流不畅,改用红霉素,仍发热不适。近2天伴有寒战、弛张型高热、头痛、肩部肿痛。查体:BP 110/70mmHg,神志淡漠,唇色苍白。呼吸深快,肺部呼吸音清,未闻及啰音,心率快。左臀切口渗液。血WBC $21 \times 10^9/L$ 。细菌血培养阴性。

129. 该患者的主要诊断是

- A. 代谢性碱中毒
- B. 脓毒症
- C. 肺部感染
- D. 菌血症
- E. 二重感染

130. 对该患者不宜采用的治疗措施是

- A. 补充血容量

- B. 急诊切开排脓
- C. 联合应用抗生素
- D. 应用小剂量糖皮质激素
- E. 纠正酸碱平衡失调

(131—132 题共用题干)

男,50岁。呕血3小时。晚餐进食粗糙食物后突发呕鲜血,量约600ml。乙肝病史30年,曾有黑便史。查体:T 36.5℃,P 110次/分,R 20次/分,BP 110/70mmHg。皮肤未见出血点,可见肝掌。双肺呼吸音清,未闻及干湿性啰音,心律齐。腹软,无压痛,肝肋下未触及,脾肋下2cm。

131. 该患者发生呕血最可能的原因是

- A. 胃溃疡大出血
- B. 十二指肠溃疡大出血
- C. 急性胆道大出血
- D. 食管胃底静脉曲张破裂
- E. 急性糜烂性胃炎

132. 患者拟接受手术止血,最主要的处置是

- A. 结扎切断胃底贲门周围血管
- B. 结扎切断胃十二指肠血管
- C. 结扎切断右及左胃网膜血管
- D. 结扎切断胃左及胃右动脉
- E. 缝合结扎食管旁曲张静脉

(133—134 题共用题干)

女,56岁。右乳头间断血性溢液1年,触及肿物6个月,无疼痛不适。查体:T 36.5℃,P 80次/分,BP 120/80mmHg,右腋窝可触及成团融合并固定的淋巴结。心肺腹查体未见异常。右乳头轻度内陷,按压乳晕周围可见右乳头单孔少量血性溢液,右乳乳晕深面可触及5.5cm×4cm包块,质硬、边界不清、与胸壁粘连固定。

133. 为明确诊断,最佳的检查方法是

- A. 乳管镜检查
- B. 乳头溢液涂片细胞学检查
- C. 乳腺及腋窝超声
- D. 乳腺肿物切除活检
- E. 乳腺肿物穿刺活检

134. 下一步首选的治疗是

- A. 术前化疗
- B. 右乳单纯乳房切除术
- C. 术前放疗
- D. 右乳腺癌改良根治术
- E. 右乳保留乳房乳腺癌切除术

B1 型选择题 (135—150 题)

答 题 说 明

以下提供若干组试题,每组试题共用在试题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中选择一个与问题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某一个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(135—136 题共用备选答案)

- A. 阿奇霉素
- B. 青霉素
- C. 多西环素
- D. 氧氟沙星
- E. 头孢曲松

135. 孕妇感染梅毒首选的治疗药物是
136. 孕妇生殖道感染沙眼衣原体首选的治疗药物是

(137—138 题共用备选答案)

- A. 72 小时
- B. 24 小时
- C. 48 小时
- D. 10 小时
- E. 2 小时

137. 急性胰腺炎时,血淀粉酶升高达到高峰的时间一般是在发病后
138. 急性胰腺炎时,脂肪酶开始升高的时间一般是在发病后

(139—140 题共用备选答案)

- A. 缺少凝血因子Ⅲ和Ⅹ
- B. 缺少凝血因子Ⅲ和Ⅴ
- C. 缺少凝血因子Ⅱ和Ⅹ
- D. 缺少凝血因子Ⅷ和Ⅸ
- E. 缺少凝血因子Ⅳ和Ⅶ

139. 血友病患者可能出现的凝血因子异常是
140. 肠切除术后肠痿长期禁食患者可能出现的凝血因子异常是

(141—142 题共用备选答案)

- A. 结肠脾曲
- B. 结肠肝曲
- C. 直肠和乙状结肠
- D. 回盲部
- E. 全结肠

141. 肠结核的好发部位
142. 溃疡性结肠炎的好发部位

(143—144 题共用备选答案)

- A. 喹诺酮类药物
- B. 吡喹酮
- C. 氯喹
- D. 奎宁
- E. 伯氨喹

143. 治疗血吸虫病的药物是
144. 用于杀灭肝细胞内迟发型疟原虫病的药物是

(145—146 题共用备选答案)

- A. 麻痹性肠梗阻
- B. 低位肠梗阻
- C. 痉挛性肠梗阻
- D. 绞窄性肠梗阻
- E. 高位肠梗阻

145. 持续腹痛血便,肠鸣音消失,有腹膜刺激征的原因是
146. 呕吐粪样内容物,腹部高度膨胀的原因是

(147—148 题共用备选答案)

- A. 挤压综合征
- B. 长期饥饿状态
- C. 反复呕吐
- D. 盐皮质激素过多
- E. 长期胃肠减压

147. 高钾血症的常见原因是
148. 代谢性酸中毒的常见病因是

(149—150 题共用备选答案)

- A. 腹式呼吸基本消失
- B. 腹部压痛最显著的部位
- C. 腹肌强直呈板样
- D. 右下腹柔软无压痛
- E. 腹胀、肠鸣音消失

149. 消化性溃疡急性穿孔的典型体征是
150. 判断弥漫性腹膜炎病因时最有意义的是

第四单元

A1 型选择题 (1—40 题)

答 题 说 明

每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

- 吉兰-巴雷综合征的脑脊液蛋白-细胞分离是指
 - 蛋白正常,细胞数正常
 - 蛋白增高,细胞数正常
 - 蛋白增高,细胞数降低
 - 蛋白降低,细胞数增高
 - 蛋白正常,细胞数增高
- 脑血栓形成最常见的病因是
 - 各种脑动脉炎
 - 红细胞增多症
 - 高血压病
 - 脑动脉粥样硬化
 - 血压偏低
- 下列导致胎儿生长受限的因素最常见的是
 - 妊娠期高血压
 - 羊水过多
 - 多次刮宫导致宫腔粘连
 - 妊娠期糖尿病
 - 合并卵巢小囊肿
- 下列关于胎方位的描述正确的是
 - 指胎儿头部与母体骨盆的关系
 - 指母体纵轴与胎儿纵轴的关系
 - 指胎儿先露部指示点与母体骨盆的关系
 - 指最先进入母体骨盆入口的胎儿部分
 - 指胎儿在腹腔中的各种姿势
- 新生儿窒息复苏评估的三大指标是
 - 呼吸,皮肤颜色,哭声
 - 呼吸,心率,哭声
 - 心率,呼吸,皮肤颜色
 - 心率,呼吸,肌张力
 - 心率,皮肤颜色,肌张力
- Fisher 综合征的最主要临床特征是
 - 双侧对称性眼外肌和面肌麻痹
 - 由下肢逐渐向上肢进展的对称性弛缓性瘫痪
 - 眼外肌麻痹、共济失调、腱反射消失
 - 四肢弛缓性瘫痪伴眼外肌麻痹
 - 四肢对称性弛缓性瘫痪伴双侧面瘫
- 心境障碍临床类型不包括
 - 躁狂发作
 - 恶劣心境障碍
 - 惊恐发作
 - 抑郁发作
 - 环性心境障碍
- 不符合神经症性障碍共同特点的是
 - 患者常有一定的易感素质
 - 多无明显的精神病性症状
 - 症状可有相应的器质性病变
 - 与心理社会因素有关
 - 多数患者对疾病有自知力
- 妊娠剧吐不能进食者,为预防 Wernicke 综合征,应补充的维生素是
 - 维生素 A
 - 维生素 C
 - 维生素 B₁
 - 维生素 E
 - 维生素 B₆
- 按计划免疫接种程序,半岁以内需接种的疫苗不包括
 - 百白破三联混合疫苗
 - 乙肝疫苗
 - 麻疹疫苗
 - 卡介苗
 - 脊髓灰质炎减毒活疫苗
- 外阴阴道假丝酵母菌病最主要传染途径是
 - 性交传染
 - 血行传染
 - 间接传染
 - 直接传染
 - 内源性传染

12. 既往月经规律,妊娠 42⁺5 周,下列情况最不可能出现的是
- A. 羊水增多
 - B. 羊水粪染
 - C. 胎儿生长受限
 - D. 胎儿过熟综合征
 - E. 胎盘功能正常
13. 苯丙酮尿症患儿主要的神经系统异常表现是
- A. 肌张力增高
 - B. 行为异常
 - C. 智能发育落后
 - D. 惊厥
 - E. 腱反射亢进
14. 健康育龄妇女出现恶心、食欲减退等消化道症状,问诊时不应忽视的是
- A. 胃炎病史
 - B. 肝炎病史
 - C. 传染病史
 - D. 不洁饮食史
 - E. 月经史
15. 小儿生长发育的规律不包括
- A. 连续性、非匀速性、阶段性
 - B. 自下而上
 - C. 个体差异
 - D. 两个高峰期
 - E. 各器官系统发育不平衡
16. 出生后即有且终生存在的神经反射是
- A. 拥抱反射
 - B. 膝腱反射
 - C. 腹壁反射
 - D. 握持反射
 - E. 觅食反射
17. 关于子宫内膜癌的描述,正确的是
- A. 早期患者首选治疗方法是放射治疗
 - B. 非激素依赖型比激素依赖型预后差
 - C. 透明细胞癌是最常见的病理类型
 - D. 血行转移是最常见的转移途径
 - E. 肿瘤侵及直肠黏膜时,分期为 IVB
18. 早产的常见病因是
- A. 遗传因素
 - B. 下生殖道感染
 - C. 头盆不称
 - D. 孕激素水平升高
 - E. 胎儿畸形
19. 对雌激素生理作用的叙述,正确的是
- A. 抑制输卵管平滑肌节律性收缩的振幅
 - B. 促进水钠潴留,维持和促进骨基质代谢
 - C. 抑制子宫收缩
 - D. 使宫颈口闭合,黏液分泌减少、变黏稠
 - E. 加快阴道上皮细胞脱落
20. 诊断脑出血最迅速、最可靠的检查是
- A. 脑血管造影
 - B. 脑电图
 - C. 脑积液检测
 - D. 头颅 MRI
 - E. 头颅 CT
21. 判断新生儿缺氧缺血性脑病严重程度的主要依据是
- A. 颅脑超声
 - B. 血清 CPK - BB
 - C. 脑电图
 - D. 头颅 CT
 - E. 临床表现
22. 下列提示颅后窝骨折的临床表现是
- A. 脑脊液鼻漏
 - B. Battle 征
 - C. 视神经损伤
 - D. 眼镜征
 - E. 嗅神经损伤
23. 下列提示胎盘功能正常的情况是
- A. 血清胎盘生乳素突然降低 50%
 - B. 胎动 < 10 次/12 小时
 - C. OCT 试验阳性
 - D. 尿雌激素/肌酐比值 > 15
 - E. NST 试验无反应型
24. 小儿生理性贫血发生的时期是在出生后
- A. 4~5 个月
 - B. 7~8 个月
 - C. 1 个月内
 - D. 6~7 个月
 - E. 2~3 个月
25. 重症肌无力患者应避免应用的药物是
- A. 万古霉素
 - B. 盐酸小檗碱
 - C. 头孢噻肟
 - D. 青霉素
 - E. 免疫球蛋白 G
26. 下列关于 PPD 试验的说法最准确的是
- A. 凡是 PPD 试验阴性可除外结核病
 - B. PPD 试验阳性可肯定有结核病



- C. 粟粒型肺结核 PPD 试验有时可呈阳性
 D. 初次感染结核菌后 2 周, PPD 试验呈阳性
 E. 卡介苗接种成功, PPD 试验呈强阳性
27. 有先兆偏头痛最常见的先兆是
 A. 运动先兆
 B. 听觉先兆
 C. 视觉先兆
 D. 言语先兆
 E. 感觉先兆
28. 导致儿童风湿热的最常见病原体是
 A. 肺炎克雷伯杆菌
 B. 肺炎链球菌
 C. A 组乙型溶血性链球菌
 D. 流感嗜血杆菌
 E. 大肠埃希菌
29. 早产儿出生后即出现进行性呼吸困难, 最可能发生的疾病是
 A. 吸入性肺炎
 B. 新生儿呼吸窘迫综合征
 C. 胎粪吸入综合征
 D. 湿肺
 E. 先天性心脏病
30. 较少出现精神病性症状的疾病状态是
 A. 强迫状态
 B. 谵妄状态
 C. 妄想状态
 D. 幻觉状态
 E. 兴奋状态
31. 导致输卵管妊娠的主要原因是
 A. 剖宫产史
 B. 输卵管发育不良或功能异常
 C. 输卵管妊娠史
 D. 子宫肌瘤
 E. 输卵管炎症
32. 属于正细胞正色性贫血的疾病是
 A. 缺铁性贫血
 B. 急性溶血性贫血
 C. 地中海贫血
 D. 慢性失血性贫血
 E. 营养性巨幼细胞性贫血
33. 下列关于小儿免疫系统的说法, 错误的是
 A. 新生儿 B 淋巴细胞发育已完善, 但不成熟
 B. 新生儿时期各种 T 细胞亚群功能均显不足
 C. IgM 不能通过胎盘
 D. IgG 不能通过胎盘
 E. 脐血 IgM 水平过高, 提示可能有宫内感染
34. 超低出生体重新生儿的出生体重低于
 A. 2 000g
 B. 2 500g
 C. 800g
 D. 1 500g
 E. 1 000g
35. 维生素 D 缺乏性佝偻病早期诊断的可靠指标是
 A. 血磷
 B. 血钙
 C. 血钙磷乘积
 D. 血碱性磷酸酶
 E. 血 25 - (OH)D₃
36. 常伴有 AFP 升高的卵巢肿瘤是
 A. 颗粒细胞瘤
 B. 成熟性畸胎瘤
 C. 上皮性肿瘤
 D. 卵黄囊瘤
 E. 无性细胞瘤
37. 水痘最常见的并发症为
 A. 脑炎
 B. 败血症
 C. 皮肤继发细菌感染
 D. 肺炎
 E. 心肌炎
38. 蛋白质 - 能量营养不良患儿最先出现的表现是
 A. 体重不增
 B. 水肿
 C. 体重减轻
 D. 身高低于正常
 E. 皮下脂肪消失
39. 含铜 IUD 的主要作用机制不包括
 A. 影响子宫内膜细胞糖原代谢和雌激素摄入
 B. 使宫颈黏液稠厚, 不利于精子穿透
 C. 铜离子使精子头尾分离, 不得获能
 D. 使受精卵运行速度与子宫内膜发育不同步
 E. 压迫局部子宫内膜产生炎症反应
40. 制备洗涤红细胞的主要目的是
 A. 去除血小板
 B. 去除红细胞碎片
 C. 去除细菌
 D. 去除白细胞
 E. 去除血浆蛋白



A2 型选择题 (41—99 题)

答 题 说 明

每一道考题下面是以一个小案例出现的,其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

41. 男,28 岁。头部摔伤,着力点位于右侧颞枕,就医时出现“熊猫眼”征,鼻孔流出血性液体。最可能的诊断是
- A. 颅前窝底骨折
B. 脑震荡
C. 双侧眼睑挫伤
D. 双侧视神经损伤
E. 双眼结膜出血
42. 女,28 岁,初孕妇。妊娠 40 周,规律宫缩 8 小时。查体:P 90 次/分,BP 140/80mmHg,宫口 7cm,先露 S = +1,胎心 140 次/分。10 分钟后胎膜破裂,流出清亮液体。正确的处理方法是
- A. 立即静脉滴注硫酸镁
B. 立即静脉滴注缩宫素
C. 立即行剖宫产术
D. 立即静脉滴注地塞米松
E. 立即听胎心
43. 女,22 岁。妊娠 34 周,剧烈头痛并抽搐 1 次。查体:BP 180/120mmHg,全身水肿,无宫缩,LOA,胎心 150 次/分。尿蛋白(++)。首选的处理方法是
- A. 静脉注射呋塞米
B. 静脉滴注小剂量缩宫素
C. 静脉滴注白蛋白
D. 静脉滴注硫酸镁
E. 静脉注射毛花苷丙
44. 男,71 岁。进行性右手震颤、动作缓慢 3 年,翻身困难 1 年。查体:面具脸,右手静止性震颤,四肢肌张力增高,行走缓慢。有前列腺增生、轻度肾功能不全和房颤病史。对该患者最恰当的治疗药物是
- A. 安坦
B. 复方左旋多巴
C. 丙炔苯丙胺(司来吉兰)
D. 金刚烷胺
E. 溴隐亭
45. 女,35 岁。妊娠 35⁺2 周,2 周前血压升高至 160/100mmHg,未治疗。现突然持续腹痛、逐渐加重,感头晕、恶心、阴道有少量流血。查体:T 36.8℃,P 120 次/分,BP 100/60mmHg,呼吸急促,面色苍白,腹部隆起,板状腹,胎方位不清,未闻及胎心。最可能的诊断是
- A. 胎盘早剥
B. 早产临产
C. 妊娠合并急性胰腺炎
D. 临产伴急性阑尾炎
E. 先兆子宫破裂
46. 女,56 岁。下腹不适、腹胀半年,发现腹部包块 1 个月。3 年前行胃癌根治术,病理为胃窦部腺癌。妇科检查:外阴、阴道正常,宫颈光滑,萎缩,子宫正常大小,双侧附件区各触及一个约 8cm × 6cm × 5cm 大小的椭圆形包块,移动性浊音(-)。最可能的诊断是
- A. 库肯勃瘤
B. 卵巢上皮性癌
C. 卵巢纤维瘤
D. 卵巢无性细胞瘤
E. 卵巢畸胎瘤
47. 女孩,8 岁。发热、关节肿痛 2 周。查体:皮肤出现环形红斑,心率 120 次/分,奔马律。实验室检查提示血沉增快。经治疗,上述症状、体征消失。预防复发的方法是
- A. 忌海鲜
B. 减少体育运动
C. 长效青霉素肌注
D. 避免关节损伤
E. 激素吸入维持
48. 男婴 5 个月,咳嗽 1 天,发热 3 小时。就诊过程中突然双目凝视,口吐白沫,四肢强直,呼之不应,持续 1~2 分钟缓解。查体:T 39.3℃,咽红,心肺腹及神经系统无异常,最可能诊断是
- A. 低钙惊厥
B. 中毒性脑病
C. 化脓性脑膜炎
D. 癫痫
E. 热性惊厥
49. 男孩,1 岁。因身材矮小、智能发育迟缓就诊。查体:身高 63cm,表情呆滞,四肢肌张力低下,眼距宽,鼻梁低平,眼外眦上斜,四肢短,手指短,小指内弯。对明确诊断最有意义的检查是

- A. 血 T_3 、 T_4 、TSH 测定
 B. 染色体核型分析
 C. 尿三氯化铁试验
 D. 血钙、磷、碱性磷酸酶检测
 E. 血氨基酸分析
50. 女, 28 岁, 初产妇。双胎妊娠, 妊娠 39 周临产。查体: P 90 次/分, BP 140/80mmHg。规律宫缩 10 小时后宫口开全, 第一胎头位娩出, 新生儿体重 2600g。第二胎为单臀先露, 已衔接, 胎心正常。本例恰当的处理措施是
 A. 行外转胎位术
 B. 产钳牵引术
 C. 行内转胎位术
 D. 等待臀助娩
 E. 立即剖宫产术
51. 女, 31 岁, 初孕妇。妊娠 34 周。查体: T 36.5℃, P 90 次/分, R 18 次/分, BP 120/80mmHg。叩诊心浊音界稍向左扩大, 心尖部闻及 2/6 级收缩期吹风样杂音。踝部轻度水肿。最可能的诊断是
 A. 围生期心肌病
 B. 妊娠期高血压疾病性心脏病
 C. 原发性心肌病合并妊娠
 D. 风湿性心脏病合并妊娠
 E. 正常妊娠改变
52. 男, 31 岁。2 天前突发胸壁背部痛, 继而下肢无力、麻木、排尿困难, 无视物成双、饮水呛咳、吞咽困难。起病前 1 周前患感冒。查体: 胸 4 平面以下深浅感觉消失, 双下肢肌力 1 级, 双侧膝腱、跟腱反射消失。MRI 示胸 4~9 脊髓略增粗, T_2 加权像见条索状高信号。最可能的诊断是
 A. 吉兰巴雷综合征
 B. 髓内肿瘤
 C. 髓外肿瘤
 D. 急性脊髓炎
 E. 颈椎病
53. 女, 56 岁。子宫内腺癌术后 10 天。病理示低分化子宫内膜腺癌, 侵及深肌层, 淋巴结无转移, 手术病理分期 I b。患者合并高血压, 药物控制后血压 120~130/70~80mmHg。该患者首选的处理是
 A. 中药治疗
 B. 生物治疗
 C. 放射治疗
 D. 随访观察
 E. 内分泌治疗
54. 女, 22 岁。一年来反复洗手、洗衣物, 总担心洗不干净或者碰到脏东西。明知道担心过分却不能自
 己。为此不能正常工作和做家务, 苦恼万分。该患者最可能的诊断是
 A. 强迫障碍
 B. 疑病障碍
 C. 广泛性焦虑障碍
 D. 恐惧性焦虑障碍
 E. 妄想性障碍
55. 女, 31 岁, 停经 21 周。剧烈腹痛、发热 1 天, 伴恶心、呕吐, 无阴道流血。查体: 宫底平脐, 子宫前壁压痛, 胎心 156 次/分, 血 WBC $13 \times 10^9/L$, N 0.78。彩色超声提示单胎妊娠合并子宫肌壁间肌瘤, 肌瘤直径 7cm。最可能是子宫肌瘤发生
 A. 感染
 B. 玻璃样变
 C. 红色样变
 D. 肉瘤样变
 E. 囊性变
56. 女, 31 岁, 婚后 3 年不孕。患者平素月经规律, 妇科检查未发现异常, 内分泌检查正常, 造影示双侧输卵管堵塞。适宜的辅助生育技术是
 A. 人工授精
 B. 植入前遗传学诊断技术
 C. 配子输卵管内移植
 D. 胞浆内单精子注射
 E. 体外受精与胚胎移植
57. 女, 24 岁, 经产妇。阴道分娩后 72 小时, 自觉乳房胀痛, 发热。T 37.5℃。下腹部阵发性疼痛伴阴道少许流血。正确的处理是
 A. 应用抗生素
 B. 口服镇痛剂
 C. 局部理疗
 D. 排空乳房
 E. 静脉滴注缩宫素
58. 男, 28 岁。近 1 年来认为自己的五脏六腑都已经腐烂、变空了。患者的症状是
 A. 虚无妄想
 B. 虚构
 C. 感知综合障碍
 D. 幻觉
 E. 错觉
59. 女婴, 5 个月。今晨突然面肌、口角及眼角抽动约半分钟, 抽后精神好, 不发热, 不吐。冬季出生, 混合喂养, 未加辅食。查体: 体重 7kg, 会笑, 前囟平, 有枕秃, 双侧巴氏征阳性。最可能的诊断及进一步检查是
 A. 败血症, 做血培养



- B. 癫痫,做脑电图
 C. 中枢神经系统感染,做腰穿
 D. 维生素 D 缺乏性手足搐搦症,查血钙
 E. 低血糖,查血糖
60. 男孩,3 岁。剧烈活动后伴气促,青紫不明显,自幼反复呼吸道感染。查体:BP 90/40mmHg,胸骨左缘第 2 肋间可闻及粗糙响亮的连续机器样杂音,第 4 肋间可闻及 4/6 级粗糙的全收缩期杂音伴震颤,心尖区可闻及舒张期隆隆样杂音, P_2 亢进,闻及股动脉枪击音。胸部 X 线片示左心房及左、右心室增大,肺动脉段膨隆。最可能的诊断是
- A. 房间隔缺损
 B. 室间隔缺损 + 动脉导管未闭
 C. 室间隔缺损
 D. 动脉导管未闭
 E. 法洛三联症
61. 男,56 岁。近半年工作压力大,经常出现差错,刚做过的事就记不起来,性格变得古怪,喜怒无常,有时情绪低落。一次喝了 50ml 啤酒后,找不到家而露宿街头。最可能的诊断是
- A. 酒精所致遗忘综合征
 B. 躁狂发作
 C. 阿尔茨海默病
 D. 抑郁发作
 E. 分离(转换)性障碍
62. 女,18 岁,未婚。月经规律,无停经史。突发下腹部疼痛伴恶心、呕吐 8 小时。查体:P 78 次/分,BP 100/70mmHg,查体示:子宫前位,正常大小,右侧附件区触及一个 $6\text{cm} \times 5\text{cm} \times 5\text{cm}$ 囊实性包块,边界清楚,触痛明显。最可能的诊断是
- A. 卵巢黄体破裂
 B. 输卵管妊娠破裂
 C. 急性阑尾炎
 D. 卵巢肿瘤蒂扭转
 E. 浆膜下子宫肌瘤
63. 女,45 岁。车祸中头部受伤后出现短暂昏迷,1.5 小时后剧烈头痛,频繁呕吐。急诊查体:神志清楚,双侧瞳孔大小多变,对光反射迟钝,肢体活动正常。行头颅 CT 检查过程中,发生呼吸骤停。其呼吸骤停最可能的原因是
- A. 脑干损伤
 B. 脑挫裂伤
 C. 脑震荡
 D. 急性颅后窝血肿并发枕骨大孔疝
 E. 急性颅内血肿并发小脑幕切迹疝
64. 女,31 岁。月经不规律 3 年,闭经 7 个月,溢乳 2 个月。对诊断最有价值的测定项目是
- A. 孕激素
 B. 雄激素
 C. 催乳素
 D. 促甲状腺激素
 E. 雌激素
65. 女,31 岁, G_2P_0 。停经 85 天,阴道不规则流血 10 余天。恶心、呕吐较重,伴下腹隐痛,无咳嗽、咯血。妇科检查:阴道黏膜未见异常,宫颈光滑,宫口可见血液流出,宫底平脐,质软,未触及胎体,未闻及胎心,血 hCG 100 000U/L。应首先考虑的诊断是
- A. 侵蚀性葡萄胎
 B. 葡萄胎
 C. 绒癌
 D. 死胎
 E. 先兆流产
66. 男,45 岁。行脊柱肿瘤切除术,术中给予输血,输注悬浮红细胞 15 分钟后,血压下降到 70/40mmHg,导尿管中的尿液呈酱油色。患者最可能发生的输血不良反应是
- A. 细菌污染反应
 B. 输血相关急性肺损伤
 C. 急性溶血性输血反应
 D. 输血相关循环超负荷
 E. 严重过敏反应
67. 初产妇,28 岁。在家中自然分娩后 15 天,阴道多量流血 1 天。无寒战、高热。查体:T 37°C ,P 80 次/分,R 18 次/分,BP 90/60mmHg,子宫如妊娠 3 个月大,质软,压痛不明显,宫口松,能容 2 指。其阴道流血最可能的原因是
- A. 胎盘、胎膜残留
 B. 子宫颈裂伤
 C. 子宫内膜炎
 D. 子宫脱垂
 E. 子宫肌炎
68. 女婴,1 个月。出生后间断呕吐,呕吐物为奶液,体重增长不满意。查体:可见胃蠕动波,右上腹触及包块。最可能的诊断是
- A. 幽门痉挛
 B. 胃扭转
 C. 先天性肥厚性幽门狭窄
 D. 先天性巨结肠
 E. 胃食管反流
69. 女,40 岁。当听到家中房子因洪水倒塌的消息后,突然顿足哭喊,表情恐惧、紧张,拿砖头打砸旁边

- 的房子,反复喊叫“我没有房子啦,我没有房子啦……”1天后开始逐渐恢复平静。该患者最可能的诊断是
- 分离(转换)性障碍
 - 创伤后应激障碍
 - 急性应激障碍
 - 急性短暂性精神病性障碍
 - 适应障碍
70. 女,31岁,初产妇。妊娠40⁺2周,临产后11小时分娩一女活婴,胎儿娩出35分钟,胎盘未娩出,无阴道流血。查体:P 80次/分,BP 130/80mmHg,子宫轮廓清。此时不恰当的处理方法是
- 下压宫底并用力牵拉脐带
 - 给予缩宫素
 - 建立静脉通道
 - 按摩子宫
 - 探查宫腔和胎盘
71. 女,35岁,C₆P₁。月经量增多3年,经期及周期正常。妇科检查:子宫前位,饱满,活动差,无压痛。推荐该患者最佳的避孕方法是
- 惰性宫内节育器
 - 避孕套
 - 体外排精
 - 紧急避孕药
 - 短效口服避孕药
72. 女,28岁,妊娠38周。B超示胎儿脐带绕2周,拟行剖宫产术。4年前曾因外伤住院,接受输血后出现严重过敏反应。孕妇一般状况良好,心、肝、肾功能正常,血Hb 100g/L。术前拟申请备血400ml。应选择的血液成分是
- 洗涤红细胞
 - 悬浮红细胞
 - 浓缩血小板
 - 新鲜冰冻血浆
 - 冷沉淀
73. 女,22岁,半年前诊断为精神分裂症,平时服用利培酮治疗,病情稳定。半个月前因男朋友分手,情绪低落,话少。近3天加重,整日躺在床上,不语不动,拒绝进食,常双眼含泪。家人反复询问下有时能用点头、摇头表示。患者目前首要的处理方法是
- 认知治疗
 - 加用抗抑郁药
 - 抗精神病药加量
 - 电抽搐治疗
 - 暗示治疗
74. 男,12岁,患再生障碍性贫血半年,因重度贫血,需要反复输血。应输注的血液成分是
- 洗涤红细胞
 - 去除白细胞的红细胞
 - 悬浮红细胞
 - 浓缩红细胞
 - 冰冻红细胞
75. 女,31岁,C₃P₁,剖宫产史,因妊娠50天行人工流产负压吸引术,术中患者突感胸闷、大汗淋漓、下腹坠痛伴恶心。查体:P 49次/分,BP 90/60mmHg,面色苍白,阴道少量流血。应首先考虑的诊断是
- 人工流产综合反应
 - 羊水栓塞
 - 子宫穿孔
 - 失血性休克
 - 急性腹膜炎
76. 男婴,3天。2天前出现皮肤黄染,逐渐加重,1天来嗜睡拒奶。查体:反应差,皮肤重度黄染,心肺未见异常,肝肋下3cm,肌张力低下。血RBC $3.9 \times 10^{12}/L$,Hb 120g/L,网织红细胞0.09,血清总胆红素359 μ mol/L。最可能的诊断是
- 新生儿缺氧缺血性脑病
 - 新生儿肝炎
 - 新生儿溶血病
 - 新生儿败血症
 - 新生儿化脓性脑膜炎
77. 男,31岁。夏天突然四肢抽搐,强直,口吐白沫,小便失禁。整个发作约3分钟,事后无回忆。发作间歇期查体无异常。最可能的诊断是
- 晕厥
 - 癫痫
 - 脑血管意外
 - 癔症
 - 中暑
78. 男,31岁,精神分裂症急性发作入院,因兴奋躁动,敌对攻击严重,给予氟哌啶醇5mg一天2次肌肉注射。次日患者出现双眼上翻,斜颈,面肌痉挛,角弓反张。此时首选的处理方法是
- 立即停药
 - 口服普萘洛尔
 - 口服苯二氮䓬类药物
 - 电抽搐治疗
 - 肌肉注射东莨菪碱
79. 男孩,6岁。头痛、呕吐,站立不稳、行走左右摇晃2个月。查体:神志清楚,精神差,双侧视盘水肿。最可能的诊断是

- A. 顶叶恶性淋巴瘤
 B. 枕叶星形细胞瘤
 C. 小脑髓母细胞瘤
 D. 矢状窦旁脑膜瘤
 E. 颞叶胶质母细胞瘤
80. 女, 40 岁。瘢痕子宫, 妊娠 39 周, 规律宫缩 8 小时。宫口 6cm, 先露 S = +1, 突然腹痛加剧。查体: T 37.5°C, P 100 次/分, BP 90/60mmHg, 宫口 4cm, 先露 S = -2, 胎心 60 次/分, 2 分钟后胎心消失。最可能的诊断是
- A. 子宫破裂
 B. 羊水栓塞
 C. 胎盘早剥
 D. 腹腔感染
 E. 先兆子宫破裂
81. 女, 35 岁。丈夫嗜赌, 瞒着患者欠下高利贷 200 多万, 被人逼债, 不辞而别。债主上门讨债, 患者得知原委后, 表现与平素判若两人, 口中念念有词, 似神鬼附体, 称自己是大仙, 要为债主摸骨看病, 一会儿又流利地唱着平时不常唱的戏曲唱段。事后对经过不能完全回忆, 未找到器质性疾病证据。发病前性格外向热情。该患者最可能的诊断是
- A. 急性短暂性精神病
 B. 躁狂发作
 C. 惊恐障碍
 D. 创伤后应激障碍
 E. 转换-分离障碍
82. 女, 28 岁, 初产妇。妊娠 39 周, 规律宫缩 10 小时, 查宫口扩张 6cm, LOA, 先露 S = +1, 胎心 140 次/分, 胎儿监护 NST 有反应型。需要进一步的处理是
- A. 催产素加强宫缩
 B. 给予宫颈封闭
 C. 肌注哌替啶
 D. 严密观察产程
 E. 超声评估胎儿大小
83. 男孩, 7 岁。水肿 4 天, 伴血尿、尿少 2 天。查体: P 112 次/分, R 33 次/分, BP 120/85mmHg, 颜面、双下肢明显水肿, 烦躁不安、气促, 双肺底可闻及湿啰音, 肝肋下 1.5cm。尿常规: 蛋白 (+)。尿沉渣镜检: RBC 25/HP。目前应首选的药物是
- A. 毛花苷丙
 B. 硝普钠
 C. 青霉素
 D. 呋塞米
 E. 地西泮
84. 男, 31 岁。突发剧烈头痛 1 小时, 以下枕部为著, 伴喷射状呕吐 3 次。查体: 痛苦面容, 全身大汗, 脑膜刺激征阳性。最可能的诊断是
- A. 脑栓塞
 B. 蛛网膜下腔出血
 C. 脑梗死
 D. 脑脓肿
 E. 急性病毒性脑炎
85. 女孩, 2 岁。身材矮小, 语言、运动发育落后, 平素纳差, 便秘。查体: T 36°C, P 80 次/分, 神志清楚, 反应淡漠, 眼睑水肿, 眼距宽, 鼻梁低平, 舌大而厚, 皮肤粗糙, 腹膨隆, 未触及包块, 四肢短小。心脏超声示心包积液。对诊断最有帮助的检查是
- A. 立位腹部 X 线平片
 B. 染色体核型分析
 C. 血苯丙氨酸测定
 D. 甲状腺功能检查
 E. 骨龄片
86. 男孩, 6 岁。咳嗽伴喘息 1 天, 无发热。既往有反复喘息发作 4~5 次。其外祖父患有支气管哮喘。查体: 呼吸急促, 可见轻度三凹征, 呼气相延长, 双肺满布哮鸣音。目前应首选的治疗是
- A. 吸入沙丁胺醇
 B. 口服白三烯调节剂
 C. 口服西替利嗪
 D. 静脉注射地塞米松
 E. 静脉滴注青霉素
87. 男, 65 岁。突发头痛、头晕和行走困难 10 小时。既往有高血压和糖尿病病史 10 年。查体: 神志清, 颈有抵抗, 对答尚清晰, 双眼可见眼震, 瞳孔等大且对光反射存在, 无明确面舌瘫或肢体瘫痪, 听力正常, 腱反射对称, 无深浅感觉障碍, 未引出病理征, 行走步基宽大、不稳, 直线行走不能。该患者最可能的诊断是
- A. 小脑出血破入脑室
 B. 原发性脑室出血
 C. 延髓出血破入脑室
 D. 脑桥出血破入脑室
 E. 丘脑出血破入脑室
88. 女, 28 岁。初孕妇, 身高 147cm。妊娠 41 周, 规律宫缩 12 小时后孕妇紧张、乏力, BP 140/90mmHg, 胎心率 140 次/分, 枕左前位, 先露 S = -1, 宫口开大 9cm, 羊水清亮, 坐骨棘间径 8cm。该患者正确的处理是
- A. 徒手旋转胎头
 B. 人工破膜加速胎头下降

- C. 产钳助娩
D. 胎头吸引
E. 剖宫产
89. 男孩,5岁。持续高热1周。查体:T 39°C, P 128次/分, R 36次/分。热病容,双眼结合膜充血,口唇干裂,可见草莓舌,皮肤呈弥漫性红斑,颈部浅表淋巴结肿大,心音有力,手足指趾硬性水肿。最可能的诊断是
A. 川崎病
B. 手足口病
C. 败血症
D. 风湿热
E. 猩红热
90. 一正常婴儿,体重7.5kg,身长68cm。前囟1.0cm,头围44cm。出牙4个。能独坐并能以拇、示指拿起小球。该患儿最可能的月龄是
A. 8个月
B. 24个月
C. 18个月
D. 12个月
E. 5个月
91. 男,20岁,大二学生。两周来突然兴奋话多,言语夸大,说自己是中国的乔布斯,能开很多家公司,每个都可以进入世界500强。连夜搞发明创造,吃饭都很吞虎咽,说要分秒必争。家人朋友劝阻他就发脾气,说他们弱智,不配与自己说话。针对该患者宜首选的药物是
A. 曲唑酮
B. 碳酸锂
C. 氯氮平
D. 米氮平
E. 布普品
92. 女婴,10个月。动作发育倒退2个月。人工喂养,未正规添加辅食。查体:面色蜡黄,哭时无泪,舌颤。最可能的诊断是
A. 营养性维生素D缺乏性佝偻病
B. 营养性巨幼细胞性贫血
C. 缺铁性贫血
D. 蛋白质-能量营养不良
E. 脑性瘫痪
93. 女婴,8个月。母乳喂养,未添加辅食。查体:面色苍白,肝脾肿大。外周血象:Hb 75g/L, RBC $3.5 \times 10^{12}/L$, MCV 70fl, MCH 26pg, MCHC 30%。其贫血的细胞形态是
A. 单纯小细胞性
B. 大细胞性
C. 小细胞低色素性
D. 正细胞正色素性
E. 正细胞低色素性
94. 女孩,2岁。发热3天。最高体温39°C,伴流涎、厌食、呕吐。查体:急性热病容,咽部充血,在咽腭弓的黏膜上可见多个2~4mm大小疱疹,有的破溃成小溃疡。该患儿最可能的诊断是
A. 咽结合膜炎
B. 疱疹性口腔炎
C. 化脓性扁桃体炎
D. 流行性感冒
E. 疱疹性咽峡炎
95. 男,31岁。头痛进行性加重1个月。入院前3天出现喷射状呕吐3次,抽搐1次。查体:神志清楚,双侧视神经盘水肿,颈软,最可能的诊断是
A. 颅内压增高
B. 蛛网膜下腔出血
C. 脑软化
D. 陈旧性脑梗死
E. 脑血管畸形
96. 女,56岁, G₄P₂。绝经5年,阴道脱出肿物4年,脱出肿物增大3个月,不能自行回纳,伴排尿困难。妇科检查见宫颈及部分宫体已脱出阴道口外。妇科超声及泌尿系统超声均未提示异常。适宜的处理为
A. 阴道全封闭术
B. 经腹圆韧带缩短术
C. 阴道半封闭术
D. 盆底修复及子宫切除术
E. Manchester手术
97. 男孩,3岁半。发热2周,头痛、呕吐1周,惊厥1次。查体:颈抵抗(+),双膝腱反射亢进,巴氏征(+). 脑脊液检查:WBC $265 \times 10^6/L$,单核0.76,多核0.24,蛋白1.5g/L,糖1.2mmol/L,氯化物92mmol/L。目前最适宜的治疗是
A. 头孢曲松+万古霉素
B. 四联抗结核药物
C. 大剂量丙种球蛋白
D. 阿昔洛韦
E. 泼尼松龙
98. 女婴,10天。拒乳4天。查体:周身皮肤明显黄染,脐部少许脓性分泌物,前囟平软。实验室检查:血红蛋白 $25 \times 10^9/L$,中性粒细胞0.80,淋巴细胞0.20,该患儿最重要的诊断是
A. 新生儿脐炎
B. 新生儿肝炎



- C. 新生儿化脓性脑膜炎
 D. 新生儿败血症
 E. 新生儿颅内出血
99. 男孩, 2 岁。发热、咳嗽 3 天, 今日突然出现气促、呼吸困难, 发绀, 面色苍白, 心率增快达 180 次/分, 两肺闻及粗湿啰音和哮鸣音, 肝肋下 3cm。最

可能合并的是

- A. 急性心力衰竭
 B. 艾森曼格综合征
 C. 脓胸
 D. 气胸
 E. 心肌炎

A3/A4 型选择题 (100—136 题)

答 题 说 明

以下提供若干个案例, 每个案例下设若干道试题。请根据案例提供的信息, 在每一道试题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(100—103 题共用题干)

女孩, 3 岁。出生后发现口唇青紫, 活动后加剧。平时喜蹲踞, 哭吵时有突发呼吸急促、青紫加重, 严重时伴晕厥, 曾半年内晕厥 2 次, 均于清晨或哭吵后发作, 经 2~3 分钟自行恢复。今晨又出现晕厥, 持续 5 分钟, 即来急诊。查体: T 37.0℃, P 100 次/分, R 22 次/分, BP 82/55mmHg。神志不清, 双肺听诊未见异常, 胸骨左缘第 2~4 肋间闻及 3/6 级收缩期杂音, 无震颤, 肺动脉第二心音减弱。口唇青紫, 指、趾甲青紫, 杵状指、趾, 颈软, 神经系统查体无异常。

100. 最可能的诊断为

- A. 单纯肺动脉瓣狭窄
 B. 房间隔缺损伴轻度肺动脉瓣狭窄
 C. 完全性大动脉转位
 D. 室间隔缺损伴重度肺动脉高压
 E. 法洛四联症

101. 该疾病最典型的心电图改变是

- A. 右心房扩大
 B. 预激综合征
 C. 不完全性右束支传导阻滞
 D. 右心室肥厚
 E. 左心室肥厚

102. 患儿晕厥的原因是

- A. 肺动脉漏斗部痉挛
 B. 血流缓慢
 C. 脑血栓形成
 D. 长期缺氧
 E. 血液黏稠

103. 下列抢救措施中不合适的是

- A. 静脉滴注碳酸氢钠
 B. 静脉注射普萘洛尔
 C. 皮下注射吗啡
 D. 取胸膝位

E. 口服普萘洛尔

(104—106 题共用题干)

女孩, 1 岁。腹泻 4 天。每日大便 10 余次, 为蛋花汤水样便, 伴呕吐、尿少。查体: T 38.5℃, 前囟、眼窝凹陷, 皮肤弹性差, 四肢稍凉。实验室检查: 血 WBC $6.0 \times 10^9/L$, 血 Na^+ 127mmol/L, K^+ 3.7mmol/L, BE^- 15mmol/L。

104. 最可能的诊断是腹泻病伴

- A. 中度等渗性脱水, 代谢性碱中毒
 B. 重度等渗性脱水, 代谢性碱中毒
 C. 轻度低渗性脱水, 代谢性碱中毒
 D. 轻度等渗性脱水, 代谢性酸中毒
 E. 中度低渗性脱水, 代谢性酸中毒

105. 最可能的病原体是

- A. 侵袭性大肠埃希菌
 B. 白色念珠菌
 C. 产毒性大肠埃希菌
 D. 金黄色葡萄球菌
 E. 轮状病毒

106. 补液过程中, 患儿突然惊厥, 首选的辅助检查是

- A. 头颅 MRI
 B. 血电解质
 C. 头颅 CT
 D. 脑脊液
 E. 血糖

(107—108 题共用题干)

女, 28 岁。婚后 4 年未孕, 月经周期 4~5 天/2~3 个月, 量偏少, 身高 156cm, 体重 75kg, 面部可见痤疮, 阴毛分布呈男性型。妇科检查: 子宫未见异常, 双侧卵巢稍大。基础体温单相。

107. 该患者最可能的诊断是

- A. 生殖器结核
 B. 卵巢早衰

- C. 子宫内膜异位症
- D. 多囊卵巢综合征
- E. 黄体功能不足

108. 该患者用氯米芬治疗,最需要注意防止的并发症是

- A. 卵巢早衰
- B. 卵巢过度刺激综合征
- C. 肝肾功能损害
- D. 盆腔炎症性疾病
- E. 黄素化卵泡不破裂综合征

(109—111 题共用题干)

男孩,3岁。水肿1周。尿中有泡沫,尿量减少。查体:T 36.7℃,P 120次/分,R 25次/分,BP 90/60mmHg。眼睑水肿,双下肢凹陷性水肿,双肺呼吸音粗,未闻及啰音,心前区未闻及杂音,腹膨隆,移动性浊音(+)。尿常规:蛋白(+++)。尿沉渣镜检:RBC 0~3/HP,WBC 0~3/HP。血清白蛋白20g/L,胆固醇8.7mmol/L。

109. 最可能的诊断是

- A. 急性肾性肾炎
- B. 单纯型肾病综合征
- C. 急性肾小球肾炎
- D. 泌尿道感染
- E. 肾炎型肾病综合征

110. 以下治疗方式不合适的是

- A. 给予氢氯噻嗪利尿
- B. 给予泼尼松治疗
- C. 给予青霉素抗感染
- D. 少盐饮食
- E. 降脂治疗

111. 患儿在治疗中出现发热,最常见的原因是

- A. 腹膜炎
- B. 皮肤丹毒
- C. 呼吸道感染
- D. 尿路感染
- E. 胃肠炎

(112—114 题共用题干)

男,56岁。2年来表现为烦渴多食、多饮、多尿,体重下降,疲倦无力,注意力不集中,失眠,情绪低落,主动性差,反应迟钝。1周前出现兴奋不安,言语紊乱而住院。

112. 下列最有诊断价值的检查是

- A. 尿常规
- B. 血常规
- C. T_3 、 T_4 、TSH测定
- D. 血糖测定

E. ACTH兴奋试验

113. 该患者最可能的诊断是

- A. 肾上腺皮质功能减退所致精神障碍
- B. 甲状腺功能减退所致精神障碍
- C. 糖尿病所致精神障碍
- D. 甲状腺功能亢进所致精神障碍
- E. 肾上腺皮质功能亢进所致精神障碍

114. 该患者最重要的治疗是

- A. 应用肾上腺皮质激素
- B. 补充雌激素
- C. 控制精神症状
- D. 补充甲状腺素
- E. 控制血糖

(115—117 题共用题干)

女,28岁。经产妇,人工流产2次。妊娠37周,晨起发现阴道流血,多于月经量,无腹痛。查体:P 80次/分,BP 110/70mmHg,胎方位LOA,胎头高浮,胎心率150次/分,耻骨联合上可闻及血管音。

115. 最可能的诊断是

- A. 先兆临产
- B. 胎盘早剥
- C. 子宫破裂
- D. 前置胎盘
- E. 先兆早产

116. 为明确诊断应首先进行的检查是

- A. 阴道双合诊
- B. 肛门指诊
- C. 超声检查
- D. MRI扫描
- E. 催产素激惹试验(OCT)

117. 本例最适合的处理是

- A. 给予子宫收缩剂
- B. 严密观察,等待自然临产
- C. 人工破膜
- D. 行剖宫产术
- E. 产钳助娩

(118—119 题共用题干)

女,22岁,在读大学生。于半年前觉得其身材不够苗条,开始极端地限制饮食,每餐只吃青菜、水果及极少量米饭。喝水较少,称水喝多了会浮肿。体型日渐消瘦,但其仍认为偏胖。近1个月暴饮暴食,进食后为避免体重反弹而自行催吐,每周4~5次,并出现失眠,整夜难以入睡,情绪低落,不能坚持上课。

118. 该患者最可能的诊断是

- A. 非器质性失眠症
- B. 抑郁症伴贪食

- C. 神经性呕吐
- D. 神经性厌食症
- E. 神经性贪食症

119. 对患者的治疗措施不包括

- A. 电抽搐治疗
- B. 认知行为治疗
- C. 抗抑郁药物治疗
- D. 躯体支持治疗
- E. 小剂量抗精神病药物治疗

(120—122 题共用题干)

女,31 岁。产后 5 个月,哺乳期,阴道不规则流血半月余,胸闷咳嗽 10 天。妇科检查:宫颈前唇有一个 2cm×1cm×1cm 的紫蓝色结节,子宫如 50 天妊娠大小,质软,无压痛。双侧附件区各触及囊性包块,均约 6cm×5cm×5cm 大小,表面光滑。胸 X 线片示双肺中下部多发棉絮状阴影。

120. 对诊断意义最大的辅助检查是

- A. 腹部 CT 检查
- B. 盆腔 B 超检查
- C. 胸腔镜检查
- D. 血、尿常规检查
- E. 血清 hCG 测定

121. 最可能的诊断是

- A. 侵蚀性葡萄胎
- B. 胎盘残留
- C. 肺癌
- D. 绒癌
- E. 卵巢肿瘤

122. 首选的治疗方案是

- A. 卵巢肿瘤切除术
- B. 放射治疗
- C. 清宫术
- D. 化学治疗
- E. 子宫切除

(123—124 题共用题干)

男,56 岁。饮酒史 30 余年。20 年前下岗后饮酒量渐增加,每天白酒 1 斤,从未间断。进食少,体型消瘦。能间断外出打零工,生活基本正常。10 年前常无故怀疑妻子有外遇。近 2 年记忆力明显下降,易忘事。4 天前患者被摩托车撞伤致胫骨骨折,住院拟行手术治疗,故停酒 3 天。昨晚患者看见地板上有各种虫子在爬,大喊大叫称床底下着火了,紧张害怕。不认识爱人,不知道自己在什么地方。

123. 该患者目前处于

- A. 妄想状态
- B. 谵妄状态

- C. 躁狂状态
- D. 幻觉状态
- E. 痴呆状态

124. 对患者的治疗不正确的是

- A. 补充大量 B 族维生素
- B. 大剂量抗精神病药物治疗
- C. 给予保护性约束
- D. 苯二氮革类药物替代治疗
- E. 输液营养支持治疗

(125—127 题共用题干)

女,45 岁,G₄P₂。月经规律,白带增多半年,性交后阴道流血 2 个月。近 3 年未体检。妇科检查发现宫颈重度糜烂状,接触性出血(+),子宫附件未见明显异常。宫颈活检组织病理报告为宫颈鳞状细胞癌,浸润深度为 7mm。

125. 该患者的临床分期是

- A. I A₂
- B. I B₁
- C. I B₂
- D. I A₁
- E. II A

126. 宜选择的手术方案是

- A. 改良广泛性子宫切除术+盆腔淋巴结切除术
- B. 广泛子宫切除术+盆腔淋巴结切除术
- C. 筋膜内全子宫切除术+盆腔淋巴结切除术
- D. 广泛子宫切除术+盆腔淋巴结切除术
- E. 筋膜外全子宫切除术+盆腔淋巴结切除术

127. 如术后组织病理学证实右侧髂外淋巴结转移,最恰当的处理是

- A. 放化疗
- B. 观察随访
- C. 性激素治疗
- D. 物理治疗
- E. 生物治疗

(128—130 题共用题干)

女,28 岁,初孕妇,平素月经规律,妊娠 40 周,孕期检查正常,今自觉胎动减少。查体:T 36.0℃,P 70 次/分,R 20 次/分,BP 110/70mmHg,超声检查:羊水最大暗区 2.5cm,指数 7.0cm,检查:宫颈管未消,宫口未开,先露 -3,胎心率 120 次/分。

128. 应进行的检查中不包括

- A. 胎儿电子监护
- B. 尿雌激素/肌酐比值
- C. MRI
- D. 胎儿生物物理评分
- E. B 超复查

129. 对该孕妇首选的处理措施是

- A. 米索前列醇引产
- B. 催产素激惹试验(OCT)
- C. 静脉注射地西泮
- D. 人工破膜
- E. 静脉滴注缩宫素引产

130. 该孕妇临产开始后,胎心监护示有频繁晚期减速,最恰当的处理措施是

- A. 抑制宫缩
- B. 加压给氧
- C. 待宫口开全产钳助产
- D. 继续观察产程
- E. 剖宫产

(131—133 题共用题干)

男孩,1岁。发热3天,呕吐1次,抽搐1次,既往6个月曾热性惊厥1次。按时预防接种,出生史无特殊。查体:T 38.2℃,R 30次/分,BP 90/55mmHg,颈抵抗(+),双肺听诊未见异常。心率130次/分,心律齐,腹软,肝脾肋下未触及,四肢暖,肌力、肌张力正常。Babinski征(+).

131. 初步诊断首先考虑

- A. 中毒型细菌性痢疾
- B. 中枢神经系统感染
- C. 脑发育不全
- D. 热性惊厥
- E. 手足搐搦症

132. 为明确诊断,首先宜进行的检查是

- A. 脑电图
- B. 血钙、磷测定
- C. 腰穿检查脑脊液
- D. 粪镜检及培养
- E. 血培养加药物敏感实验

133. 【假设信息】抗生素静脉滴注3天后热退,精神好

转。但1周后又发热至38.5℃左右,并呕吐,惊厥1次。最可能出现的情况是

- A. 并发脑脓肿
- B. 并发硬膜下积液
- C. 并发脑积水
- D. 并发脑室管膜炎
- E. 院内上呼吸道感染

(134—136 题共用题干)

男,45岁。车祸致左枕部着地,当即意识丧失,送至附近医院途中右侧肢体间断性抽搐伴喷射状呕吐3次。查体:P 56次/分,BP 160/95mmHg,浅昏迷,躁动,右侧瞳孔直径约4mm,左侧2mm;对光反射:左侧存在,右侧消失,左侧肌力3级,右侧肌力5级;左枕部头皮血肿,颈项强直。

134. 最主要的诊断是

- A. 右额急性硬脑膜下血肿伴左小脑幕切迹疝
- B. 右额急性硬脑膜下血肿伴右小脑幕切迹疝
- C. 左额广泛脑挫裂伤伴左小脑幕切迹疝
- D. 左额急性硬脑膜下血肿伴左小脑幕切迹疝
- E. 左额急性硬脑膜下血肿伴右小脑幕切迹疝

135. 颅内出血的来源是

- A. 板障静脉
- B. 脑表面小血管
- C. 下矢状窦
- D. 横窦
- E. 硬脑膜中动脉

136. 优先采取的处理措施是

- A. 给予消炎药和神经营养药
- B. 适量输液和给予脱水剂
- C. 注射止血剂和输血
- D. 制动并注射镇静剂
- E. 维持呼吸道通畅

B1 型选择题 (137—150 题)

答 题 说 明

以下提供若干组试题,每组试题共用在此题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案,请从中选择一个与问题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某一个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(137—138 题共用备选答案)

- A. 麻疹
- B. 川崎病
- C. 水痘
- D. 猩红热

E. 幼儿急疹

137. 男婴,6个月。发热4天,热退疹出。查体:精神好,咽部轻度充血,躯干有较密集红色小丘疹,疹间皮肤正常,左侧颈部可触及一个0.5cm×0.5cm大小的淋巴结。诊断是

138. 男孩, 6 岁, 发热伴皮疹 2 天。查体: 咽部充血, 双扁桃体 II 度肿大, 可见脓性分泌物, 杨梅舌, 全身红色鸡皮样疹, 疹间皮肤潮红, 双颌下各可触及一个 1.0cm × 0.5cm 大小的淋巴结, 有触痛, 诊断是

(139—141 题共用备选答案)

- A. 眼裂正常, 瞳孔扩大, 直接对光反射迟钝
- B. 眼裂扩大, 瞳孔缩小, 直接对光反射正常
- C. 眼裂变小, 瞳孔缩小, 直接对光反射正常
- D. 眼裂变小, 瞳孔正常, 直接对光反射正常
- E. 眼裂变小, 瞳孔扩大, 直接对光反射消失

139. 动脉瘤性动眼神经麻痹的临床表现是
140. 霍纳综合征的临床表现是
141. 重症肌无力眼肌型的临床表现是

(142—143 题共用备选答案)

- A. 输卵管妊娠
- B. 生殖器结核
- C. 盆腔炎性疾病
- D. 卵巢上皮性癌
- E. 子宫内膜异位症

142. 女, 31 岁。取环后 10 天, 发热 3 天。查体: T 38.6℃, P 98 次/分, R 23 次/分, BP 100/80mmHg, 宫颈举痛(+), 子宫压痛, 右侧附件区可触及腊肠型肿物, 触痛明显, 活动度差。该患者最可能的诊断是
143. 女, 31 岁。婚后 2 年未孕, 性生活正常, 既往痛经 5 年。妇科检查: 子宫后倾后屈位, 正常大小, 活动度差, 后穹隆有触痛结节, 子宫左侧可触及直径 5cm 包块, 该患者最可能的诊断是

(144—146 题共用备选答案)

- A. 出生后 10~12 个月
- B. 出生后 2 个月
- C. 出生后 4~6 个月
- D. 出生后 7~9 个月
- E. 出生后 2 周

144. 足月儿开始添加维生素 D 的时间是
145. 足月儿开始添加米粉的时间是
146. 足月儿开始添加肉末、菜末的时间是

(147—148 题共用备选答案)

- A. 肌内注射缩宫素
- B. 肌内注射苯巴比妥钠
- C. 保胎治疗
- D. 立即行清宫术
- E. 肌内注射麦角新碱

147. 女, 35 岁, 已婚。停经 70 天, 阴道中等量流血 1 天。妇科检查: 宫口可见组织物堵塞, 子宫稍大、软, 双侧附件未触及异常。本例首选的处理措施是
148. 女, 31 岁, 已婚。停经 58 天, 阴道少量流血、下腹隐痛 4 天。妇科检查: 宫口闭, 子宫如孕 50 天大, 质软, 双侧附件区未触及异常。B 超显示有心管搏动。应首选的处理措施是

(149—150 题共用备选答案)

- A. 肺部体征出现较早, 易引起肺脓肿、肺大疱
- B. 体温一般不高, 喘憋为主, 肺部听诊有哮鸣音
- C. 多为稽留热, 肺部体征出现晚
- D. 嗜酸细胞增高
- E. X 线检查示肺部片状阴影, 呈云雾状或游走性

149. 金黄色葡萄球菌肺炎的主要临床特点是
150. 腺病毒肺炎可出现

