

2023 年执业/助理医师资格考试

笔试高频精选真题

乡村全科助理医师精选 300 题

金英杰临床研究院

1.(A1/A2 型题)新世纪人们医学模式和健康观念的改变是由于

- A.传染病病死率太高
- B.发明了治疗传染病的抗菌药物
- C.环境严重污染
- D.城市人口增多
- E.慢性非传染性疾病的发病率和死亡率增加

答案: E

解析: 此题暂无解析

2.(A1/A2 型题)促进医学模式转变的因素不包括

- A.疾病谱顺位的变化
- B.社会因素对健康和疾病的作用增强
- C.人们需求层次的提高
- D.现代人心身素质降低
- E.人类认识水平的提高

答案: D

解析: 关于医学模式的转变问题, 讨论主要涉及以下几个方面: ①随着生物因素疾病如传染病得到控制, 人类死亡谱的结构已发生根本变化, 心脏病、恶性肿瘤、脑血管病、意外死亡等取代传染病成为人类主要死亡原因 (A 正确)。②这些致死性疾病与吸烟、酗酒、滥用药物、过量饮食与肥胖、运动不足和对社会压力的不良反应等生活方式或行为方式有关, 心理社会因素则是上述各种行为问题直接或间接的原因。③现代社会的发展, 使生活节奏加快, 知识更新迅速, 社会竞争加剧, 这些都对人类的内部适应能力提出了挑战, 如何保持健全的心理状态, 如何调节不良情绪成为现代人面临的主要问题 (E 正确)。④通过几十年的深入研究, 人们对心理社会因素与健康与疾病的关系已有较深入的了解。许多实验和临床证据也证明, 心理活动的操作和调节对维持健康具有不可忽视的作用 (B 正确)。随着人类物质文明的发展, 人们对心身舒适的要求不断提高, 迫切需要医生在解决其身体疾病造成的直接痛苦的同时, 也帮助他们减轻精神上的痛苦 (C 正确)。故选 D。

3.(A1/A2 型题)以上各类心理学中, 研究心理咨询.心理诊断的属于

- A.生理心理学
- B.健康心理学
- C.神经心理学
- D.临床心理学
- E.变态心理学

答案: D

解析: 临床心理学工作者去帮助那些存在心理困扰的人们, 例如心理治疗和心理咨询工作就是临床心理学的重要内容。

4.(A1/A2 型题)医学心理学的基本观点不包括

- A.遗传决定论的观点
- B.主动适应与调节的观点
- C.情绪因素作用的观点
- D.个性特征作用的观点
- E.认知评价的观点

答案：A

解析：医学心理学的基本观点：①心身统一的观点；②社会对个体影响的观点；③认知评价的观点；④主动适应与调节的观点；⑤情绪因素作用的观点；⑥人格特征作用的观点。

5.(A1/A2 型题)下列关于医学心理学的表述不正确的是

- A.是一门交叉学科
- B.是医学的分支学科
- C.以维护和促进人类整体健康为目的
- D.以人作为主要研究和服务对象
- E.研究医学领域中的心理学问题

答案：B

解析：医学心理学是心理学与医学相结合的一门交叉学科，是心理学在医学中的应用。它属于心理学的一个重要分支学科。它以人作为主要研究和服务对象，研究医学领域中的心理学问题，侧重研究心理因素对人类健康与疾病的影响以及在它们相互转化过程中的作用和规律。它还运用心理学的理论方法和手段对疾病的发生、诊断与治疗、康复和预防等方面的心理问题进行研究和干预，以维护和促进人类的整体健康。

6.(A1/A2 型题)医学心理学研究的主要对象是

- A.心理活动的规律的学科
- B.疾病的预防和治疗的原则
- C.疾病的发生发展的规律
- D.人类行为的科学发展
- E.影响健康的有关心理问题和行为

答案：E

解析：医学心理的研究对象是针对人的疾病和健康及其相互转化过程中涉及的各种心理行为问题及其解决这些问题的方法和措施。

7.(A1/A2 型题)对于疾病和健康，无论致病、治疗、预防、康复都应把人视为一个整体，属于

- A.神灵主义医学模式
- B.机械论医学模式
- C.自然哲学医学模式
- D.生物医学模式
- E.生物-心理-社会医学模式

答案：E

解析：1977年美国医生恩格尔(Engle G.L.)在美国《科学》杂志上著文《需要新的医学模式》，批评了生物医学模式的“还原论”和“心身二元论”，并提出了生物-心理-社会医学模式。这一模式认为，对于疾病和健康问题来说，无论是致病、治病、预防及康复，都应把人视为一个整体，充分考虑到患者的心理因素和社会因素的特点，综合考虑各方面因素的交互作用，而不能机械地将它们分割开。

8.(A1/A2 型题)长期的焦虑紧张，容易让人生病，这体现了以下哪个医学心理学的基本观点

- A.心身统一
- B.社会影响
- C.个性特征

D.主动调节

E.被动调节

答案：A

解析：心身统一的观点：一个完整的个体应包括心、身两个部分，两者相互影响。对外界环境的刺激，心、身是作为一个整体来反应的。因此，在医学心理学的研究中，心、身或者说精神与躯体是相辅相成的。

9.(A1/A2 型题)心理健康是指一个人能够具有

A.正常的心理状态

B.健康的身体条件

C.积极的心理活动

D.完好的人际关系

E.良好的环境适应功能

答案：E

解析：一般认为心理健康是以积极的、有效的心理活动，平稳的、正常的心理状态，对当前和发展着的社会、自然环境以及自我内环境的变化具有良好的适应功能，并由此不断地发展健全的人格，提高生活质量，保持旺盛的精力和愉快的情绪。故选 E。

10.(A1/A2 型题)不应列为心理应激对健康的消极影响的是

A.使已有的疾病加重

B.适应性调整，恢复内稳态

C.使原有的疾病复发

D.损害适应能力，引发心身症状

E.与其他因素共同影响引发新的疾病

答案：B

解析：应激的消极意义：①频繁、强烈而突发过度的应激可造成机体唤醒障碍（唤醒不足或过度），耗损过度，适应能力减弱，使心身功能和社会活动障碍，作业能力受损，工作、学习效率下降，引发事故和车祸。②持久和慢性应激，使机体处于适应不良和易感状态，耗竭机体储备，神经内分泌功能紊乱，免疫功能下降，导致心身疾病，引发精神障碍，加重原有的躯体和精神疾病。③应激引起适应不良，造成个体认知上的悲观预测，社会适应能力下降，出现行为障碍。故选 B。

11.(A1/A2 型题)出现在应激源反应中不同的原因是因为个体对于应激源的

A.体质不同

B.认知评价不同

C.敏感度不同

D.反应强度不同

E.文化程度不同

答案：B

解析：此题暂无解析

12.(A1/A2 型题)个体的强烈需求或过高的期望属

A.躯体性应激源

B.心理性应激源

- C.社会性应激源
- D.职业性应激源
- E.文化性应激源

答案：B

解析：精神分析疗法是由奥地利的精神病学家弗洛伊德创立的。他以精神动力学理论为基础，主张通过内省的方式，以自由联想、精神疏泄和分析解释的方法，把压抑在“无意识”中的某些幼年时期的精神创伤或痛苦的体验挖掘或暴露出来，从中发现焦虑根源，启发并帮助患者彻底领悟而重新认识它，从而改变原有的病理模式，重建自己的人格，达到治疗目的。

13.(A1/A2 型题)某电视台编辑求助于一家心理治疗中心，希望在该电视台上播放韦氏智力测验的具体内容，以引起公众对心理学的兴趣，但被心理中心的工作人员婉言拒绝，该工作人员遵循的原则是

- A.保密原则
- B.稳定性原则
- C.标准化原则
- D.回避原则
- E.客观原则

答案：A

解析：应用心理测验的一般原则包括标准化原则、保密原则、客观性原则。其中保密原则包括测验工具的保密和测验结果的保密。故本题选A。

14.(A1/A2 型题)一个为失恋所烦恼的人，在心理咨询者的帮助下，冷静地分析其失恋的主、客观原因后，更加理智地接受这一事实，在一定程度上解脱了自己的压抑心情。这位咨询者运用的心理咨询手段是

- A.宣泄
- B.领悟
- C.活血化瘀
- D.强化自我控制
- E.增强自信心

答案：B

解析：此题暂无解析

15.(A1/A2 型题)让患者一开始就进入他最恐怖的情景，直接消退不良反应的疗法是

- A.塑造法
- B.系统脱敏法
- C.冲击疗法
- D.厌恶疗法
- E.生物反馈法

答案：C

解析：此题暂无解析

16.(A1/A2 型题)心理治疗中，医生要设身处地的理解患者，把患者的内心世界理解为好像是自己的，能分享患者的情感。这是

- A.理解

- B.同情
- C.真诚
- D.反移情
- E.共情

答案：E

解析：此题暂无解析

17.(A1/A2 型题)潜意识属

- A.精神分析
- B.催眠疗法
- C.系统脱敏
- D.行为主义
- E.人本主义

答案：A

解析：奥地利的精神病学家弗洛伊德于 19 世纪末创立了精神分析学派，它在心理治疗的历史上具有非常重要的地位。无意识理论：弗洛伊德将心理活动解剖为三个层次。①意识：是当前注意到的感知外界的各种刺激心理活动。意识活动是遵循“现实原则”来行事的，即合乎社会规范和道德标准的各种观念才能进入意识界；②前意识：即当前未曾注意到，但一经他人提醒或自己集中注意、努力回忆即可进入意识的心理活动，介于意识与潜意识之间；③潜意识：又译成无意识，是不能被人意识到的。正常人的大部分心理活动是在潜意识中进行的，大部分的日常行为是受潜意识驱动的。

18.(A1/A2 型题)当遇到来访者询问“我应该离婚吗?”等问题时，要让来访者自己做出决定，这是心理治疗原则中的

- A.回避原则
- B.灵活原则
- C.耐心原则
- D.综合原则
- E.中立原则

答案：E

解析：“中立”原则：心理治疗的目的是要帮助患者自我成长。心理治疗师不是“救世主”，因此在心理治疗过程中，不能替患者作选择，而应保持某种程度的“中立”。例如当遇到来访者来询问：“我该与谁结婚?”“我应该离婚吗?”等问题时，要让来访者自己做出决定。“中立”原则，并非是“价值中立”，遇到违反原则问题、触犯法律等问题，治疗师则应表明自己明确的态度，而不是“模棱两可”。

19.(A1/A2 型题)饮酒后感到“苦恼消除”，以后每逢心情不快就饮酒这种行为属于

- A.惩罚
- B.消退
- C.反射
- D.负强化
- E.正强化

答案：D

解析：负强化可以被解释为解脱，一个行为的结果移走不愉快的事情，该行为以后就被增强

了。

20.(A1/A2 型题)认为焦虑症症状产生是由于错误学习养成易焦虑的人格后，一旦遇到生活事件便产生焦虑的条件反射，持这种观点的理论是

- A.精神分析理论
- B.认知理论
- C.人本主义理论
- D.行为理论
- E.心理生理理论

答案：D

解析：1913~1930 年是早期行为主义时期，由美国心理学家华生在巴甫洛夫条件反射学说的基础上创立的，他主张心理学应该摒弃意识、意象等太多主观的东西，只研究所观察到的并能客观地加以测量的刺激和反应。毋须理会其中的中间环节，华生称之为“黑箱作业”。1930 年起出现了新行为主义理论，以托尔曼为代表的新行为主义者修正了华生的极端观点。他们指出在个体所受刺激与行为反应之间存在着中间变量，这个中间变量是指个体当时的生理和心理状态，它们是行为的实际决定因子，它们包括需求变量和认知变量。需求变量本质上就是动机，它们包括性、饥饿以及面临危险时对安全的要求。认知变量就是能力，它们包括对象知觉、运动技能等等。分析题干可知此题选 D。

21.(A1/A2 型题)在酒中加入戒酒药使酗酒者饮用后痛苦的恶心呕吐，抵消了饮酒的欣快感，从而促使戒酒，这种方法是

- A.系统脱敏疗法
- B.厌恶疗法
- C.标记奖励法
- D.生物反馈疗法
- E.放松训练

答案：B

解析：此题暂无解析

22.(A1/A2 型题)心理咨询的主要手段不包括

- A.宣泄
- B.领悟
- C.倾听
- D.强化自我控制
- E.增强自信心

答案：C

解析：此题暂无解析

23.(A1/A2 型题)以下哪一个说法是错误的

- A.心理咨询与心理治疗两者之间没有本质区别
- B.心理咨询与心理治疗的对象是一样的
- C.心理咨询与心理治疗所采用的理论和方法是一样的
- D.心理咨询与心理治疗都注重建立帮助者与求助者之间良好的人际关系
- E.心理咨询与心理治疗在实际工作中很难截然分开

答案：B

解析：此题暂无解析

24.(A1/A2 型题)下列沟通中，属开放式提问的是

- A.“您今天早上吃过药了吗？”
- B.“您为什么不愿意选择手术治疗呢？”
- C.“您的学历是本科吧？”
- D.“您现在有疼痛的感觉吗？”
- E.“您每天运动时间有 1 小时吗？”

答案：B

解析：此题暂无解析

25.(A1/A2 型题)了解患者情绪反应的主要途径是

- A.面部表情
- B.身体表情
- C.语调表情
- D.语速
- E.目光接触

答案：A

解析：此题暂无解析

26.(A1/A2 型题)医患沟通最重要的是

- A.患者的态度
- B.医生的态度
- C.患者所患疾病
- D.患者的家庭背景
- E.医护人员的医疗技术水平

答案：B

解析：此题暂无解析

27.(A1/A2 型题)医学伦理学的研究对象是

- A.医学道德难题
- B.医德基本理论
- C.医学道德关系
- D.医德基本实践
- E.医德基本规范

答案：C

解析：医学伦理学是研究医学道德关系的科学，以科学领域中医务人员的医德意识和医德活动为研究对象，答案为 C。A、B、E 都只涉及医学道德的一部分，不全面。D 为医德修养的要求，故不选 D。

28.(A1/A2 型题)不属于我国社会主义医德基本原则内容的一项是

- A.中西医并重
- B.防病治病

- C.救死扶伤
- D.实行社会主义人道主义
- E.全心全意为人民身心健康服务

答案：A

解析：此题暂无解析

29.(A1/A2 型题)医学人道观的基本内容不包括

- A.尊重患者的平等医疗保健权
- B.消除或减轻影响患者健康的危险因素
- C.对患者尽量使用高新技术
- D.尊重患者的人格
- E.尊重患者的生命

答案：C

解析：医学人道观是指在医学活动中，特别是在医患关系中表现出来的同情和关心患者、尊重患者的人格与权利、维护患者利益、珍视人的生命价值和质量的伦理思想和权利观念。医学人道观、人权观的核心内容：尊重患者生命、尊重患者的人格、尊重患者平等的医疗权利、尊重患者的生命价值。对患者尽量使用高新技术，表面上看是对患者做到了“负责”，然而这也走向了另一个极端“过度医疗”，这也是目前我国医疗市场中存在的一个“弊端”。要知道，这样的做法是违背医学人道观的，故答案选 C。

30.(A1/A2 型题)《医疗机构从业人员行为规范》中“以人为本，践行宗旨”的具体要求不包括

- A.积极维护社会公益，促进人类健康
- B.坚持救死扶伤，防病治病的宗旨
- C.发扬大医精诚理念
- D.以患者为中心，全心全意为人民健康服务
- E.发扬人道主义精神

答案：A

解析：以人为本，践行宗旨就是要求医疗机构人员践行救死扶伤、防病治病的宗旨（B 项），发扬大医精诚理念（C 项）和人道主义精神（E 项），以病人为中心，全心全意为人民健康服务（D 项）。

31.(A1/A2 型题)医师应认真执行医疗文书书写与管理制度，应（

- A.隐匿
- B.不伪造
- C.违规涂改
- D.销毁
- E.违规签署

答案：B

解析：此题暂无解析

32.(A1/A2 型题)女，50 岁。因子宫肌瘤行全子宫切除术。术中医生发现患者左侧卵巢有病变应切除，在未征得患者及其家属同意的情况下，将左侧卵巢与子宫一并切除。术后患者恢复良好。该案例中，医生违背的临床诊疗伦理原则是

- A.知情同意原则

- B.患者至上原则
- C.守信原则
- D.最优化原则
- E.保密原则

答案：A

解析：医生未征得患者及其家属同意的情况下行左侧卵巢与子宫一并切除，违背了患者及家属的知情同意的原则。知情同意原则是指临床诊治过程中，医生在决定和实施诊疗措施前，都应向患者作详尽的说明，并取得患者的充分理解，并表示同意。对于一些特殊检查、特殊治疗和手术，以患者或其家属（或监护人）签字为据。故选A。

33.(A1/A2 型题)一位3岁患儿患急性菌痢住进医院，经治疗本已好转，即将出院。其父

- A.无知，无原则，违背了有利病人的原则
- B.无知，无原则，违背了人道主义原则
- C.曲解家属自主权，违反操作规程，违背了行善的原则
- D.曲解家属自主权，违反操作规程，违背了不伤害病人的原则
- E.曲解家属自主权，违反操作规程，违背了人道主义原则

答案：D

解析：此题暂无解析

34.(A1/A2 型题)护理伦理学基本原则不包含

- A.不伤害原则
- B.有利原则
- C.尊重原则
- D.照顾原则
- E.公正原则

答案：D

解析：此题暂无解析

35.(A1/A2 型题)医学伦理学的不伤害原则，是指

- A.最大限度地降低对病人的伤害
- B.最大限度地消除对病人的心理伤害
- C.最大限度地消除对病人的躯体伤害
- D.消除对病人的任何身心伤害
- E.避免对病人的任何身心伤害

答案：A

解析：所谓“不伤害”是指不使病人的躯体、心灵或精神受到伤害，包括不可杀害在内。现实中的医疗伤害带有一定的必然性。不伤害不是一个绝对的原则，其实质是努力避免患者的身心受到不应有的伤害。

36.(A1/A2 型题)"知情同意"中的"知情"应包含哪两层含义

- A.信息告知和信息理解
- B.信息告知和自由同意
- C.信息理解和同意能力
- D.信息理解和自由同意

E.自由同意和同意能力

答案：A

解析：此题暂无解析

37.(A1/A2 型题)不包含在医学伦理学有利原则之内的是

- A.努力使病人受益（有助益）
- B.努力预防和减少难以避免的伤害
- C.对利害得失全面权衡
- D.造成意外伤害时主动积极赔偿
- E.关心病人的客观利益和主观利益

答案：D

解析：此题暂无解析

38.(A1/A2 型题)无行为能力的患者，由其家属代理履行知情同意，符合的原则是

- A.有利原则
- B.不伤害原则
- C.公益原则
- D.尊重原则
- E.公正原则

答案：D

解析：人格尊严是与生俱有的，首先必须得到保护。而自主性指患者对有关自己医护问题，经过深思熟虑后作出的理性决定，如知情同意、知情选择、要求保密等。本题正是指出了知情同意权的更多内容，首先要患者知情同意，当患者无行为能力（或者患者知情会对病情有影响，如癌症）时，家属或监护人代理知情同意；生命危急时，家属和监护人不在场或来不及赶到医院，医务人员出于患者利益和自身责任，可以行使家长权。

39.(A1/A2 型题)某医院急诊医生接诊了一位遭遇车祸后昏迷的患者，立即给予了心肺复苏、气管插管等抢救措施。此时的医患关系所属的类型是

- A.共同参与型
- B.主动-被动型
- C.指导合作型
- D.合作-监督型
- E.主动权威型

答案：B

解析：此题暂无解析

40.(A1/A2 型题)李某，因妊娠异常需行剖宫产术，经治医师在告知孕妇丈夫手术相关信息并取得签字后实施手术。胎儿被取出后发现产妇患有双侧卵巢畸胎瘤，遂告知其丈夫并建议切除双侧卵巢。李某丈夫立即打电话与其他家属商议，医师在尚未得到家属商议结果的情况下，继续手术并切除双侧卵巢，于是发生医患纠纷。此案例中，医师侵犯的患方权利是

- A.疾病认知权
- B.知情同意权
- C.隐私保护权
- D.生命权

E.健康权

答案：B

解析：此题暂无解析

41.(A1/A2 型题)以下哪项不属于影响医患关系因素

A.缺乏信息

B.交往障碍

C.遵医行为差

D.同情心不够

E.患者贫困

答案：E

解析：此题暂无解析

42.(A1/A2 型题)主要适用于康复期患者的医患关系模式是

A.主动—被动模式

B.指导—合作模式

C.共同参与模式

D.朋友互助模式

E.以上都不是

答案：C

解析：此题暂无解析

43.(A1/A2 型题)医患关系的核心是

A.患者所患疾病

B.医生的态度

C.患者的利益

D.患者的态度

E.医生所采取的治疗措施

答案：C

解析：此题暂无解析

44.(A1/A2 型题)对于长期慢性病人，宜采取的医患关系模式是

A.主动—被动型

B.被动—主动型

C.指导—合作型

D.共同参与型

E.合作—指导型

答案：D

解析：共同参与型模式中，医患双方有近乎同等的权利，共同参与医疗方案的决定与实施。这种模式适用于具有一定医学背景知识或长期的慢性病患者，它类似于成人与成人之间的关系，医生的责任是“帮助患者自疗”。

45.(A1/A2 型题)不属于患者道德义务的是

A.支持医学发展

- B.遵守医院规章制度
- C.对医疗机构及其医务人员进行监督
- D.尊重医务人员的人格和劳动
- E.支付医疗费用

答案：C

解析：C项为患者的权利。

46.(A1/A2型题)健康教育的实质是

- A.确保健康教育目标的实现
- B.行为干预
- C.确立健康教育的诊断
- D.健康教育的过程
- E.健康教育的效果

答案：B

解析：此题暂无解析

47.(A1/A2型题)医疗保健机构，卫生防疫机构发现传染病时，应当及时采取的控制措施中不包括：

- A.对甲类传染病病人和病原携带者，乙类传染病中的艾滋病病人、炭疽中的肺炭疽病人，予以隔离治疗
- B.对除艾滋病病人、炭疽中的肺炭疽病人以外的乙类、丙类传染病病人，根据病情，采取必要的治疗和控制传播措施
- C.对疑似甲类传染病病人，在明确诊断前，在指定场所进行医学观察
- D.对疑似乙类传染病中的艾滋病病人，在明确诊断前，在指定场所进行医学观察
- E.对传染病病人、病原携带者、疑似传染病病人污染的场所、物品和密切接触的人员，实施必要的卫生处理和预防措施

答案：D

解析：此题暂无解析

48.(A1/A2型题)根据《传染病防治法》规定，需按照甲类传染病采取预防控制措施的乙类传染病是

- A.疟疾
- B.肺炭疽
- C.登革热
- D.梅毒
- E.肺结核

答案：B

解析：此题暂无解析

49.(A1/A2型题)对医疗机构内的甲类传染病患者的密切接触者，医疗机构应采取的措施是

- A.对疫点进行卫生处理
- B.强制隔离治疗
- C.在指定场所进行医学观察
- D.在指定场所单独治疗

E.划定疫点

答案：C

解析：此题暂无解析

50.(A1/A2 型题)患儿王某因发热 3 日到县医院就诊，接诊医师林某检查后拟诊为流行性出血热。因县医院不具备隔离治疗条件，林某遂嘱患儿的家长带王某去市传染病医院就诊。按照《传染病防治法》的规定，林某应当

- A.请上级医师会诊，确诊后再转诊
- B.请上级医师会诊，确诊后隔离治疗
- C.向医院领导报告，确诊后对王某就地隔离
- D.向当地疾病控制机构报告，并复印病历资料转诊
- E.向当地疾病控制机构报告，由疾病控制机构转诊

答案：D

解析：流行性出血热属于乙类传染病。《传染病防治法》规定任何单位和个人发现传染病患者或者疑似传染病患者时，应当及时向附近的疾病预防控制机构或者医疗机构报告。医疗机构对传染病应当实行传染病预检、分诊制度；对传染病患者、疑似传染病患者，应当引导至相对隔离的分诊点进行初诊。医疗机构不具备相应救治能力的，应当将患者及其病历记录复印件一并转至具备相应救治能力的医疗机构。

51.(A1/A2 型题)关于医疗卫生机构对医疗废物的管理不正确的是

- A.及时收集本单位的医疗废物
- B.建立医疗废物暂时贮存设施
- C.使用专用运送工具
- D.及时交由医疗废物集中处置单位处置
- E.医疗废物不可焚烧和掩埋

答案：E

解析：自行处置医疗废物的，应当符合下列基本要求：①使用后的一次性医疗器具和容易致人损伤的医疗废物，应当消毒并作毁形处理；②能够焚烧的，应当及时焚烧；③不能焚烧的，消毒后集中填埋。故 E 是错误的。

52.(A1/A2 型题)医疗保健机构施行结扎手术、终止妊娠手术须经什么机构的审批

- A.县级以上卫生行政部门
- B.设区的市级卫生行政部门
- C.省级卫生行政部门
- D.计划生育行政部门
- E.国务院卫生行政部门

答案：A

解析：此题暂无解析

53.(A1/A2 型题)某女怀孕后，非常想知道胎儿的性别，遂请其好友某妇产科医师为其做胎儿性别测定。该医师实施了胎儿性别鉴定。根据《母婴保护法》的规定，当地卫生计生行政部门应对该医师作出的处理是

- A.处以罚款
- B.给予行政处分

- C.扣发年度奖金
- D.调离工作岗位
- E.离岗接受培训

答案：B

解析：根据《中华人民共和国母婴保健法》规定：从事母婴保健工作的人员违反本法规定，出具有关虚假医学证明或者进行胎儿性别鉴定的，由医疗保健机构或者卫生行政部门根据情节给予行政处分；情节严重的，依法取消执业资格。故本题选 B。

54.(A1/A2 型题)具有中等专业学校医学专业学历，在医疗、预防、保健机构中工作满几年可以参加执业医师资格考试

- A.1 年
- B.2 年
- C.3 年
- D.4 年
- E.5 年

答案：E

解析：此题暂无解析

55.(A1/A2 型题)医师在执业活动中违反卫生行政规章制度造成严重后果的，卫生行政部门可以责令其暂停一定期限的执业活动，该期限是

- A.6 个月以上 1 年以下
- B.1 年以上 1 年半以下
- C.1 年以上 2 年以下
- D.1 个月以上 3 个月以下
- E.3 个月以上 6 个月以下

答案：A

解析：《执业医师法》第 37 条规定：医师在执业活动中，违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府卫生行政部门给予警告或者责令暂停六个月以上一年以下执业活动；情节严重的，吊销其执业证书；构成犯罪的，依法追究刑事责任：①违反卫生行政规章制度或者技术操作规范，造成严重后果的；②由于不负责任延误急危患者的抢救和诊治，造成严重后果的；③造成医疗责任事故的；④未经亲自诊查、调查，签署诊断、治疗、流行病学等证明文件或者有关出生、死亡等证明文件的；⑤隐匿、伪造或者擅自销毁医学文书及有关资料的；⑥使用未经批准使用的药品、消毒药剂和医疗器械的；⑦不按照规定使用麻醉药品、医疗用毒性药品、精神药品和放射性药品的；⑧未经患者或者其家属同意，对患者进行实验性临床医疗的；⑨泄露患者隐私，造成严重后果的；⑩利用职务之便，索取、非法收受患者财物或者牟取其他不正当利益的；⑪发生自然灾害、传染病流行、突发重大伤亡事故以及其他严重威胁人民生命健康的紧急情况时，不服从卫生行政部门调遣的；⑫发生医疗事故或者发现传染病疫情，患者涉嫌伤害事件或者非正常死亡，不按照规定报告的。故选 A。

56.(A1/A2 型题)受理执业医师注册申请的卫生行政部门，对应当准予注册的，准予注册期限是自收到申请之日起

- A.7 日内
- B.10 日内

- C.15 日内
- D.30 日内
- E.60 日内

答案：D

解析：受理执业医师注册申请的卫生行政部门应当自收到申请之日起 30 日内，对申请人提交的材料进行审核，除有《执业医师法》规定的不予注册的情形外，准予注册，并发给由国务院卫生行政部门统一印制的医师执业证书

57.(A1/A2 型题)卫生行政部门决定不予医师执业注册的，申请人有异议时

- A.只能申请复议
- B.只能向人民法院起诉
- C.可随时申请复议或向人民法院起诉
- D.可自收到通知之日起 10 日内申请复议或向人民法院起诉
- E.可自收到不予注册通知之日起 15 日内，申请复议或向人民法院起诉

答案：E

解析：受理申请的卫生行政部门对不符合条件不予注册的，应当自收到申请之日起三十日内书面通知申请人，并说明理由。申请人有异议的，可以自收到通知之日起十五日内，依法申请复议或者向人民法院提起诉讼。

58.(A1/A2 型题)王某经执业医师考试合格并进行注册后，开办了一家牙科诊所，同时因为其对于妇产科知识和操作较为熟悉，所以平时也会诊治一些妇科和产科的患者，其进行的妇产科诊疗活动属于

- A.法律允许的行为
- B.医师执业规定所允许的行为
- C.只要不发生差错，法律即允许
- D.超出执业范围的违法行为
- E.只要是患者自愿，就是法律允许的行为

答案：D

解析：参见《执业医师法》第十四条：医师经注册后，可以在医疗、预防、保健机构中按照注册的执业地点、执业类别、执业范围执业，从事相应的医疗、预防、保健业务。

59.(A1/A2 型题)擅自开办医疗机构行医给患者造成损害的

- A.责令暂停六个月以上一年以下执业活动
- B.吊销其执业证书
- C.追究刑事责任
- D.罚款
- E.承担赔偿责任

答案：E

解析：此题暂无解析

60.(A1/A2 型题)根据《侵权责任法》，什么时候必须要取得患方的书面同意才能够实施医疗行为

- A.任何诊断活动
- B.任何治疗活动

- C. 实施手术
- D. 特殊检查.特殊治疗时
- E. 仅在实施手术时

答案：C

解析：此题暂无解析

61.(A1/A2 型题)女，36 岁。因患子宫肌瘤在县医院接受手术治疗，术后患者因对手术效果不满意诉至法院。法院经审理认为医院存在《侵权责任法》规定的过错推定情形，判决医院败诉。该推定情形是

- A. 未尽到说明义务
- B. 未尽到与当时医疗水平相应的诊疗义务
- C. 伪造病历资料
- D. 泄露患者隐私
- E. 限于当时的医疗水平难以诊疗

答案：A

解析：根据《侵权责任法》第 54 条规定，患者在诊疗活动中受到损害，医疗机构及其医务人员有过错的，由医疗机构承担赔偿责任。第 55 条规定：医务人员在诊疗活动中应当向患者说明病情和医疗措施。需要实施手术、特殊检查、特殊治疗的，医务人员应当及时向患者说明医疗风险、替代医疗方案等情况，并取得其书面同意；不宜向患者说明的，应当向患者的近亲属说明，并取得其书面同意。该患者术前不清楚手术情况造成对手术效果不满意，说明医务人员未尽到说明义务。故选 A。

62.(A1/A2 型题)精神障碍患者合法权益保护说法有误的是

- A. 精神障碍患者的人格尊严.人身和财产安全不受侵犯
- B. 精神障碍患者的教育.劳动.医疗以及从国家和社会获得物质帮助等方面的合法权益受法律保护
- C. 有关单位和个人应当对精神障碍患者的姓名.肖像.住址.工作单位.病历资料以及其他可能推断出其身份的信息完全保密，不得泄露
- D. 全社会应当尊重.理解.关爱精神障碍患者
- E. 精神障碍患者的监护人应当履行监护职责，维护精神障碍患者的合法权益

答案：C

解析：此题暂无解析

63.(A1/A2 型题)关于精神障碍患者的治疗措施描述错误的是

- A. 患者自愿住院
- B. 医疗机构不能同意患者要求的随时出院
- C. 自愿住院治疗的精神障碍患者可以要求随时出院
- D. 医生应尊重患者的权利
- E. 有伤害自身危险情形的精神障碍患者，监护人可以随时要求出院，医疗机构应当同意

答案：B

解析：自愿住院治疗的精神障碍患者可以随时要求出院，医疗机构应当同意。

64.(A1/A2 型题)根据我国《医疗机构管理条例》的规定，下列选项中那个机构可以依法开展诊疗活动

- A.卫生防疫机构
- B.国境卫生检疫机构
- C.医学科研机构
- D.美容服务机构
- E.医疗保健机构

答案：E

解析：此题暂无解析

65.(A1/A2 型题)未经医师（士）亲自诊查或亲自接产，医疗机构不得出具以下证明文件。除了

- A.疾病诊断书
- B.健康证明书
- C.死产报告书
- D.死亡证明书
- E.医疗纠纷分析证言

答案：E

解析：未经医师（士）亲自诊查或亲自接产，医疗机构不得出具疾病诊断书、健康证明书或者死亡证明书等证明文件；未经医师（士）、助产人员亲自接产，医疗机构不得出具出生证明书或者死产报告书。

66.(A1/A2 型题)个人门诊在开展诊疗活动前，必须依法取得

- A.《设置医疗机构批准书》
- B.《设置医疗机构备案回执》
- C.《医疗机构执业许可证》
- D.《医疗机构校验申请书》
- E.《医疗机构申请变更登记注册书》

答案：C

解析：《医疗机构管理条例》第十五条，医疗机构执业，必须进行登记，领取《医疗机构执业许可证》。

67.(A1/A2 型题)下列情形属于医疗事故的是

- A.手术开错部位造成较大创伤
- B.诊疗护理中违反了规章制度，尚未给病员造成不良影响和损害
- C.因患者体质特殊发生难以预料的后果
- D.由于一种疾病合并发生另一种疾病
- E.无业游民冒充医生，非法给一位农村妇女进行节育复通手术，造成该妇女卵巢器质性损害

答案：A

解析：此题暂无解析

68.(A1/A2 型题)负责组织医疗事故技术鉴定工作的医学会应当在当事人提交了有关医疗事故技术鉴定的材料、书面陈述及答辩之日起多少天内出具医疗事故鉴定书

- A.5 天
- B.10 天
- C.15 天

D.30 天

E.45 天

答案：E

解析：此题暂无解析

69.(A1/A2 型题)构成医疗事故的主观方面，包括以下哪项

A.技术水平欠缺的技术过失

B.违反卫生法规和诊疗护理规范.常规的责任过失

C.违反操作规程的故意

D.疏忽大意的过失

E.过于自信的过失

答案：B

解析：医疗事故，是指医疗机构及其医务人员在医疗活动中，违反医疗卫生管理法律.行政法规.部门规章和诊疗护理规范.常规，过失造成患者人身损害的事故。医疗事故的主观过错表现为行为人在诊疗护理中的过失。过失是医疗单位承担医疗事故赔偿责任的主观要素。它是以医疗单位对病员的生命健康权应尽到的注意义务为前提的。在传统民法中，过失分成疏忽大意的过失和过于自信的过失。医疗过失只包括过失，不包括故意。

70.(A1/A2 型题)《医疗事故处理条例》规定，残疾生活补助费应根据伤残等级，自定残之月起最长赔偿

A.5 年

B.10 年

C.15 年

D.20 年

E.30 年

答案：E

解析：此题暂无解析

71.(A1/A2 型题)下列病历资料患者无权复印的是

A.门诊病历

B.住院志

C.体温单

D.医嘱单

E.死亡病例讨论记录

答案：E

解析：患者有权复印或者复制其门诊病历.住院志.体温单.医嘱单.化验单（检验报告）.医学影像检查资料.特殊检查同意书.手术同意书.手术及麻醉记录单.病理资料.护理记录以及国务院卫生行政部门规定的其他病历资料。《医疗事故处理条例》规定，发生医疗事故争议时，死亡病例讨论记录.疑难病例讨论记录.上级医师查房记录.会诊意见.病程记录应当在医患双方在场的情况下封存和启封。这些是无权复印的，故选 E。

72.(A1/A2 型题)青年李某，右下腹疼痛难忍，到医院就诊。经医师检查.检验，当即诊断为急性阑尾炎，遂对其施行阑尾切除术。手术情况正常，但拆线时发现伤口愈合欠佳，有淡黄色液体渗出。手术医师告知，此系缝合切口的羊肠线不为李某的组织吸收所致，在临床中少见。

经过近 1 个月的继续治疗，李某获得痊愈。根据《医疗事故处理条例》规定，李某被拖延近 1 个月后才得以痊愈这一客观后果，应当属于

- A.在现有的医学科技条件下发生无法预料或不能防范
- B.三级医疗事故
- C.四级医疗事故
- D.因患者体质特殊而发生的医疗意外
- E.因不可抗力而造成的不良后果

答案：D

解析：不属于医疗事故的 6 种情况：①因患者病情异常或特殊体质而发生医疗意外的；②紧急情况下为抢救患者生命而实施的医疗措施造成不良后果的；③在现有的医学科技条件下发生无法预料或不能防范的不良后果的；④无过错输血感染造成不良后果的；⑤因患者原因延误诊疗造成不良后果的；⑥不可抗拒因素造成不良后果的。本题属于第一种，患者因特殊体质，不能吸收而发生愈合欠佳。

73.(A1/A2 型题)下列哪项不属于乡村医生在执业活动中享有的权利

- A.出具相应的医学证明
- B.参加专业学术团体
- C.参加业务培训和教育
- D.获取报酬
- E.树立敬业精神

答案：E

解析：E 项属于乡村医生在执业活动中履行的义务，故选 E。《乡村医生从业管理条例》规定，乡村医生在执业活动中享有下列权利：①进行一般医学处置，出具相应的医学证明；②参与医学经验交流，参加专业学术团体；③参加业务培训和教育；④在执业活动中，人格尊严、人身安全不受侵犯；⑤获取报酬；⑥对当地的预防、保健、医疗工作和卫生行政主管部门的工作提出意见和建议。

74.(A1/A2 型题)处方开具当日有效，特殊情况下需延长有效期，经处方医师在“诊断”栏注明有效期限的不得超过多少天

- A.1
- B.2
- C.3
- D.4
- E.5

答案：C

解析：此题暂无解析

75.(A1/A2 型题)对于盐酸哌替啶处方为 () 常用量，仅限于 () 内使用

- A.一次，医院
- B.一天，医院
- C.一次，医疗机构
- D.一天，医疗机构
- E.二次，医疗机构

答案：C

解析：此题暂无解析

76.(A1/A2 型题) () 所开具的处方须经所在执业地点执业医师签字或加盖专用签章后有效的

- A. 执业医师
- B. 执业助理医师
- C. 实习医师
- D. 见习医师
- E. 进修医师

答案：B

解析：《处方管理办法》第八条：经注册的执业医师在执业地点取得相应的处方权。经注册的执业助理医师在医疗机构开具的处方，应当经所在执业地点执业医师签名或加盖专用签章后方有效。

77.(A1/A2 型题) 医师开具处方时，除特殊情况外必须注明的是

- A. 患者体重
- B. 药品的拉丁文
- C. 处方药或非处方药
- D. 临床诊断
- E. 患者是否为过敏体质

答案：D

解析：◆ 医师开具处方时，除特殊情况外必须注明的是临床诊断。故本题选择 D。

78.(A1/A2 型题) 处方开具当日有效。特殊情况下可以延长有效期。但有效期最长不得超过

- A. 2 天
- B. 3 天
- C. 5 天
- D. 7 天
- E. 10 天

答案：B

解析：此题暂无解析

79.(A1/A2 型题) 主治医师邱某经过抗菌药物临床应用知识和规范化管理培训并考核合格后，被授予限制使用级抗菌药物处方权。但不久，邱某因违反《抗菌药物临床应用管理办法》的相关规定，受到医院警告并限制其上述处方权。医院处理邱某的依据是

- A. 多次使用非限制使用级抗菌药物
- B. 使用价格相对较高的抗菌药
- C. 在紧急情况下越级使用抗菌药物
- D. 无正当理由开具抗菌药物超常处方 3 次以上
- E. 在门诊使用限制使用级抗菌药物

答案：D

解析：根据《抗菌药物临床应用管理办法》第四十五条：医疗机构应当对出现抗菌药物超常处方 3 次以上且无正当理由的医师提出警告，限制其特殊使用级和限制使用级抗菌药物处方权。

80.(A1/A2 型题)以下属于假药的是

- A.以非药品冒充药物
- B.未标明有效期
- C.更改有效期
- D.更改生产批号
- E.擅自添加着色剂

答案：A

解析：假药:成分不符；非药品冒充药品；禁药；未批准（生产.进口.无批号）；变质.污染；超范围。

81.(A1/A2 型题)某县药品监督管理部门接到某药店将保健食品作为药品出售给患者的举报后，立即对该药店进行了查处，并依照《药品管理法》的规定，将其销售给患者的保健食品认定为

- A.按假药论处的药
- B.假药
- C.食品
- D.劣药
- E.按劣药论处的药

答案：B

解析：假药是指药品所含成分与国家药品标准规定的成分不符，以及非药品冒充药品以他种药品冒充此药品的。有下列情形之一的药品，按假药论处:①国务院药品监督管理部门规定禁止使用的；②依照《药品管理法》必须批准而未经批准生产、进口，或者必须检验而未检验即销售的；③变质的；④被污染的；⑤使用依据《药品管理法》必须取得批准文号而未取得批准文号的原料药生产的；⑥所标明的适应证或者功能主治超出规定范围的。保健食品不可能合法取得药品批准文号，故属于假药，答案选 B。

82.(A1/A2 型题)《人口与计划生育法》规定，计划生育技术服务机构和从事计划生育技术服务的医疗.保健机构应当开展如下工作，除了

- A.人口与计划生育基础知识宣传教育
- B.对已婚妇女开展孕情检查
- C.计划生育
- D.生殖保健的咨询
- E.非医学需要的胎儿性别鉴定

答案：E

解析：《人口与计划生育法》规定，计划生育技术服务机构和从事计划生育技术服务的医疗.保健机构应当在各自的职责范围内，针对育龄人群开展人口与计划生育基础知识宣传教育，对已婚育龄妇女开展孕情检查.随访服务工作，承担计划生育.生殖保健的咨询.指导和技术服务。

83.(A1/A2 型题)中医诊所被责令停止执业活动的，其直接负责的主管人员自处罚决定作出之日起多久不得在医疗机构内从事管理工作。

- A.1 年内
- B.3 年内

- C.5年内
- D.10年内
- E.终身

答案：C

解析：中医诊所被责令停止执业活动的，其直接负责的主管人员自处罚决定作出之日起五年内不得在医疗机构内从事管理工作。

84.(A1/A2 型题)为促进中医药事业的发展，对其保障措施中，以下哪项描述不正确

- A.医保支持
- B.经费支持
- C.文献保护
- D.西药保护
- E.中药材保护

答案：D

解析：对于保障中医药事业的发展，其保障措施不包括西药的管理和保护。

85.(A1/A2 型题)以下哪项是慢性病预防的关键环节

- A.早期排查
- B.早期诊断
- C.早期分化
- D.早期预防
- E.早期保健

答案：B

解析：早期诊断是慢性病预防的关键环节，基层遇到的大部分问题都处于早期未分化阶段，基层可以利用对居民个人及家庭的熟悉了解和健康管理等优势作出早期诊断，并负责连续照顾和处理。

86.(A1/A2 型题)对糖尿病患者进行早期治疗，属于

- A.群体预防
- B.预防期预防
- C.第三级预防
- D.第二级预防
- E.第一级预防

答案：D

解析：通过病例的筛查，早期发现，早期诊断，早期治疗，属于二级预防。

87.(A1/A2 型题)以下内容中不属于慢性非传染性疾病的是

- A.高血压
- B.糖尿病
- C.缺血性脑卒中
- D.消化性溃疡
- E.恶性肿瘤

答案：D

解析：慢性非传染性疾病主要包括以生活方式、环境危险因素为主引起的肿瘤、心脑血管疾病。

糖尿病.慢性阻塞性肺疾患.脑卒中等为代表的一组疾病。

88.(A1/A2 型题)当前,影响人类健康的最主要因素是

- A.行为生活方式
- B.环境因素
- C.医疗保健服务
- D.生物学因素
- E.心理因素

答案: A

解析: 此题暂无解析

89.(A1/A2 型题)对吸烟人群进行肺癌筛查属于

- A.一级预防
- B.二级预防
- C.三级预防
- D.一级.二级预防均可
- E.二级.三级预防均可

答案: B

解析: 二级预防指的是早期发现.早期诊断和早期治疗,防患于开端。常用的二级预防方法有筛检普?怨?

90.(A1/A2 型题)现阶段,正在实施的国家基本公共卫生服务项目有

- A.10 项
- B.12 项
- C.15 项
- D.17 项
- E.20 项

答案: B

解析: 现阶段,正在实施的国家基本公共卫生服务项目有 12 项,包括建立居民健康档案.健康教育.预防接种.儿童健康管理.孕产妇健康管理.老年人健康管理.高血压患者健康管理.2 型糖尿病患者健康管理.重性精神疾病(严重精神障碍)患者管理.结核病患者健康管理.传染病和突发公共卫生事件报告和处理.中医药健康管理.卫生监督协管。不包括 1 型糖尿病健康管理。

91.(A1/A2 型题)以下哪一项不是中医药预防与养生保健的主要服务方式

- A.针灸养生.推拿按摩及经络养生
- B.四季养生
- C.食疗与药膳
- D.冬病夏治.夏病冬治
- E.五禽戏.八段锦.太极拳及气功导引

答案: B

解析: 中医药预防与养生保健的主要服务方式:①针灸养生.推拿按摩及经络养生;②四时养生;③食疗与药膳;④冬病夏治.夏病冬治;⑤五禽戏.八段锦.太极拳及气功导引等。

92.(A1/A2 型题)在统计学中, 定量指标是指

- A.等级资料
- B.计数资料
- C.定性指标
- D.数值变量
- E.定性因素

答案: D

解析: 定量指标又叫数值变量, 其特征是连续的, 通常有衡量单位

93.(A1/A2 型题)统计工作的步骤包括, 除了

- A.搜集资料
- B.统计设计
- C.分析资料
- D.整理资料
- E.得出结论

答案: E

解析: 此题暂无解析

94.(A1/A2 型题)某研究所欲将某校 132 名高级知识分子的血清胆固醇情况, 测定出的数值变量资料称为

- A.计量资料
- B.计数资料
- C.等级资料
- D.研究数据
- E.一般资料

答案: A

解析: 数值变量资料叫计量资料, 所以选 A。某医生开展一项科研工作, 按统计工作步骤进行。

95.(A1/A2 型题)分析资料包括

- A.对照.重复
- B.描述.推断
- C.随机.均衡
- D.计算.讨论
- E.归纳.整理

答案: B

解析: 此题暂无解析

96.(A1/A2 型题)若 X 值的均数等于 7, 标准差等于 2, 则 X+3 的均数

- A.也等于 7
- B.等于 9
- C.等于 10
- D.介于 7-3 与 7+3 之间
- E.介于 $7-1.96 \times 2$ 与 $7+1.96 \times 2$ 之间

答案：C

解析：若 x 值的均数等于 7，则 $x+3$ 的均数等于 10，所以答案选 C。

97.(A1/A2 型题)频数分布表的用途在于揭示资料的分布类型和描述数值资料的

- A.分布特征
- B.分布范围
- C.分布面积
- D.分布概率
- E.分布趋势

答案：A

解析：此题暂无解析

98.(A1/A2 型题)关于流行病学的定义最准确的是

- A.研究传染病在人群中的分布和影响分布的因素及制定预防对策的科学
- B.研究疾病在人群中分布的科学
- C.研究健康状态的分布及影响因素以便采取有效保健措施的科学
- D.研究非传染性疾病在人群中的分布和影响分布的因素以及预防对策的科学
- E.研究人群中疾病与相关健康状况的分布及其影响因素，并研究如何防治疾病及促进健康的策略和措施的学科

答案：E

解析：此题暂无解析

99.(A1/A2 型题)流行病学中对研究对象的有关条件进行了人为干预后比较的结果的方法是

- A.描述法
- B.观察法
- C.实验法
- D.分析法
- E.举例法

答案：C

解析：流行病学根据对研究条件是否进行控制，可分为观察法和实验法两大类。在观察法中，又分描述法和分析法，实验法是对研究对象的有关条件进行了人为干预后比较的结果。

100.(A1/A2 型题)某地区在 1 个月内对居民进行了是否有糖尿病的普查，可计算当地居民糖尿病的

- A.二代发病率
- B.死亡率
- C.罹患率
- D.患病率
- E.发病率

答案：D

解析：普查=患病率指标。

101.(A1/A2 型题)疾病的三间分布是指

- A.年龄.性别和种族分布

- B.职业.家庭和环境分布
- C.时间.地区和人群分布
- D.短期波动.季节性和周期性分布
- E.国家.地区和城乡分布

答案：C

解析：疾病的三间分布是流行病学研究的重要内容，是描述性研究的核心，是分析性研究的基础，是制定疾病防制策略和措施的依据，分为时间分布.地区分布和人群分布。二.

102.(A1/A2 型题)对全国儿童的死亡监测，主要针对几岁以下的儿童

- A.5 岁
- B.3 岁
- C.7 岁
- D.10 岁
- E.12 岁

答案：A

解析：死因监测目的是了解人群死亡率和死因分布，反映人群健康水平，确定不同时期主要死因及疾病防治重点，如全国的孕产妇和 5 岁以下儿童的死亡监测。

103.(A1/A2 型题)张某，56 岁，男，平时脾气暴躁，常常因为别人的微小失误或无心得罪而大发雷霆，经常匆忙打断别人的讲话，并且语言带有明显的敌意。张某的行为从致病性行为模式上来说，容易引发

- A.胃癌
- B.冠心病
- C.肠炎
- D.胃溃疡
- E.甲亢

答案：B

解析：此题暂无解析

104.(A1/A2 型题)王某的女儿今年 3 岁，在女儿出生后，她就带女儿到某三甲医院儿童保健科为女儿建立保健档案，并定期体检身体。王某的行为属于

- A.日常健康行为
- B.避开有害环境行为
- C.戒除不良嗜好行为
- D.预警行为
- E.保健行为促进健康行为包括：

答案：E

解析：1.避开有害健康行为指避免暴露于自然环境和社会环境中有害健康的危险因素，如离开污染环境、积极应对各种紧张生活事件，案例中小王的行为就属于后者。2.老王的戒烟、戒酒行为在促进健康行为中属于自觉抵制、戒除不良嗜好的行为。3.王某为女儿建立保健档案，是有效、合理利用卫生资源，维护自身健康的行为，这在健康促进行为中属于保健行为。

105.(A1/A2 型题)健康的四大基石不包括

- A.合理膳食

- B. 适量运动
- C. 戒烟和限制饮酒
- D. 心理平衡
- E. 适宜环境

答案：E

解析：此题暂无解析

106.(A1/A2 型题)下列行为属于日常健康行为的是

- A. 平衡膳食
- B. 戒烟
- C. 预防接种
- D. 开车系安全带
- E. 定期体检

答案：A

解析：此题暂无解析

107.(A1/A2 型题)根据中国人体重指数 (BMI) 的标准, BMI 在 18.5~23.9 范围者为

- A. 轻度肥胖
- B. 消瘦
- C. 肥胖
- D. 超重
- E. 正常体重

答案：E

解析：根据中国人体重指数 (BMI) 的标准, BMI 在 18.5~23.9kg/m² 范围者为正常体重; >24kg/m² 者为超重; >28kg/m² 者为肥胖。

108.(A1/A2 型题)纸烟烟雾中含有多少种已知的化学物质

- A. 1000
- B. 1500
- C. 2600
- D. 3800
- E. 3900

答案：D

解析：纸烟烟雾中含有 3800 多种已知的化学物质, 主要有害成分包括尼古丁、焦油、潜在性致癌物、一氧化碳和烟尘。

109.(A1/A2 型题)下列不是健康教育服务管理的服务内容的是

- A. 提供健康教育资料
- B. 设置健康教育宣传栏
- C. 开展公众健康咨询活动
- D. 举办健康体育活动
- E. 开展个体化健康教育

答案：D

解析：此题暂无解析

110.(A1/A2 型题)每个乡镇卫生院每年至少开展几次公众健康咨询活动

- A.3 次
- B.6 次
- C.9 次
- D.5 次
- E.8 次

答案: C

解析: 每个乡镇卫生院每年至少开展 9 次公众健康咨询活动。

111.(A1/A2 型题)关于传染的概念, 下列哪项是错误的

- A.传染也称感染
- B.感染病原体后是否发病, 主要取决于病原体的特性
- C.感染病原体后是否发病, 主要取决于人体的抗病能力
- D.传染病是传染或感染过程中的表现形式之一, 感染病原体后不一定都发病
- E.构成传染过程必需具备病原体, 人体及环境三个因素

答案: B

解析: 感染病原体后是否发病, 主要取决于人体的抗病能力。

112.(A1/A2 型题)影响和制约疾病流行的两因素指的是

- A.自然因素.气候因素
- B.气候因素.地理因素
- C.地理因素.社会因素
- D.社会因素.气候因素
- E.自然因素.社会因素

答案: E

解析: 传染源.传播途径和易感者是传染病流行的三个基本环节, 任何一个环节的变化都可能影响传染病的流行和消长。然而, 三个环节中的每一个环节本身以及它们之间的连接都受到自然因素和社会因素的影响和制约。

113.(A1/A2 型题)流行过程是指下列哪项从感染者体内排出, 经过一定的传播途径, 侵入易感者机体而形成的新感染, 并不断发生.发展的过程

- A.病原体
- B.细菌
- C.病毒
- D.传染源
- E.微生物

答案: A

解析: 流行过程是指传染病在人群中发生.蔓延的过程, 即病原体从感染者体内排出, 经过一定的传播途径, 侵入易感者机体而形成的新感染, 并不断发生.发展的过程。二.

114.(A1/A2 型题)责任报告单位或责任报告人发现丙类传染病病人时, 要求报告的时限为

- A.2 小时
- B.6 小时

- C.8 小时
- D.12 小时
- E.24 小时

答案：E

解析：此题暂无解析

115.(A1/A2 型题)下列关于传染病和突发公共卫生事件的处理，叙述有误的是

- A.按照有关规范要求，对突发公共卫生事件伤者进行急救，及时转诊，书写医学记录及其他有关资料并妥善保管
- B.协助上级专业防治机构做好乙肝和性病患者的宣传、指导服务以及非住院病人的治疗管理工作
- C.协助开展传染病接触者或其他健康危害暴露人员的追踪、查找，对集中或居家医学观察者及时转诊
- D.协助对本辖区病人、疑似病人和突发公共卫生事件开展流行病学调查，收集和提供病人、密切接触者、其他健康危害暴露人员的相关信息
- E.做好医疗机构内现场控制、消毒隔离、个人防护、医疗垃圾和污水的处理工作

答案：C

解析：此题暂无解析

116.(A1/A2 型题)每种疫苗基础免疫的次数和剂量是不同的，完成接种的年龄下线是

- A.3 月龄
- B.6 月龄
- C.12 月龄
- D.18 月龄
- E.24 月龄

答案：C

解析：每种疫苗基础免疫的次数和剂量是不同的，应在 12 月龄内完成。

117.(A1/A2 型题)1 岁以后儿童完成计划免疫复种的第一个疫苗是

- A.乙脑疫苗
- B.百白破疫苗
- C.乙肝疫苗
- D.麻疹疫苗
- E.卡介苗

答案：B

解析：百白破三联疫苗由百日咳疫苗、精制白喉类毒素及精制破伤风类毒素用氢氧化铝吸附制成。免疫成功可以预防百日咳、白喉、破伤风。百白破从母体获得被动抗体，出生后几个月开始逐渐消失。现行免疫程序规定：新生儿出生满 3 个月开始接种百白破疫苗第一次，连续接种三次，每次间隔不少于 28 天，28~60 天，1.5~2 岁加强一次。6 岁加强注射精制百白破疫苗 1 次。

118.(A1/A2 型题)近期注射过以下哪种疫苗的小儿，3 个月内不能接种麻疹疫苗、乙脑疫苗、脊髓灰质炎疫苗等

- A.卡介苗

- B.多价免疫球蛋白
- C.甲肝疫苗
- D.百白破三联疫苗
- E.流脑 A 群多糖疫苗

答案： B

解析： 此题暂无解析

119.(A1/A2 型题)不宜进行预防接种的情况不包括

- A.癫痫
- B.严重腹泻
- C.严重营养不良
- D.轻度低热
- E.有脑炎后遗症

答案： D

解析： 此题暂无解析

120.(A1/A2 型题)建档是指完成个人基本信息表和

- A.健康档案封面
- B.健康体检
- C.健康评价
- D.发放医疗保健卡
- E.随访记录

答案： A

解析： 此题暂无解析

121.(A1/A2 型题)居民健康档案的编码制位数是

- A.10
- B.15
- C.16
- D.17
- E.18

答案： D

解析： 此题暂无解析

122.(A1/A2 型题)统一为居民健康档案进行编码,以国家统_的行政区划编码为基础,以村(居)委会为单位,编制居民健康档案唯一编码,采用

- A.11 位编码制
- B.13 位编码制
- C.15 位编码制
- D.17 位编码制
- E.20 位编码制

答案： D

解析： 统一为居民健康档案进行编码,采用 17 位编码制,以国家统一的行政区划编码为基础,以村(居)委会为单位 9 编制居民健康档案唯一编码。同时将建档居民的身份证号作为

身份识别码，为在信息平台上实现资源共享奠定基础。

123.(A1/A2 型题)女婴，5 个月，母乳喂养，为保证营养摄取，护士对家长进行辅食添加的健康指导，正确的是

- A.由少到多
- B.由粗到细
- C.由多种到一种
- D.由多到少
- E.由稠到稀

答案：A

解析：婴儿因消化功能尚欠成熟，添加辅食应由少到多，故 A 正确，其他说法均错误。

124.(A1/A2 型题)新生儿首次家庭访视的时间是

- A.接到出生信息后 1 周内
- B.新生儿出生后 1 周内
- C.新生儿出院后 1 周内
- D.新生儿出院后 2 周内
- E.新生儿出生后 2 周内

答案：C

解析：此题暂无解析

125.(A1/A2 型题)婴幼儿健康管理中的健康检查内容不包括

- A.询问.身高体重和头围等体格测量
- B.体格检查
- C.心理行为发育监测
- D.疫苗接种
- E.实验室及其他检查

答案：D

解析：婴幼儿健康管理中的健康检查内容包括:询问.身高体重和头围等体格测量.体格检查.心理行为发育监测.实验室及其他检查等。

126.(A1/A2 型题)头围达到 54~58cm，基本同成人的年龄是

- A.14 岁
- B.8 岁
- C.10 岁
- D.12 岁
- E.15 岁

答案：E

解析：出生时平均身高为 50cm，生后第 1 年增长最快，1 岁时可达 75cm，2 岁时可达 85cm。2 岁以内测量头围最有监测价值，连续测量更为重要，其受双亲头围大小的影响。出生时平均 33~34cm，1 岁时 46cm，2 岁时 48cm，15 岁时 54~58cm，基本同成人。

127.(A1/A2 型题)正常 2 岁小儿的头围大约是

- A.46cm

- B.48cm
- C.52cm
- D.44cm
- E.50cm

答案：B

解析：自眉弓上缘经枕骨结节绕头一周的长度，是反映颅骨生长和脑发育的一个重要指标。2岁以内测量头围最有监测价值，连续测量更为重要，其受双亲头围大小的影响。出生时平均33~34cm，1岁时46cm，2岁时48cm，15岁时54~58cm，基本同成人。

128.(A1/A2型题)下列哪种进食习惯易发生营养性巨幼细胞性贫血

- A.爱吃动物性食物.内脏.瘦肉.蛋类
- B.常吃新鲜瓜果.蔬菜
- C.常吃富含维生素C的食物
- D.长期用煮沸的牛奶.奶粉
- E.增加叶酸的摄入

答案：D

解析：营养性巨幼细胞性贫血主要是叶酸和维生素B12摄入不足和吸收不良引起的。营养性巨幼细胞性贫血的病人的饮食调摄极为重要。包括：①改变不良的饮食习惯：不偏食，不挑食，不长期素食，从食物中摄取叶酸和维生素B12。②注意补充叶酸和维生素B12：多吃新鲜蔬菜，以增加叶酸的摄入量。同时多吃含蛋白丰富的食物，保证营养平衡。含叶酸丰富的蔬菜，如菠菜、油菜、小白菜、西红柿、花生仁、酵母发面食品、豆类及其制品以及动物的肝肾等。多吃含维生素B12的食物，如动物的肝、肾和肉类、蛋黄、牛乳、面粉等。③改善烹调技术：叶酸极易被高温破坏，故烹调时不宜高温和时间过长。若在食物中加入维生素C，可促进叶酸吸收；加入钙片，可促进维生素B12吸收。④禁忌饮酒：慢性酒精中毒的病人，多数伴有叶酸缺乏。因此，巨幼细胞性贫血的病人不应饮酒。

129.(A1/A2型题)儿童溺水后多久神经系统便遭受不可逆的损伤

- A.2~3min
- B.4~6min
- C.6~8min
- D.8~10min
- E.10~15min

答案：B

解析：此题暂无解析

130.(A1/A2型题)家长带5个月的婴儿进行营养咨询，医生提出以下各项辅助食品，你认为在该月龄应该添加哪一项为最合适

- A.菜汤.鱼肝油
- B.米糊.蛋黄
- C.粥饼干
- D.软饭.肉糜
- E.蛋炒饭.苹果

答案：B

解析：食物转换月龄建议引入泥糊状食物的起始月龄为6月龄，不早于4月龄。婴儿每次摄

入奶量稳定（约 180ml/次），生长发育良好，均提示婴儿已具备接受其他食物的消化能力。第一阶段应首先选择能满足生长需要、易于吸收、不易产生过敏的谷类食物，最好为强化铁的米粉，米粉可用奶液调配；其次引入的食物是根茎类蔬菜、水果，主要目的是训练婴儿的味觉。食物应用勺喂养，帮助训练吞咽功能。

131.(A1/A2 型题)中度贫血的血红蛋白浓度是

- A.<30g/L
- B.<40g/L
- C.30~59g/L
- D.60~89g/L
- E.90~120g/L

答案：D

解析：常规或血红蛋白(Hb)检测为Hb值降低：6月龄至6岁<110g/L。Hb值90~109g/L为轻度贫血，60~89g/L为中度贫血，<60g/L为重度贫血，<30g/L为极重度贫血。由于海拔高度对Hb值的影响，海拔每升高1000m，Hb上升约4%。

132.(A1/A2 型题)满月后婴幼儿健康管理应进行几次

- A.3次
- B.5次
- C.8次
- D.10次
- E.12次

答案：C

解析：此题暂无解析

133.(A1/A2 型题)孕妇应进行适量的运动，维持体重的适宜增长，每天进行不少于（）的中等强度的身体活动

- A.10分钟
- B.30分钟
- C.40分钟
- D.60分钟
- E.90分钟

答案：B

解析：此题暂无解析

134.(A1/A2 型题)第1次产前检查服务记录表的“个人史”项中，询问内容是

- A.剖宫产史
- B.高血压病史
- C.自然流产史
- D.遗传性疾病史
- E.服用药物史

答案：E

解析：此题暂无解析

135.(A1/A2 型题)初孕妇自觉胎动,多数开始于

- A.妊娠 13~14 周
- B.妊娠 15~17 周
- C.妊娠 17~19 周
- D.妊娠 21~23 周
- E.妊娠 24~26 周

答案: C

解析: 妊娠 17~19 周孕妇可开始感到胎动,时间因孕妇的个人感觉敏感度不同而略有差异。有时在腹部检查时可以看到或触到胎动。

136.(A1/A2 型题)关于正常妊娠,于 12 周末时手测宫底高度是

- A.双合诊才能够触及
- B.下腹部不能触及
- C.脐耻之间
- D.耻骨联合上 2~3 横指
- E.耻骨联合上刚能触及

答案: D

解析: 产科检查时,通过手测子宫底高度或者尺测耻骨上子宫底高度可以估计胎儿大小及孕周,12 周末时宫底高度为耻骨联合上 2~3 横指。

137.(A1/A2 型题)孕妇分娩出院后,社区医院进行产后访视的次数至少应为

- A.1 次
- B.2 次
- C.3 次
- D.4 次
- E.5 次

答案: B

解析: 产后访视:孕产妇出院后,立即将《孕产妇保健手册》交回原领取手册医院,医院接到手册后对孕产妇进行产后访视。访视次数:城市 28 天内至少访视 3 次,故选 C。本章不作为考试重点章节,考生只要掌握生育期保健即可,其他统计指标了解即可。本章考题简单,只做一般了解。

138.(A1/A2 型题)产后出血的主要原因不包括

- A.胎膜早破,宫内感染
- B.胎盘因素
- C.软产道裂伤
- D.子宫收缩乏力
- E.凝血功能障碍

答案: A

解析: 生产后,子宫胎盘血液循环终止且子宫缩复,大量血液从子宫涌入产妇产体循环,加之妊娠期滞留的组织间液回吸收,产后 72 小时内,产妇循环血量增加 15%~25%。同时,产褥早期血液仍处于高凝状态,有利于胎盘剥离创面形成血栓,减少产后出血量。产后出血的主要原因包括子宫收缩乏力.胎盘因素.软产道裂伤和凝血功能障碍。二.

139.(A1/A2 型题)下列对老年人健康指导的内容叙述有误的是

- A.告知健康体检结果并进行相应健康指导
- B.对发现已确诊的原发性高血压和 2 型糖尿病等患者纳入相应的慢性病患者健康管理
- C.对体检中发现有异常的老年人建议到上级医院确诊
- D.进行健康生活方式以及疫苗接种.骨质疏松预防.防跌倒措施.意外伤害预防和自救等健康指导
- E.告知或预约下一次健康管理服务的时间

答案：C

解析：此题暂无解析

140.(A1/A2 型题)对连续两次出现血压控制不满意的患者，正确的处理是

- A.增加药物剂量，预约进行下一次随访
- B.建议其转诊到上级医院，2 周内随访
- C.更换不同类的降压药物，2 周内随访
- D.更换不同类的降压药物，4 周内随访
- E.建议其转诊到上级医院，4 周内随访

答案：B

解析：此题暂无解析

141.(A1/A2 型题)对于紧急转诊的高血压患者，主动随访转诊情况的时间是

- A.1 周内
- B.2 周内
- C.3 周内
- D.4 周内
- E.2 个月内

答案：B

解析：此题暂无解析

142.(A1/A2 型题)2 型糖尿病患者常见的危急情况不包括

- A.持续性心动过速（心率超过 100 次/分）
- B.体温超过 39℃
- C.视力突然骤降
- D.血糖 $\geq 14.7\text{mmol/L}$ 或 $\leq 3.9\text{mmol/L}$
- E.收缩压 $\geq 180\text{mmHg}$

答案：D

解析：此题暂无解析

143.(A1/A2 型题)关于 2 型糖尿病分类干预说法正确的是

- A.第一次出现血糖控制不满意，出现药物不良反应的患者，预约下一次随访时间
- B.对血糖控制满意.无药物不良反应.无新发并发症或原有并发症无加重者，预约下一次
- C.原并发症加重者，两周内随访
- D.连续 2 次出现空腹血糖控制不满意.药物不良反应难以控制者，转诊上级医院不必随访
- E.新的并发症出现者，2 周内随访

答案：B

解析：对血糖控制满意.无药物不良反应.无新发并发症或原有并发症无加重者，预约下一次随访时间；第一次出现血糖控制不满意，出现药物不良反应者，2周内随访；连续2次出现空腹血糖控制不满意.药物不良反应难以控制.新的并发症.原并发症加重者，转诊上级医院并2周内随访。

144.(A1/A2型题)“肺结核患者规则服药率”指标中，“规则服药”是指

- A.在整个疗程中，患者在规定的服药时间全部服药
- B.在整个疗程中，患者在规定的服药时间实际服药次数占应服药次数的90%以上
- C.在整个疗程中，患者在规定的服药时间实际服药次数占应服药次数的80%以上
- D.在两次随访期间，患者在规定的服药时间实际服药次数占应服药次数的90%以上
- E.在治疗过程中，患者在规定的服药时间实际服药次数占应服药次数的80%以上

答案：B

解析：此题暂无解析

145.(A1/A2型题)按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，对肺结核患者健康管理的服务内容，以下不正确的是

- A.对肺结核可疑症状者，推介转诊后，1周内进行电话随访
- B.对肺结核患者的督导服药人员优先是医务人员，也可以是患者家属
- C.基层医疗卫生机构接到上级专业机构管理肺结核患者的通知单后，要在48小时内访视患者
- D.对于由医务人员督导的患者，医务人员至少每月记录1次对方评估结果
- E.当患者停止抗结核治疗后，应转诊至结核病定点医疗机构进行结案评估

答案：C

解析：此题暂无解析

146.(A1/A2型题)1名严重精神障碍患者在家里吵闹，砸烂了家具，动手将父亲的额头打出血，劝说无效。对该患者危险性评估是

- A.1级
- B.2级
- C.3级
- D.4级
- E.5级

答案：D

解析：此题暂无解析

147.(A1/A2型题)关于严重精神障碍的相关说法，下列错误的是

- A.严重精神障碍是指疾病症状严重，导致患者社会适应等功能严重损害.对自身健康状况或者客观现实不能完整认识，或者不能处理自身事务的精神障碍
- B.精神发育迟滞不伴发精神障碍属于严重精神障碍
- C.服务对象的诊断要由精神科执业医师做出
- D.诊断明确的患者才可纳入健康管理，疑似患者不是基本公共卫生健康管理的对象
- E.固定居所包括家庭，疗养院.养老院.护理院等康复与照料机构等，但不包括精神专科医院和综合医院

答案：B

解析：严重精神障碍的定义在不同情况下有所差异，《中华人民共和国精神卫生法》第八十三条规定为“疾病症状严重，导致患者社会适应等功能严重损害、对自身健康状况或者客观现实不能完整认识，或者不能处理自身事务的精神障碍”。强调要具有精神病性症状，因此要注意精神发育迟滞不伴发精神障碍不包括在内。服务对象的诊断要由精神科执业医师做出。诊断明确的患者才可纳入健康管理，疑似患者不是基本公共卫生健康管理的对象。服务对象应为辖区常住患者，即在本辖区内有固定居所，并且连续居住至少半年以上，不论是否具有辖区户籍。固定居所包括家庭，疗养院、养老院、护理院等康复与照料机构等，但不包括精神专科医院和综合医院。

148.(A1/A2 型题)常见表现为平素语音低弱，气短懒言，容易疲乏，精神不振，易出汗，舌淡红，舌边有齿痕，脉弱的是哪一种体质类型

- A.平和质
- B.气虚质
- C.阳虚质
- D.阴虚质
- E.痰湿质

答案：B

解析：气虚质（B型）总体特征：元气不足，以疲乏、气短、自汗等气虚表现为主要特征。形体特征：肌肉松软不实。常见表现：平素语音低弱，气短懒言，容易疲乏，精神不振，易出汗，舌淡红，舌边有齿痕，脉弱。发病倾向：易患感冒、内脏下垂等病；病后康复缓慢。对外界环境适应能力：不耐受风、寒、暑、湿邪。

149.(A1/A2 型题)老年人中医药健康管理服务内容包括

- A.建立健康档案、进行中医体质辨识
- B.进行健康体检、中医药健康指导
- C.建立健康档案、进行健康体检
- D.进行中医体质辨识、中医药保健指导
- E.进行健康体检、中医体质辨识

答案：D

解析：此题暂无解析

150.(A1/A2 型题)对儿童家长进行儿童中医药健康指导，在儿童多少月龄时给家长传授按揉迎香穴、足三里穴的方法

- A.3.6
- B.6.12
- C.12.18
- D.18.24
- E.24.30

答案：D

解析：此题暂无解析

151.(A1/A2 型题)中风的发病好发年龄为

- A.60 岁以上
- B.30 岁以上

- C.50 岁以上
- D.40 岁以上
- E.55 岁以上

答案：D

解析：中风的发病特点具有突然昏仆，不省人事，半身不遂，偏身麻木，口舌喎斜，言语蹇涩等特定的临床表现。轻证仅见眩晕，偏身麻木，口眼喎斜，半身不遂等；多急性起病，好发于 40 岁以上年龄。

152.(A1/A2 型题)食物中毒的技术处理总则中，关于对病人采取紧急处理，错误的是

- A.及时报告当地食品卫生监督机构
- B.停止食用中毒食品
- C.采取病人标本以备送检
- D.对病人进行急救治疗
- E.封存中毒食品或疑似中毒食品

答案：E

解析：“封存中毒食品或疑似中毒食品”属于对中毒食品控制处理的范畴。

153.(A1/A2 型题)某居室经检测空气中氡含量较高，空气氡最可能来自

- A.房屋地基土壤
- B.吸烟
- C.家用电器
- D.油漆.涂料
- E.燃料燃烧

答案：A

解析：此题暂无解析

154.(A1/A2 型题)引起肉毒中毒最多见的食品是

- A.肉制品
- B.鱼制品
- C.自制发酵食品
- D.豆制品
- E.罐头食品

答案：C

解析：引起中毒的食品，种类因地区和饮食习惯不同而异。国内以家庭自制植物性发酵品为多见，如臭豆腐.豆酱.面酱.豆豉等。在新疆察布查尔地区引起中毒的食品多为家庭自制谷类或豆类发酵食品，在青海主要为越冬密封保存的肉制品。在国外，大多也是由各类家庭自制制品引起。

155.(A1/A2 型题)蔬菜水果的主要卫生问题不包括

- A.细菌及寄生虫的污染
- B.农药污染
- C.工业废水中有机化学物质的污染
- D.霉菌及霉菌毒素污染
- E.其他有害物质如硝酸盐和亚硝酸盐的污染

答案：D

解析：蔬菜、水果的主要卫生问题：（1）细菌及寄生虫的污染。（2）有害化学物质对蔬菜、水果的污染：①农药污染；②工业废水；③其他有害物质：如蔬菜、水果在不恰当的存放、贮藏或腌制时，亚硝酸盐的量即可增加。

156.(A1/A2 型题)经过净化处理和加氯消毒后，供作生活饮用的水源水，总大肠菌群值不超过

- A.102 个/L
- B.103 个/L
- C.104 个/L
- D.105 个/L
- E.106 个/L

答案：C

解析：此题暂无解析

157.(A1/A2 型题)以下哪项是生物-心理-社会医学模式的特点

- A.理论和方法简单，易于掌握
- B.从系统理论看待人类生命
- C.着重识别疾病的病因
- D.依赖高技术的诊疗手段
- E.片面、封闭

答案：B

解析：此题暂无解析

158.(A1/A2 型题)以下哪一项是以病人为中心的医学模式的基本特点

- A.帮助病人建立正确的健康信念模型
- B.进入病人的世界
- C.提高病人的遵医行为
- D.以医生的眼光去看待疾病
- E.提高病人的自我服务能力

答案：B

解析：此题暂无解析

159.(A1/A2 型题)下列哪一项属于家庭外资源

- A.环境资源
- B.维护支持
- C.爱的支持
- D.信息和教育
- E.结构支持

答案：A

解析：家庭资源：可分为家庭内资源和家庭外资源。（1）家庭内资源包括：①经济支持：家庭对成员提供的各种金钱、财物的支持；②维护支持：家庭对其成员名誉、地位、权利和健康的维护和支持；③医疗处理：为家人提供及安排医疗照护；④爱的支持：家人对成员的关怀及精神支持，满足家人感情须要；⑤信息和教育：为家人提供医疗信息、建议及家庭内部的健康教

育；⑥结构支持:家庭住所或设施的改变,以适应患病成员需求。(2)家庭外资源包括:①社会资源:亲朋好友及社会团体的关怀与支持;②文化资源:文化.传统.习俗教育等方面的支持;③宗教资源:宗教信仰.宗教团体的支持;④经济资源:来自家庭之外的收入.赞助.保险.福利等;⑤教育资源:教育制度.方式.水平等;⑥环境资源:居住区环境.社区设施.公共环境等;⑦医疗资源:医疗保健机构.卫生保健制度及卫生服务的可及性和可用性。当家庭内资源不足或缺乏时,家庭医生应帮助病人及家庭寻找和利用家庭外资源。

160.(A1/A2 型题)在以家庭为单位的健康照顾中,家庭的功能不包括

- A.抚养和赡养
- B.家庭教育
- C.满足情感需要
- D.满足生殖和性需要
- E.经济功能

答案: B

解析:家庭的功能包括:抚养和赡养.满足情感需要.满足生殖和性需要.社会化.经济功能.赋予成员地位。二。

161.(A1/A2 型题)6岁男孩,发病第1天体温为37.5度,伴咽痛,未予治疗,第2天体温达41度,伴神志恍惚及抽搐。经输液,抗生素等治疗,第3天体温降至38.2度,其体温变化过程

- A.低热→超高热→中等热
- B.中等热→高热→中等热
- C.低热→高热→高热
- D.中等热→超高热→中等热
- E.低热→高热→中等热

答案: E

解析:此题暂无解析

162.(A1/A2 型题)发热最常见的原因是

- A.颅脑损伤
- B.变态反应
- C.无菌性坏死物质的吸收
- D.内分泌与代谢障碍
- E.感染

答案: E

解析:根据是否有感染,发热的病因常分为感染性和非感染性两大类,而以感染性更常见。

163.(A1/A2 型题)稽留热最常见于下列何种疾病

- A.肺结核
- B.大叶性肺炎
- C.急性肾盂肾炎
- D.疟疾
- E.肠炎

答案: B

解析：稽留热指体温恒定地维持在 39℃~40℃ 以上的高水平，达数天或数周，24 小时内体温波动范围不超过 1℃，常见于大叶性肺炎、斑疹伤寒及伤寒高热期。

164.(A1/A2 型题)患者男，食海鲜后 20 分钟，胸腹部皮肤出现局限性、暂时性、水肿性隆起的皮肤损害，大小不一，形状不定，呈淡红色，此皮损称

- A.风团
- B.丘疹
- C.抓痕
- D.苔藓样变
- E.萎缩

答案：A

解析：风团是真皮浅层水肿性、暂时性、局限性、隆起性损害，皮损可呈淡红色或苍白色，大小不一，形态不规则，周围有红晕，常突然发生，短时间内消退，消退后不留痕迹，自觉剧痒，最常见于荨麻疹。故选 A。

165.(A1/A2 型题)有关风团的描述错误的是

- A.风团是水肿性隆起的损害
- B.伴剧烈瘙痒
- C.消退后不留痕迹
- D.常突发，短时间内可消退
- E.风团又称风疹

答案：E

解析：此题暂无解析

166.(A1/A2 型题)下列属于继发性皮疹的是

- A.斑
- B.丘疹
- C.结节
- D.风团
- E.鳞屑

答案：E

解析：此题暂无解析

167.(A1/A2 型题)疥疮的好发部位是

- A.头颈部
- B.四肢
- C.掌跖
- D.指缝
- E.背部

答案：D

解析：指缝、外生殖器好发+夜间剧烈瘙痒+隧道和丘疱疹，提示疥疮。

168.(A1/A2 型题)糜烂与溃疡的区别是皮损的

- A.形态不同

- B.部位不同
- C.大小不同
- D.颜色不同
- E.深浅不同

答案：E

解析：此题暂无解析

169.(A1/A2 型题)急性渗出性湿疹忌用哪种剂型

- A.油剂
- B.粉剂
- C.软膏
- D.糊剂
- E.洗剂

答案：C

解析：皮疹急性期忌用软膏或有刺激性药物。故选 C。二.

170.(A1/A2 型题)肾性水肿易出现于

- A.眼睑.颜面
- B.胸腔.腹腔
- C.胫前.足踝
- D.背部.骶部
- E.阴囊.会阴

答案：A

解析：水肿首先发生在组织疏松的部位，如眼睑或颜面部.足踝部，以晨起为明显，严重时
可以涉及下肢及全身。肾性水肿的性质是软而易移动，临床上呈现凹陷性浮肿，即用手指按
压局部皮肤可出现凹陷。心源性水肿从足部等低垂部位开始，逐渐向上延及全身。故本题选
A。

171.(A1/A2 型题)局限性水肿常见于

- A.心力衰竭
- B.肝硬化
- C.肾病综合征
- D.局部静脉回流受阻
- E.血管神经性水肿

答案：D

解析：此题暂无解析

172.(A1/A2 型题)下列哪项可引起局部水肿

- A.右心衰竭
- B.丝虫病
- C.营养不良
- D.肾病综合征
- E.肝硬化

答案：B

解析：此题可用排除法，A 引起心源性水肿，C 引起营养不良性水肿，D 引起肾源性水肿，E 引起肝源性水肿，均属于全身性水肿。故选 B。

173.(A1/A2 型题)一全身性水肿患者，下列哪项原因可不予考虑

- A.心力衰竭
- B.肾衰竭
- C.晚期肝硬化
- D.甲状腺功能减退

答案：D

解析：此题暂无解析

174.(A1/A2 型题)下面关于呼吸困难的表述说法错误的是

- A.呼吸困难往往有呼吸频率、节律和幅度的改变
- B.COPD 后期出现劳力性呼吸困难
- C.混合型呼吸困难的发病机制为小气道狭窄和肺泡弹性回缩力下降
- D.心源性呼吸困难最常见的原因慢性充血性心力衰竭
- E.Falot 三联症患者常常蹲踞位以缓解呼吸困难

答案：C

解析：混合性呼吸困难的主要发生机制为气体交换面积减少、弥散功能下降等换气功能障碍。

175.(A1/A2 型题)女 65 岁，近 3 年来常于餐后平躺时出现胸骨后烧灼样疼痛，口服吗叮啉有效，最可能是

- A.心绞痛
- B.胸膜炎
- C.胃溃疡
- D.十二指肠溃疡
- E.反流性食管炎

答案：E

解析：此题暂无解析

176.(A1/A2 型题)胸痛多在休息时发生，活动时或转移其注意力可消失，最可能的诊断是

- A.急性心肌梗死
- B.急性心包炎
- C.胸膜炎
- D.心脏神经症
- E.心绞痛

答案：D

解析：此题暂无解析

177.(A1/A2 型题)餐后较久或数餐后呕吐，多见于

- A.幽门梗阻
- B.幽门管溃疡
- C.精神性呕吐
- D.胃张力下降

E.食物中毒

答案：A

解析：此题暂无解析

178.(A1/A2 型题)呕吐伴上腹部节律性.周期性痛可见于

A.肠钩虫病

B.肝硬化伴食管胃底静脉曲张

C.消化性溃疡

D.流行性出血热

E.遗传性毛细血管扩张症

答案：C

解析：此题暂无解析

179.(A1/A2 型题)对鉴别是否肾小球源性血尿最有意义的是

A.全程血尿

B.合并尿道刺激症

C.尿潜血阳性

D.肉眼血尿

E.变形红细胞血尿

答案：E

解析：肾小球源性血尿红细胞会变形破碎这是最有意义的鉴别方法。

180.(A1/A2 型题)患者，女，40岁，孕2产1，近半年偶有接触性出血。妇科检查:宫颈糜烂面积占宫颈面积1/2，子宫及双侧附件无异常发现。该患者进一步的检查是

A.宫颈刮片检查

B.阴道镜

C.宫腔镜

D.腹腔镜

E.诊断性宫颈锥切术

答案：A

解析：此题暂无解析

181.(A1/A2 型题)对增生性脊柱炎描述，错误的是

A.顽固性腰背痛，晨起更重

B.平卧可缓解疼痛

C.好发于50岁以上年龄

D.局部常有压痛

E.又称退行性脊柱炎

答案：D

解析：此题暂无解析

182.(A1/A2 型题)对结核性关节炎描述不正确的是

A.儿童与青壮年多见

B.不出现关节畸形

- C.伴有低热,盗汗
- D.负重大关节易受累
- E.有时有窦道形成

答案: B

解析: 结核性关节炎以儿童和青壮年多见。负重大,活动多,易受创伤的关节易患结核,其中脊柱最常见。早期症状和体征不明显。活动期常有疲劳,低热,盗汗及食欲下降。晚期关节畸形和功能障碍。如关节旁有窦道形成,常可见有干酪样物质流出。故选 B。二。

183.(A1/A2 型题)头痛伴癫痫见于

- A.偏头痛
- B.青光眼
- C.三叉神经痛
- D.神经功能性头痛
- E.脑内寄生虫病

答案: E

解析: 此题暂无解析

184.(A1/A2 型题)抽搐患者转诊前应检查下列哪项指标后立即转诊

- A.呼吸
- B.血压
- C.血糖
- D.脉率
- E.意识

答案: C

解析: 此题暂无解析

185.(A1/A2 型题)患者,女,38岁,近3年时有发作性眩晕,伴耳鸣,听力减退,恶心,呕吐及眼球震颤,每次发作持续3~5天,最可能的诊断是()。

- A.迷路炎
- B.前庭神经元炎
- C.梅尼埃病
- D.小脑肿瘤
- E.位置性晕厥

答案: C

解析: 梅尼埃病以发作性眩晕伴耳鸣,听力减退及眼球震颤为主要特点,严重时可伴有恶心,呕吐,面色苍白和出汗,发作多短暂,很少超过2周。具有复发性特点。故选 C。

186.(A1/A2 型题)眩晕伴听力减退最可能的病因是

- A.前庭神经元炎
- B.梅尼埃病
- C.高血压
- D.晕动症
- E.位置性眩晕

答案: B

解析：此题暂无解析

187.(A1/A2 型题)颈动脉窦综合征的特点是

- A.可伴有抽搐
- B.在体位骤变时发生晕厥
- C.晕厥于咳嗽时发生
- D.心率明显加快
- E.血压升高

答案：A

解析：颈动脉窦综合征可表现为发作性晕厥或伴有抽搐。故选 A。

188.(A1/A2 型题)接近于人事不省的意识状态,患者处于熟睡状态.不易唤醒,在强烈刺激下可被唤醒,但很快又再入睡,称为

- A.嗜睡
- B.意识模糊
- C.昏睡
- D.浅昏迷
- E.深昏迷

答案：C

解析：此题暂无解析

189.(A1/A2 型题)确定深昏迷最有价值的体征是

- A.全身深浅反射消失
- B.生命体征有改变
- C.呼之不应
- D.眼球固定
- E.对外界刺激无反应

答案：A

解析：此题暂无解析

190.(A1/A2 型题)失眠症患者最常见的主诉是

- A.入睡困难
- B.容易惊醒
- C.早醒
- D.白天想睡
- E.梦魇

答案：A

解析：此题暂无解析

191.(A1/A2 型题)有关 COPD 的外因,错误的是

- A.长期吸烟与慢支发生有密切关系
- B.发病与过敏因素无关
- C.理化因素的慢性刺激为诱因
- D.气候寒冷为发作的重要诱因

E.感染是慢支发生与发展的重要因素

答案：B

解析：COPD 是多种因素长期相互作用的结果：①有害气体和有害颗粒，如香烟、烟雾、粉尘、刺激性气体（二氧化硫、二氧化氮、氯气、臭氧等）；理化因素如刺激性烟雾、粉尘、大气污染的慢性刺激，可为慢支的诱发因素。②感染因素：病毒、支原体、细菌等感染是发生发展的重要原因之一。③免疫、年龄和气候等因素均与慢性支气管炎有关，寒冷空气有利于继发感染，老年人呼吸道容易反复感染。④过敏因素与慢支也有一定关系，喘息型慢性支气管炎患者往往有过敏史。

192.(A1/A2 型题)慢性阻塞性肺疾病最主要的病理生理特征是

- A.气道结构重塑
- B.肺泡通气量下降
- C.持续性气流受限
- D.明显的肺外效应
- E.肺泡弹性回缩力减退

答案：C

解析：慢性阻塞性肺疾病，简称慢阻肺，是以持续气流受限为特征的可以预防和治疗的疾病。

193.(A1/A2 型题)患者，男性，45 岁。春季反复呼吸困难、咳嗽伴喘息 5 年。实验检查示：嗜酸性粒细胞增多，血清 IgE 增高。患者最可能的问题是

- A.过敏性肺炎
- B.支气管哮喘
- C.慢性支气管炎
- D.风湿性心脏病
- E.支气管扩张

答案：B

解析：此题暂无解析

194.(A1/A2 型题)女，31 岁。反复发作性干咳伴胸闷 3 年，多于春季发作，无发热、咯血及夜间阵发性呼吸困难，多次胸片检查无异常，常用抗生素治疗效果不明显。无高血压病史。全身体检无阳性体征。为明确诊断首选的检查是

- A.胸部 CT
- B.心脏超声波
- C.支气管激发试验
- D.动脉血气分析
- E.纤维支气管镜

答案：C

解析：患者有反复发作的季节性干咳、胸闷病史，无胸部感染表现，抗生素无效，故应考虑支气管哮喘可能型。具备以下一项试验阳性对哮喘诊断具有重要意义：①若基础 FEV₁（或 PEF）<80%正常值，吸入β₂激动剂后 FEV₁（或 PEF）增加 15%以上。②PEF 变异率≥20%。③支气管激发试验（或运动激发试验）阳性。所以该患者首选支气管激发试验确定有无哮喘。故选 C。

195.(A1/A2 型题)在哮喘的药物治疗中，以何种为主导

- A.β受体激动剂
- B.糖皮质激素
- C.免疫抑制剂
- D.肥大细胞膜稳定剂
- E.茶碱类药物

答案：B

解析：此题暂无解析

196.(A1/A2 型题)支气管哮喘的主要临床表现是

- A.吸气性呼吸困难伴三凹征
- B.发作性呼吸困难伴窒息感
- C.反复发作带哮鸣音的呼气性呼吸困难
- D.带哮鸣音的混合性呼吸困难
- E.呼吸困难伴哮鸣音

答案：C

解析：此题暂无解析

197.(A1/A2 型题)关于支气管哮喘体征，下述哪项不正确

- A.发作时胸部呈过度充气状态
- B.有广泛的哮鸣音
- C.吸气音延长
- D.在轻度哮喘时哮鸣音可不出现
- E.严重哮喘时可出现奇脉

答案：C

解析：此题暂无解析

198.(A1/A2 型题)提示支气管哮喘患者病情危重的是

- A.呼气相延长
- B.脉压增加
- C.呼吸性碱中毒
- D.胸腹矛盾运动
- E.烦躁不安

答案：D

解析：此题暂无解析

199.(A1/A2 型题)支气管哮喘患儿长期控制治疗首选

- A.M 受体阻断剂吸入
- B.抗生素静脉滴注
- C.β₂ 受体激动剂吸入
- D.茶碱类（如氨茶碱）静脉滴注
- E.糖皮质激素吸入

答案：E

解析：吸入型糖皮质激素是哮喘长期控制的首选药物，也是目前最有效的抗炎药物，经激素吸入疗法能使哮喘得以缓解的患儿，应继续吸入维持量糖皮质激素，至少 6 个月~2 年或更

长时间。故本题应选 E。过关点睛:本题属于记忆性题,需记牢首选的糖皮质激素。

200.(A1/A2 型题)男性, 25 岁学生, 近 2 周来因“备考”较劳累后感觉乏力。今日突发寒颤.发热, 咳血 1 口而就诊。查体:T39℃, 右上肺可闻及少许湿??音。WBC10.8×10⁹/L, N0.85, 胸片见右上肺大片状浓淡不均.密度增高阴影。最可能的诊断是

- A.右上肺肺炎球菌肺炎
- B.右上肺干酪性肺炎
- C.右上肺支原体肺炎
- D.右上肺过敏性肺炎
- E.右上肺癌

答案: A

解析: 肺炎链球菌肺炎患者常有受凉淋雨.疲劳.醉酒.精神刺激.病毒感染史, 常有口角或鼻周单纯性疱疹。有败血症者, 皮肤和黏膜可有出血点。实变时有典型的体征, 如叩浊.语颤增强和支气管呼吸音。消散期可闻及湿??音。X 线片可见大片实变影。患者符合肺炎链球菌肺炎的临床表现, 所以本题选 A。

201.(A1/A2 型题)男, 65 岁。间断咳嗽.咳痰 5 年, 1 周来因发热.咳黄痰就诊。曾口服“感冒药”和“祛痰药”无明显效果。查体:T38.5℃, 口唇略发绀, 双下肺可闻及少量湿罗音。为明确诊断, 首选的检查是

- A.血气分析
- B.肺功能
- C.痰培养+药敏
- D.胸部 X 线片
- E.支气管镜

答案: D

解析: 此题暂无解析

202.(A1/A2 型题)男, 21 岁。畏寒.高热.咳嗽伴左胸痛 5 天, 查体:BP80/50mmHg, 心率 120 次/分, 胸部 X 线片见左肺下叶大片状致密影。实验室检查:血 WBC12.2×10⁹/L, N0.87, 该患者最可能感染的病原体是

- A.肺炎支原体
- B.肺炎链球菌
- C.军团菌
- D.金黄色葡萄球菌
- E.结核枝杆菌

答案: B

解析: 此题暂无解析

203.(A1/A2 型题)轻症.重症肺炎区别的重要依据是

- A.发热程度
- B.呼吸困难程度
- C.痰液性状
- D.除呼吸系统表现外有其他系统受累的表现
- E.肺部??音的位置

答案：D

解析：此题暂无解析

204.(A1/A2 型题)支气管肺炎患儿停用抗生素的时间是抗生素用至体温正常后

A.1~2 天

B.3~4 天

C.5~7 天

D.8~10 天

E.10~15 天

答案：C

解析：支气管肺炎抗生素一般用至体温正常后的 5~7 天，临床症状、体征消失后 3 天。葡萄球菌性肺炎易复发及产生并发症，体温正常后继续用药 2 周，总疗程 6 周。支原体肺炎至少用药 2~3 周。故本题选 C。

205.(A1/A2 型题)女，23 岁，工人。发热，干咳 1 个月，发病时胸部 X 线片示肺纹理增多，先后使用“青霉素”“头孢菌素”抗感染治疗半月余症状未见好转。查体：T39.8℃，消瘦，双侧颈部可触及多个成串小淋巴结，双肺未闻及干湿??音。PPD 试验（一）胸部 X 线片示双肺弥漫分布直径约 2mm 的小结节影，该患者最可能的诊断是

A.真菌性肺炎

B.病毒性肺炎

C.过敏性肺炎

D.急性粟粒性肺结核

E.细菌性肺炎

答案：D

解析：本例年轻女性，发热，干咳，消瘦，双侧颈部可触及多个成串小淋巴结，胸部 X 线片示双肺弥漫分布小结节影，使用“青霉素”“头孢菌素”无效，首先考虑为急性粟粒性肺结核。急性粟粒性肺结核起病急，持续高热，中毒症状严重，全身浅表淋巴结肿大，可见由肺尖至肺底的粟粒状结节阴影，直径 2mm 左右，检查 PPD 试验多为阴性，本例符合此诊断。细菌性肺炎一般使用青霉素及头孢菌素有效；其他各项胸部 X 线片均不出现小结节影。

206.(A1/A2 型题)男 30 岁，咳嗽 3 个月，偶有咳痰带血，乏力，体重下降，无发热，查体双侧颈淋巴结蚕豆大，稍硬，无触痛，右上肺少许湿??音，最可能的诊断是

A.肺癌

B.肺结核

C.肺炎

D.肺脓肿

E.支气管扩张

答案：B

解析：此题暂无解析

207.(A1/A2 型题)肺结核大咯血最主要的致死原因是

A.失血性休克

B.重度贫血

C.窒息

D.心力衰竭

E.呼吸衰竭

答案：C

解析：肺结核是咯血常见病因，其发生率占 20%~90%。当肺结核空洞腔内动脉瘤破裂时，则可引起大咯血，甚至因大咯血而窒息死亡。故选 C。

208.(A1/A2 型题)关于抗结核药物副作用下列哪条是错误的

A.异烟肼:肝功损害

B.利福平:肝功损害

C.吡嗪酰胺:肝功损害.肾功损害

D.链霉素:耳鸣耳聋

E.乙胺丁醇:视神经炎

答案：C

解析：此题暂无解析

209.(A1/A2 型题)男，25 岁。无诱因突发心悸 1 小时来诊。查体 BP130/80mmHg，心率 240 次/分，律齐。压迫颈动脉窦后心率突然降至 70 次/分，律齐。该患者最可能的诊断是

A.心动过缓-心动过速综合征

B.阵发性室上性心动过速

C.室性心动过速

D.心房扑动

E.窦性心动过速

答案：B

解析：此题暂无解析

210.(A1/A2 型题)心律失常最基本的症状是

A.心源性休克

B.气促

C.晕厥

D.心悸

E.急性肺水肿

答案：D

解析：心源性休克、晕厥是心律失常很严重的表现，急性肺水肿是左心衰竭的表现，气促是呼吸困难的表现，心律失常最基本的症状是心悸。故选 D。

211.(A1/A2 型题)阵发性室上性心动过速不伴有心力衰竭者首选

A.静脉滴注利多卡因

B.静脉注射维拉帕米

C.口服苯妥英钠

D.静脉滴注 10%氯化钾

E.口服美西律

答案：B

解析：阵发性室上性心动过速急性发作期，应根据患者的具体情况作出适当处理。如患者心功能和血压正常，可尝试刺激迷走神经的方法。药物治疗应选择钙拮抗剂，静脉注射维拉帕

米或地尔硫草。故选 B。洋地黄已较少应用，但对于伴有心功能不全患者仍作为首选。利多卡因用于室性心律失常。故不选 A。C 和 D 均不符。美西律为 I 类即钠通道阻滞药，主要用于急、慢性室性心律失常，故不选 E。过关键点：阵发性室上性心动过速并伴有心力衰竭时，应静脉注射维拉帕米或地尔硫草，疗效可达 90% 以上。

212.(A1/A2 型题)患者男，41 岁。近期出现头晕、乏力，连续 3 天血压 140~150/90~96mmHg。患者的血压属于

- A. 正常值
- B. 正常高值
- C. I 级高血压
- D. II 级高血压
- E. III 级高血压

答案：C

解析：此题暂无解析

213.(A1/A2 型题)男，45 岁。一年前发现血压 170/110mmHg，长期口服氨氯地平等药物治疗，2 个月前诊断为糖尿病，口服降糖药物治疗，目前血压血糖均在正常范围。该患者高血压诊断正确的是

- A. 高血压 3 级，中危
- B. 高血压 1 级
- C. 高血压 2 级，中危
- D. 高血压 3 级，高危
- E. 高血压 2 级，高危

答案：D

解析：此题暂无解析

214.(A1/A2 型题)男，66 岁。2 天前与人争吵时觉头晕，当时测血压 140/80_Hg，今天骑车 10 公里到县医院就诊，到达时测血压 160/85mmHg。关于此时该患者的血压诊断，正确的说法是

- A. 诊断为高血压 1 级，低危
- B. 诊断为单纯收缩期高血压 2 级，中危
- C. 诊断为高血压 2 级，中危
- D. 暂不能诊断高血压，须多次测量安静休息时血压后才可能明确诊断
- E. 诊断为单纯收缩期高血压 2 级，但须进一步检查后才能明确危险分组

答案：D

解析：高血压的诊断是指测量安静休息坐位时上臂肱动脉部位血压，2 次以上 $\geq 140/90$ mmHg。本患者与人争吵时测血压，及骑车 10 公里到达时立即测量血压都是不准确的，须安静休息时多次测量血压才可能明确诊断。

215.(A1/A2 型题)糖尿病合并高血压的患者，血压控制目标值应小于

- A. 130/80mmHg
- B. 150/90mmHg
- C. 140/80mmHg
- D. 130/90mmHg

E.140/90mmHg

答案：A

解析：高血压无合并症降压目标 140/90mmHg,高血压合并心衰降压目标 140/90mmHg,合并糖尿病,肾病,降压目标更严格,降压目标为<130/80mmHg,故本题答案为A。

216.(A1/A2 型题)消化性溃疡患者的疼痛节律改变或消失,常提示患者其可能的原因是

- A.晨起
- B.饮酒过度
- C.夜晚
- D.癌变
- E.过度劳累

答案：D

解析：ABCE 均加重疼痛,如果疼痛失去了上述规律性,变为不定时发作,或成为持续性隐痛,或疼痛性质与以往相比发生了明显的改变,则应警惕为癌变的先兆。故本题选D。

217.(A1/A2 型题)患者,男,67岁,肝硬化伴中等量腹水,向其进行疾病相关知识的健康教育。以下哪项与腹水的产生无关

- A.脾功能亢进
- B.血清白蛋白减少
- C.门静脉压力增高
- D.醛固酮增多
- E.肾小球滤过率下降

答案：A

解析：此题暂无解析

218.(A1/A2 型题)男性,65岁。因腹水服用利尿剂2周。3天来出现少语寡言及随地便溺。5年前诊断为肝硬化。目前行为异常的原因首先考虑为

- A.神经症
- B.脑血管意外
- C.肝性脑病
- D.电解质紊乱
- E.代谢性酸中毒

答案：C

解析：肝性脑病,又称肝昏迷,是肝功能衰竭或门体分流引起的中枢神经系统精神症状,主要临床表现可以从人格改变,行为失常,扑翼样震颤到出现意识障碍,昏迷和死亡。患者在肝脏的原发疾病的基础上,出现精神症状及人格改变,符合肝性脑病表现。故选C。

219.(A1/A2 型题)患者,男,49岁。既往确诊病毒性乙型肝炎。近5年来间断出现上腹胀,近1周出现呕血.黑便。体检可见肝掌.腹部有蜘蛛痣,可见曲张静脉。患者最可能的原因是

- A.胃炎
- B.胃癌
- C.应激性溃疡
- D.肝硬化
- E.消化道溃疡

答案：D

解析：此题暂无解析

220.(A1/A2 型题)对重症急性胰腺炎的诊断最有意义的检查是

- A.尿淀粉酶
- B.腹部 B 超
- C.腹部增强 CT
- D.血淀粉酶
- E.血清脂肪酶

答案：C

解析：腹部 CT 根据胰腺组织的影像改变进行分级，对急性胰腺炎的诊断和鉴别诊断、评估期严重程度，尤其是对鉴别轻症和重症胰腺炎有重要价值。轻症可见胰腺特异性增大和增厚，胰周围边缘不规则；重症可见胰腺周围区消失；网膜囊和网膜脂肪变性，密度增加；胸腹腔积液。增强 CT 是诊断胰腺坏死的最佳方法，故本题答案为 C。

221.(A1/A2 型题)急性重症胰腺炎特征性病变是

- A.上腹部可触及包块
- B.脐周及侧腹呈青紫色
- C.黄疸
- D.腹痛向腰背部放散
- E.腹痛持续 1 周以上

答案：B

解析：此题暂无解析

222.(A1/A2 型题)肾盂肾炎最主要的治疗措施是

- A.多喝水或输液
- B.卧床休息
- C.应用糖皮质激素
- D.应用抗生素
- E.解痉止痛

答案：D

解析：在未有药物敏感试验结果时，尿路感染的治疗应选用对革兰阴性杆菌有效的抗菌药物，肾盂肾炎是肾实质疾病，除尿外，血浓度亦需高，最好能用杀菌药如复方磺胺甲恶唑片、喹诺酮类、氨基糖苷类抗生素、头孢菌素类、阿莫西林等药才能达到上述目的。

223.(A1/A2 型题)女性，18 岁，因尿少、水肿、头晕、腰痛半年入院，血压 140/100mmHg，血红蛋白 120g/L，血清蛋白 40g/L，尿蛋白(++)，白细胞 3~4 个/HP，红细胞 10~15 个/HP，血尿素氮 8.3mmol/L，血肌酐 178 μ mol/L，最可能的诊断是

- A.急性肾盂肾炎
- B.急性肾炎
- C.肾病综合征
- D.慢性肾炎
- E.急进性肾炎

答案：D

解析：此题暂无解析

224.(A1/A2 型题)下列各选项中属于慢性肾炎的临床特点是

- A.不会导致尿毒症
- B.无蛋白尿
- C.双侧肾大小不一致
- D.肾功能具有缓慢恶化的趋势
- E.没有高血压

答案：D

解析：慢性肾小球肾炎简称慢性肾炎，系指蛋白尿、血尿、高血压、水肿为基本临床表现，起病方式不同，病情迁延，缓慢进展，终将发展为慢性肾衰竭的一组肾小球疾病。

225.(A1/A2 型题)患者，男性，70 岁，慢性肾衰竭。清晨测体温 37.8℃，提示患者出现了

- A.出血
- B.血栓栓塞
- C.中枢神经病变
- D.内分泌失调
- E.感染

答案：E

解析：慢性肾衰竭病人有感染的危险，监测病人有无体温升高。但是病人的基础代谢率较低，体温 $\geq 37^{\circ}\text{C}$ 时即提示存在感染。E 正确。

226.(A1/A2 型题)患者，男，46 岁，患尿毒症 2 年。血常规示 RBC $2.35 \times 10^{12}/\text{L}$ ，Hb70g/L。导致该患者贫血的最主要原因是

- A.出血
- B.低蛋白
- C.促红细胞生成素缺乏
- D.缺铁
- E.叶酸缺乏

答案：C

解析：导致贫血的主要原因是由于肾脏促红细胞生成素（EPO）缺乏生成减少所致，其次为铁摄入不足、叶酸缺乏、营养不良、红细胞寿命缩短、慢性失血、感染等；故本题选 C。

227.(A1/A2 型题)女性 56 岁。外阴痒 1 个月，白带乳块状，镜检发现真菌菌丝，合理的处理是

- A.阴道内放置咪康唑栓
- B.阴道内放置甲硝唑栓
- C.阴道内放置乙烯雌酚栓
- D.外阴应用氢化可的松软膏
- E.外阴应用 0.5%醋酸液清洗

答案：A

解析：据其临床表现考虑真菌性阴道炎。对其治疗可选用阴道内放置咪康唑栓剂或克霉唑栓剂或制霉菌素栓剂。对不能耐受局部用药、未婚者或不愿采用局部用药者，可选用口服药物氟康唑或伊曲康唑。故 A 正确。甲硝唑栓用于治疗细菌性阴道病或滴虫阴道炎，故 B 错。

己烯雌酚栓或 0.5%醋酸液清洗用于治疗萎缩性阴道炎，故 C、E 错。故选 A。

228.(A1/A2 型题)患者女，32 岁。外阴瘙痒伴烧灼感 4 天。妇科检查见外阴局部充血。小阴唇内侧及阴道黏膜表面有白色片状薄膜或凝乳状物。最可能的是

- A.细菌性阴道炎
- B.滴虫性阴道炎
- C.外阴阴道念珠菌病
- D.淋病性阴道炎
- E.萎缩性阴道炎

答案：C

解析：细菌性阴道炎的分泌物特点为匀质、稀薄、白色的阴道分泌物，常粘附于阴道壁。滴虫性阴道炎的分泌物特点为稀薄脓性、黄绿色、泡沫状、有臭味。淋病性阴道炎分泌物增多，显脓性白带，阴道口红肿疼痛。萎缩性阴道炎的分泌物稀薄，呈淡黄色，常见于自然绝经及卵巢去势后妇女。外阴阴道念珠菌病表现为小阴唇内侧及阴道黏膜附有白色膜状物，擦除后可见阴道黏膜红肿或糜烂面及浅表溃疡。典型的白带为白色、凝块状和豆渣样，略带臭味。故选 C。

229.(A1/A2 型题)32 岁女性，阴道分泌物增多，外阴瘙痒，性交痛 2 天。妇科检查：阴道后穹隆大量黄色泡沫样分泌物，宫颈草莓样出血斑点。最佳的治疗方案为

- A.口服甲硝唑
- B.甲硝唑泡腾片阴道填塞
- C.口服氟康唑
- D.制霉菌素栓阴道填塞
- E.微波治疗

答案：A

解析：此题暂无解析

230.(A1/A2 型题)女性，56 岁。绝经 8 年，近 1 个月阴道分泌物增多，偶有血性白带，诊断为萎缩性阴道炎。治疗除局部抗感染治疗外，应加用少量

- A.雌激素
- B.孕激素
- C.雄激素
- D.糖皮质激素
- E.甲状腺素

答案：A

解析：萎缩性阴道炎的治疗原则是抑制细菌生长，补充雌激素，增强阴道抵抗力，所以治疗除局部抗感染治疗外，应加用少量雌激素。故选 A。

231.(A1/A2 型题)细菌性阴道病最常见的病原体是

- A.金黄色葡萄球菌
- B.溶血性链球菌
- C.大肠杆菌
- D.厌氧菌
- E.沙眼衣原体

答案：D

解析：正常阴道内以产生过氧化氢的乳酸杆菌占优势，细菌性阴道病时，阴道内产生过氧化氢的乳酸杆菌减少而其他细菌大量繁殖，其中以厌氧菌居多。故选 D。

232.(A1/A2 型题)萎缩性阴道炎的治疗可在阴道内放置少量

- A.孕激素
- B.雌激素
- C.雄激素
- D.糖皮质激素
- E.促性腺激素

答案：B

解析：萎缩性阴道炎的治疗原则：①抑制细菌生长：用酸性洗液冲洗，再用抗生素局部用药；②增加阴道抵抗力：给予雌激素制剂局部给药或全身用药，故 B 正确。

233.(A1/A2 型题)外阴阴道假丝酵母菌的主要传播途径为

- A.性交传播
- B.内源性传染
- C.垂直传播
- D.接触传播
- E.呼吸道传播

答案：B

解析：选 B，外阴阴道假丝酵母菌作为条件致病菌，主要为内源性传染。

234.(A1/A2 型题)需要夫妇双方同时治疗的炎症是

- A.外阴炎
- B.慢性宫颈炎
- C.念珠菌阴道炎
- D.滴虫性阴道炎
- E.盆腔炎

答案：D

解析：滴虫性阴道炎主要由性行为传播，性伴侣应同时进行治疗，治疗期间禁止性交。

235.(A1/A2 型题)有关原发性痛经的陈述，正确的是

- A.患者雌激素水平异常升高可致痛经
- B.子宫自主神经敏感性增加易发痛经
- C.经期子宫内膜 PG 过度合成可致痛经
- D.子宫内膜组织缺氧可引起痛经
- E.子宫内膜异位可引起痛经

答案：C

解析：此题暂无解析

236.(A1/A2 型题)患儿，8 个月，因面色苍白 20 天入院，查体：贫血外观，肝于右肋下触及 2.5cm，血象 Hb80g/L，RBC3.08×10¹²/L，诊为小细胞低色素性贫血，给予铁剂治疗，如有效，网织红细胞何时可达高峰

- A.2~3 天

- B.3~4 天
- C.4~5 天
- D.5~7 天
- E.7~10 天

答案：D

解析：网织红细胞在服药 2~3 日后开始上升，5~7 日达高峰，2~3 周后下降至正常。故选 D。三.

237.(A1/A2 型题)在下列缺铁性贫血的临床表现中，属于组织缺铁表现的是

- A.头晕
- B.眼花
- C.心悸
- D.异食癖
- E.气短

答案：D

解析：5 项备选答案中只有异食癖属于组织缺铁的表现，其余均属于贫血的表现

238.(A1/A2 型题)营养性缺铁性贫血的临床表现，错误的是

- A.年长儿可有头晕.眼前发黑.耳鸣等
- B.注意力不集中，记忆力减退
- C.食欲减退，可出现异食癖
- D.免疫功能低下，易合并感染
- E.年龄愈大，肝.脾大越明显

答案：E

解析：营养性缺铁性贫血的临床表现为年长儿可有头晕.眼前发黑.耳鸣.注意力不集中.记忆力减退.食欲减退，可出现异食癖和免疫功能低下，易合并感染。由于髓外造血的影响，年龄越小，病程越久，肝.脾大越明显，故选 E。

239.(A1/A2 型题)容易造成营养性缺铁性贫血的原因是

- A.足月儿 4 个月开始添加富含铁剂的食物
- B.早产儿 2 个月开始添加富含铁剂的食物
- C.长期单纯母乳喂养
- D.过期产
- E.便秘

答案：C

解析：此题暂无解析

240.(A1/A2 型题)缺铁性贫血根治的关键是

- A.铁剂治疗
- B.病因治疗
- C.输血治疗
- D.饮食治疗
- E.预防各种感染

答案：B

解析：此题暂无解析

241.(A1/A2 型题)患者，女，33 岁，近 2 个月下肢反复出现紫癜，月经量增多。查血象示 WBC $6.8 \times 10^9/L$ ，Hb $110g/L$ ，PLT $53 \times 10^9/L$ 。应首选的检查项目是

- A.出血时间
- B.凝血酶原时间
- C.骨髓穿刺检查
- D.晨起服用
- E.抗核抗体

答案：C

解析：血小板计数低于正常值，下肢反复出现紫癜，且身体失血量增多，可考虑为特发性血小板减少性紫癜。需进行骨髓象检查进一步确诊。

242.(A1/A2 型题)治疗特发性血小板减少性紫癜慢性型的首选方案为

- A.输新鲜血小板
- B.X 线脾区照射
- C.使用止血药
- D.使用糖皮质激素
- E.做脾切除

答案：D

解析：此题暂无解析

243.(A1/A2 型题)特发性血小板减少性紫癜较少出现

- A.肌肉血肿
- B.鼻出血
- C.月经过多
- D.口腔黏膜出血
- E.皮肤瘀点

答案：A

解析：特发性血小板减少性紫癜出血多表现为皮肤黏膜出血（包括牙龈、鼻出血），也可有内脏出血。月经过多较常见。较少有肌肉出血。故选 A。

244.(A1/A2 型题)28 岁女性。出现心悸，多食，消瘦近半年。经查体及实验检查确诊为 Graves 病，患者幼年时有哮喘史。下述何种药物应禁忌

- A.普萘洛尔
- B.甲基硫氧嘧啶
- C.卡比马唑
- D.甲状腺素片
- E.甲巯咪唑

答案：A

解析：哮喘禁忌普萘洛尔是因为其为 β 受体阻滞剂， β 受体阻滞剂会增加哮喘病患者的气道高反应性。

245.(A1/A2 型题)女性，35 岁，诊甲亢后即行甲状腺次全切手术，术后病人出现高热，心率

160次/分，烦躁不安。大汗淋漓，腹泻，应首先考虑的诊断是

- A. 甲亢症状加重
- B. 甲亢术后感染
- C. 甲亢危象
- D. 甲亢危象前期
- E. 甲亢术后感染性腹泻

答案：C

解析：此题暂无解析

246.(A1/A2型题)甲状腺功能亢进性心脏病病人最常出现的心律失常是

- A. 期前收缩
- B. 室性期前收缩
- C. 室上性心动过速
- D. 心房纤颤
- E. 心室纤颤

答案：D

解析：甲状腺功能亢进性心血管系统表现：心悸、胸闷、气短，心率增快、心肌收缩力增强，心律失常以心房颤动最常见。

247.(A1/A2型题)治疗甲状腺功能亢进的常用药是硫脲类抗甲状腺药物，其主要作用是

- A. 阻滞T₄转变为T₃
- B. 抑制碘的吸收
- C. 抑制甲状腺激素的释放
- D. 抑制甲状腺激素的合成
- E. 抑制促甲状腺激素的合成

答案：D

解析：硫脲类抗甲状腺药物其作用机制为抑制甲状腺过氧化物酶，阻断甲状腺激素的合成。

248.(A1/A2型题)以下情况不符合转诊条件的是

- A. 怀疑甲亢但不能确诊者
- B. 甲亢性心脏病患者
- C. 甲亢合并周期性瘫痪者
- D. 甲亢诊断明确，症状轻微者
- E. 出现甲亢危象者

答案：D

解析：甲亢患者出现以下情况需转诊：①甲亢性心脏病表现为心房颤动和心力衰竭者。②甲亢疑似病例不能确诊者。③甲亢合并周期性瘫痪，出现呼吸肌瘫痪导致窒息者。④出现甲亢危象者。二.

249.(A1/A2型题)关于癫痫下列说法错误的是

- A. 强直发作是一种发作性僵直的强烈的肌收缩
- B. 失张力癫痫发作时全身肌张力突然消失致猝倒，同时意识丧失
- C. 癫痫按照病因可分为特发性癫痫和症状性癫痫
- D. 肌阵挛性发作是一种突发、短暂的闪电样肌肉收缩

E.失神发作患者意识短暂中断，发作突然，缓慢停止，每日可发作数次至数百次，事后对发作无记忆

答案：E

解析：失神发作患者意识短暂中断，发作和停止突然，每日可发作数次至数百次，事后对发作无记忆。

250.(A1/A2 型题)复杂部分性发作的病损在

- A.中央前回
- B.黑质-纹状体
- C.颞叶
- D.枕叶
- E.小脑

答案：C

解析：此题暂无解析

251.(A1/A2 型题)对各型癫痫都有一定疗效的药物是

- A.乙琥胺
- B.苯妥英钠
- C.卡马西平
- D.丙戊酸钠
- E.苯巴比妥

答案：D

解析：丙戊酸钠是广谱的抗癫痫药，用于全面性发作和部分性发作。

252.(A1/A2 型题)23 岁，男性。3 个月前起病，说话语无伦次，常自言自语，说自己是神仙，是伟人，对异性有非分之想，攻击亲人。查：意识清晰，兴奋躁动，思维破碎，内容离奇，难以理解，认为门外有人要杀他，有一台电脑在影响他的大脑，使大脑在不停地转。躯体及神经系统检查未见显著体征，该患诊断是

- A.躁狂症
- B.抑郁症
- C.精神分裂症
- D.心因性精神障碍
- E.神经症

答案：C

解析：躁狂状态的主要临床症状是心境高涨，思维奔逸和精神运动性兴奋，不选 A。抑郁以情感低落、思维迟缓、以及言语动作减少、迟缓为典型症状，不选 B。心因性精神障碍是一组由心理社会因素所造成的精神障碍，患者不符合，不选 D。神经症是一组非精神病功能性障碍。其共同特征是：是一组心因性障碍，人格因素、心理社会因素是致病主要因素，但非应激障碍，是一组机能障碍，障碍性质属功能性非器质性；具有精神和躯体两方面症状；具有一定的人格特质基础但非人格障碍；各亚型有其特征性的临床相；神经症是可逆的，外因压力大时加重，反之症状减轻或消失；社会功能相对良好，自制力充分，不选 E。故选 C。

253.(A1/A2 型题)24 岁，女性，病程 6 年，说有人要害她，常自笑，好追求异性，有时打人摔东西，话多内容凌乱。精神检查：意识清晰，兴奋多语，思维松弛，欣快，主动接触异性，

有被害妄想及非系统性妄想，活动增多而无目的性，躯体及神经系统检查未见著征，该患者诊断为

- A.精神分裂症
- B.情感障碍（躁狂型）
- C.脑器质性精神障碍
- D.人格障碍
- E.躯体疾病所致精神障碍

答案：A

解析：此题暂无解析

254.(A1/A2 型题)不属于思维内容障碍的是

- A.思维松弛
- B.思维被播散
- C.被洞悉感
- D.被害妄想
- E.嫉妒妄想

答案：A

解析：思维松弛属于思维形式的障碍，不属于思维内容的障碍，故选 A。

255.(A1/A2 型题)女，26 岁。近 1 月来出现失眠，难以入睡，食欲较差，体重减轻 2kg，自觉自己无能，没用，孤独，没有人关心自己，对未来也不抱任何希望，偶尔出现生不如死想法，目前患者出现的突发症状是

- A.三自症状
- B.思维迟缓
- C.睡眠障碍
- D.消极观念
- E.三无症状

答案：E

解析：“三无”症状:无望——对未来不报任何希望，无助——没有人关心自己，无价值——偶尔出现生不如死想法。

256.(A1/A2 型题)抑郁症最具特征性的睡眠障碍是

- A.入睡困难
- B.早醒
- C.恶梦频繁
- D.易醒
- E.睡眠-觉醒节律紊乱

答案：B

解析：抑郁发作表现以情感低落.思维迟缓.意志活动减退和躯体症状为主。抑郁症睡眠障碍主要表现为早醒，一般比平时早醒 2~3 小时，醒后不能再入睡，具诊断意义。二。

257.(A1/A2 型题)男，52 岁。颈肩痛 3 个月，并向左上肢放射。左上肢肌力下降，手指动作不灵活。颈椎棘突间有压痛，左手拇指感觉减弱。上肢牵拉试验阳性，压头试验阳性。最可能的颈椎

- A. 脊髓型
- B. 神经根型
- C. 混合型
- D. 椎动脉型
- E. 交感神经型

答案：B

解析：神经根型颈椎病临床上开始多为颈肩痛，短期内加重，并向上肢放射。放射痛范围根据受压神经根不同而表现在相应皮节。皮肤可有麻木、过敏等感觉异常。同时可有上肢肌力下降、手指动作不灵活。当头部或上肢姿势不当，或突然牵撞患肢即可发生剧烈的闪电样锐痛。上肢牵拉试验阳性：术者一手扶患侧颈部，一手握患腕，向相反方向牵拉。此时因臂丛神经被牵张，刺激已受压之神经根而出现放射痛。压头试验阳性：患者端坐，头后仰并偏向患侧，术者用手掌在其头顶加压，出现颈痛并向患手放射。故选 B。

258.(A1/A2 型题)男，50 岁。四肢麻胀，乏力逐渐加重近 2 年，1 个月前不慎滑倒，当即出现四肢活动障碍，查体：神志清楚，头部活动无明显受限，第 2 肋以下皮肤痛觉减退，四肢不能主动活动肌张力增高，病理征 (+)。X 线片示颈 4~胸 1 椎体后缘骨质增生，椎间隙变窄。诊断为

- A. 外伤性颈髓损伤
- B. 颈椎脱位
- C. 脊髓型颈椎病
- D. 颈椎肿瘤
- E. 颈椎管内肿瘤

答案：C

解析：脊髓型颈椎病主要是由于颈部病变导致脊髓受压、炎症、水肿等；以 40~60 岁高发；主要症状为下肢麻木、沉重，行走困难，双脚有踩棉感，易摔跤；上肢麻木、疼痛，双手无力、不灵活，写字、系扣、持筷等精细动作难以完成，持物易落；躯干部出现感觉异常，患者常感觉在胸部、腹部、或双下肢有如皮带样的捆绑感。结合患者表现，考虑为脊髓型颈椎病。故选 C。

259.(A1/A2 型题)下列哪一类型颈椎病发病率最高

- A. 神经根型
- B. 脊髓型
- C. 椎动脉型
- D. 交感神经型
- E. 复合型

答案：A

解析：神经根型颈椎病约占颈椎病的 50%-60%，故本题选 A；脊髓型颈椎病约占颈椎病的 10%~15%。

260.(A1/A2 型题)手指麻木伴上肢放射痛，压头试验阳性，最可能的颈椎病类型是

- A. 椎动脉型颈椎病
- B. 脊髓型颈椎病
- C. 交感神经型颈椎病
- D. 神经根型颈椎病

E.复合型颈椎病

答案：D

解析：此题暂无解析

261.(A1/A2 型题)女，48 岁，因左肩痛 3 个月逐渐加重，不能梳头，左肩关节外展.后伸受限，三角肌萎缩，无手臂麻木感，最可能的原因是

A.颈椎病

B.肩部肿瘤

C.肩周炎

D.肩关节结核

E.风湿性关节炎

答案：C

解析：此题暂无解析

262.(A1/A2 型题)肩周炎不正确的治疗方法是

A.理疗

B.封闭

C.按摩

D.服用非甾体抗药物

E.限制肩关节活动

答案：E

解析：早期给予理疗.针灸.适度的推拿按摩，可改善症状；疼痛持续.夜间难以入睡时，可短期服用非甾体抗炎药，并加以适量口服肌肉松弛剂；痛点局限时，可局部注射醋酸泼尼松龙，能明显缓解疼痛；无论病程长短，症状轻重，均应每日进行肩关节的主动活动，活动时以不引起剧痛为限。故选 E。

263.(A1/A2 型题)肩周炎是自限性疾病，一般恢复时间需要

A.2 年~3 年左右

B.1 年~2 年左右

C.6 个月~2 年左右

D.3 个月~6 个月左右

E.1 个月~3 个月左右

答案：C

解析：肩周围关节炎有其自然病程，一般在 6 个月~2 年左右能自愈。但若不配合治疗和功能锻炼，即使自愈也将遗留不同程度的功能障碍。故选 C。

264.(A1/A2 型题)女，54 岁。双腕，双手近段指尖关节.掌指关节肿痛 3 年，晨僵 1 小时。查体:双腕.双手 2~4 掌指关节及 3~4 近端指间关节肿胀，压痛，ANA (-)。最可能的诊断是

A.强直性脊柱炎

B.类风湿关节炎

C.反应性关节炎

D.骨关节炎

E.痛风性关节炎

答案：B

解析：此题暂无解析

265.(A1/A2 型题)类风湿关节炎常选用的治疗药物是

- A.泼尼松
- B.糖皮质激素
- C.阿司匹林
- D.紫杉醇
- E.环磷酰胺

答案：C

解析：诊断明确的类风湿关节炎病人都应使用缓解病情抗风湿药，常用药物有甲氨蝶呤、青酶胺、环磷酰胺、环孢素等，故本题选 E。

266.(A1/A2 型题)类风湿关节炎的临床表现中不包括

- A.关节疼痛
- B.关节畸形
- C.关节肿胀
- D.蝶形红斑
- E.晨僵

答案：D

解析：蝶形红斑是系统性红斑狼疮最具特征性的皮肤改变，其余四项均为类风湿关节炎的临床表现。

267.(A1/A2 型题)类风湿关节炎常见的关节表现是

- A.对称性近端指间、掌指和腕关节持续性肿痛
- B.膝、髋和踝关节非对称，持续肿痛
- C.膝关节单侧或双侧肿痛，休息后好转
- D.单侧第一跖趾关节剧烈肿痛
- E.胸锁关节肿痛

答案：A

解析：类风湿关节炎的关节表现有晨僵、痛与压痛（关节痛往往是最早的症状，最常出现的部位为腕、掌指关节、近端指间关节，多呈对称性、持续性，时轻时重，疼痛的关节伴有压痛），关节肿，关节畸形（多见于较晚期患者），特殊关节，关节功能障碍。故选 A。

268.(A1/A2 型题)在类风湿关节炎中，最常受累的关节是

- A.脊柱关节
- B.髋关节
- C.膝关节
- D.远端指间关节
- E.近端指间关节

答案：E

解析：类风湿关节炎可侵犯周围小关节和大关节，但以近端指间关节、掌指关节、腕关节及足关节最常见，其次为肘、肩、踝、膝、颈、颞颌及髋关节。远端指间关节和脊柱关节（颈椎除外）极少受累

269.(A1/A2 型题)患儿，4 个月，男婴。采用混合喂养，腹泻 2 个月，大便 5~6 次/d，稀或糊便，无脓血，食欲表现好。面部湿疹，体重 5.8kg。该患儿目前最可能的诊断是

- A.迁延性腹泻
- B.慢性腹泻
- C.感染性腹泻
- D.饮食性腹泻
- E.生理性腹泻

答案：E

解析：患儿一般情况好，无感染中毒症状，不影响生长发育，支持生理性腹泻，排除感染性腹泻。迁延性腹泻指发病 2 周至 2 个月的腹泻，慢性腹泻指发病 $>$ 2 个月的腹泻。

270.(A1/A2 型题)1 岁男孩。1 天来腹泻 10 余次，为黄稀水便。查体：精神稍萎靡，皮肤弹性佳。医生推荐使用 WHO 规定的传统口服补液盐，其张力为

- A.1/2 张
- B.1/3 张
- C.2/3 张
- D.1/4 张
- E.等张

答案：C

解析：WHO 规定的口服补液盐电解质的渗透压为 220mmol/L（总渗透压为 310mmol/L），故为 2/3 张。

271.(A1/A2 型题)患儿男，3 岁。腹泻 4 天，加重 2 天，稀水样便每日十余次，尿量减少。体检：眼窝凹陷，皮肤弹性差，脉搏可扪及。查血钠 135mmol/L。其腹泻脱水的程度与性质应是

- A.轻度低渗性
- B.轻度等渗性
- C.中度高渗性
- D.中度等渗性
- E.重度低渗性

答案：D

解析：根据患儿腹泻 4 天，加重 2 天，稀水样便每日十余次，尿量减少。体检：眼窝凹陷，皮肤弹性差，脉搏可扪及。查血钠 135mmol/L。患儿为中度等渗性脱水。轻度脱水皮肤弹性无改变，重度脱水循环表现为休克。低渗脱水血钠浓度 $<$ 130mmol/L，高渗脱水血钠浓度 $>$ 150mmol/L。所以患儿属于中度等渗性脱水，故选 D。

272.(A1/A2 型题)男，10 岁，诊断为胆道蛔虫症，其病史体检不支持诊断的是

- A.恶心、呕吐
- B.排虫史
- C.疼痛间歇性发作
- D.严重时出现急性胆管炎征象
- E.发病超过 12 小时，常有明显黄疸

答案：E

解析：此题暂无解析

273.(A1/A2 型题)自直疝三角向外突出的疝称为

- A.股疝
- B.腹股沟直疝
- C.腹股沟斜疝
- D.脐疝
- E.白线疝

答案：B

解析：直疝三角是由外侧腹壁下动脉、内侧腹直肌外侧缘及下侧腹股沟内侧构成的。此三角缺乏完整的腹肌覆盖，且腹横筋膜比较薄，故易发生疝，腹股沟直疝即在此由后向前突出。股疝自股环向下向外突出，斜疝自深（内）环向外突出，经腹股沟管进入阴囊。二。

274.(A1/A2 型题)妊娠妇女可以应用的解热镇痛药是

- A.阿司匹林
- B.对乙酰氨基酚
- C.布洛芬
- D.吲哚美辛
- E.塞来昔布

答案：B

解析：妊娠妇女应慎用解热镇痛药。必须用时，宜选用对乙酰氨基酚。

275.(A1/A2 型题)成人胸外心脏按压时，胸骨下陷深度正确的是

- A.3~4cm
- B.4~5cm
- C.5~6cm
- D.4~6cm
- E.4~8cm

答案：C

解析：按压速率为 100~120 次/分，按压幅度为 5~6cm。按压与人工呼吸比例为 30：2。

276.(A3/A4 型题)一位外科医生在对术前病人的谈话中，解释了手术的过程、手术中的危险以及术后可能出现的问题。同时又要求病人不必把手术的危险性看得太严重，多想手术的积极性，有利于病灶的切除和身体的康复，并教会病人一些放松的技巧。病人得到了鼓励和支持，消除了术前的焦虑。外科医生帮助病人有效应对方法属于

- A.增强防御机制
- B.减轻紧张
- C.耐心的劝导
- D.调整对刺激事件的认知
- E.思想政治工作

答案：D

解析：此题暂无解析

277.(A3/A4 型题)一位外科医生在对术前病人的谈话中，解释了手术的过程、手术中的危险以及术后可能出现的问题。同时又要求病人不必把手术的危险性看得太严重，多想手术的积极性

意义，有利于病灶的切除和身体的康复，并教会病人一些放松的技巧。病人得到了鼓励和支持，消除了术前的焦虑。医生所用方法能有效地消除病人的心理问题的原因是

- A.增强病人对威胁情境的控制能力
- B.接受心理方面的暗示
- C.提高思想觉悟
- D.得到医生的热情劝告
- E.增加病人配合治疗的责任感

答案：A

解析：此题暂无解析

278.(A3/A4 型题)患者男性，40 岁。因艾滋病.肺部感染住院治疗。患者对医生提出要求，不要将病情跟家人.单位领导讲，医生尊重患者要求，住院期间病情交待只跟患者交流。医生维护的患者权利是

- A.选择权
- B.决定权
- C.知情权
- D.隐私权
- E.回避权

答案：D

解析：此题暂无解析

279.(A3/A4 型题)一小儿，女患者，11 岁。患甲状腺癌，并有颈淋巴结转移。医生告诉患儿母亲，女孩需做甲状腺癌根治术。按常规手术后要造成颈部塌陷变形，肩下垂，身体的外观和功能都要受到一定损害。当患儿母亲听到要造成这些后遗症后，断然拒绝治疗，带孩子出院。过了不久，患儿家属考虑到癌症将危及到病人的生命。故再次来到医院，要求给予治疗，并请求医生尽可能不给孩子留下终身伤残的痛苦。医生经过再三考虑，决定打破常规，采用一种新的术式。既收到治疗效果，又使女孩子保留外形美观，功能不受破坏。患者及家属同意做此手术。尽管这种术式的治疗效果当时尚不能肯定，手术进行得很顺利，随访远期疗效也很好。下面说法哪一点是错误的

- A.病人应该在医师指导下对治疗作出负责的决定并与医师合作执行
- B.既要为病人考虑眼前疗效，又考虑远期疗效
- C.医生不可以强求病人做不同意做的手术
- D.医生打破常规，采用治疗效果不肯定的术式的做法是不可取的
- E.医生为病人着想.勇担风险是值得赞扬的

答案：D

解析：然医生打破常规，采用治疗效果不肯定的术式但是既能到治疗效果，又使女孩子保留外形美观，功能不受破坏。所以不算错误，做法可取。

280.(A3/A4 型题)男，53 岁，公司经理，吸烟 15 年，每天 2 包，体重 75kg，身高 164cm。从临床预防心血管疾病的角度讲应该检查

- A.血脂
- B.血常规
- C.心超
- D.心电图

E.冠状动脉造影

答案：A

解析：血脂为心血管疾病的易发因素，因此需要检查血脂。

281.(A3/A4 型题)男，53 岁，公司经理，吸烟 15 年，每天 2 包，体重 75kg，身高 164cm。患者的 BMI（体重指数）是

A.21.4

B.23.5

C.25.8

D.27.9

E.31.5

答案：D

解析：MI 指数是用体重公斤数除以身高米数平方得出的数字，是目前国际上常用的衡量人体胖瘦程度以及是否健康的一个标准。计算得出该患者的 BMI 为 27.9，故选 D。

282.(A3/A4 型题)吴某，男，40 岁，某公司副总经理，由于头晕、胸闷来就诊。平时脾气暴躁，容易发脾气，做事匆忙，常为完成工作而加班，讲话快，对下属要求严格。从致病性行为模式的角度来说，吴某的行为属于

A.A 型行为

B.B 型行为

C.C 型行为

D.D 型行为

E.E 型行为

答案：A

解析：此题暂无解析

283.(A3/A4 型题)一个健康 5 岁小儿，体格生长发育正常。体重、身长大概为多少

A.体重 18kg，身长 107cm

B.体重 15kg，身长 104cm

C.体重 18kg，身长 106cm

D.体重 22kg，身长 106cm

E.体重 18kg，身长 102cm

答案：A

解析：儿 5 岁，2 岁～青春前期儿童体重：体重（kg）=年龄×2+7（或 8）。2～12 岁：身高（cm）=年龄×6+77，通过计算可得知应该选择 A。

284.(A3/A4 型题)男，45 岁，胃溃疡病史 8 年，近 3 个月疼痛加重，失去节律，用多种药物治疗无效。查体：浅表淋巴结无肿大，腹平软，上腹部压痛，可扪及肿块。应首选下列哪项检查

A.便潜血试验

B.血清胃泌素测定

C.B 超

D.胃镜检查

E.钡餐造影

答案：D

解析：此题暂无解析

285.(A3/A4 型题)男，45 岁，胃溃疡病史 8 年，近 3 个月疼痛加重，失去节律，用多种药物治疗无效。查体：浅表淋巴结无肿大，腹平软，上腹部压痛，可扪及肿块。如果上述诊断成立，首选的处理方法是

- A.继续药物治疗
- B.定期随访
- C.手术治疗
- D.化疗
- E.放疗

答案：C

解析：溃疡的患者中，如近期内症状有变化者应考虑到恶性胃溃疡，应进行胃镜检查及黏膜活检病理检查，诊断明确尽早手术治疗。

286.(A3/A4 型题)患者男，40 岁。中上腹饥饿性隐痛反复发作 10 年，伴反酸、嗝气，进食和服用抑酸剂可缓解。如进行腹部检查，最具诊断价值的体征是

- A.腹肌紧张
- B.腹壁柔韧感
- C.肠鸣音亢进
- D.肝浊音界消失或缩小
- E.莫菲征阳性

答案：D

解析：孔最具诊断价值的体征是肝浊音界消失或缩小。故选 D。

287.(A3/A4 型题)患者男，40 岁。中上腹饥饿性隐痛反复发作 10 年，伴反酸、嗝气，进食和服用抑酸剂可缓解。为确诊应选择的检查手段是

- A.血清淀粉酶测定
- B.癌胚抗原测定
- C.胃镜检查
- D.腹部 X 线平片
- E.中腹部 B 超

答案：D

解析：孔后可引起急性腹膜炎，可有腹膜刺激征，症状有中上腹剧痛且腹痛持续存在，体征有压痛、反跳痛及肌紧张。X 线检查可见膈下游离气体，可确诊。故选 D。

288.(A3/A4 型题)女性，39 岁。反复上腹痛伴反酸 10 年，疼痛于空腹时加重，饭后缓解，近来疼痛加剧，服抗酸药等不能缓解。近 3 天来上腹痛伴呕吐，呕吐有酸臭味。上述病例最可能的诊断是

- A.胃窦癌伴幽门梗阻
- B.胃溃疡
- C.十二指肠溃疡伴幽门梗阻
- D.幽门管溃疡
- E.胆汁反流性胃炎

答案：C

解析：题干可知患者中年女性，上腹痛病史 10 年，且有节律性，考虑为十二指肠溃疡，消化性溃疡并发幽门梗阻时可使胃排空延迟，上腹胀满不适，疼痛于餐后加重；恶心、呕吐隔夜酸性宿食。

289.(A3/A4 型题)患者，男性，70 岁，慢性迁延性肝炎 15 余年，近半个月来感全身明显乏力，食欲差，腹胀，腹泻入院。查体：面色晦暗，体形消瘦，皮肤巩膜中度黄染，腹部膨隆，叩诊有移动性浊音。护士根据患者腹部出现了移动性浊音这一特点，考虑患者的腹水量已超过

A.400ml

B.700ml

C.900ml

D.1000ml

E.1500ml

答案：D

解析：此题暂无解析

290.(A3/A4 型题)患者男，57 岁。3 个月来腹胀、水肿，1 周来加重伴腹痛。20 年前曾发现 HBsAg (+)。查体：可见肝掌及蜘蛛痣。蛙状腹，肝未及，脾肋下 4cm，全腹压痛，无明显反跳痛，移动性浊音阳性。化验：血白蛋白 24g/L，血球蛋白 31g/L，血钾 3.8mmol/L，血钠 136mmol/L，血氯 98mmol/L。该患者最必要的检查是

A.腹水常规+细菌培养

B.尿常规及尿钠检测

C.腹部 B 超检查

D.腹部 CT 检查

E.胃镜检查

答案：A

解析：患者有腹水，为明确诊断，应抽腹水化验检查，腹水检查一般为漏出液，如并发自发性腹膜炎，则腹水透明度降低，比重介于漏出液和渗出液之间，白细胞数增多，常在 $500 \times 10^6/L$ 以上。并发结核性腹膜炎时，则以淋巴细胞为主。腹水呈血性应高度怀疑恶变，宜做细胞学检查，故选 A。其他四个选项不能做出明确诊断。故不选。

291.(A3/A4 型题)女，32 岁，2 天来出现尿频、尿急、尿痛，发冷发热 $39^{\circ}C$ ，腰痛，化验尿常规脓细胞成堆，红细胞 (+)，血常规白细胞 $14 \times 10^9/L$ ，中段尿细菌培养大肠杆菌菌落计数 $14 \times 10^5/ml$ 。此患者可能诊断为

A.急性膀胱炎

B.急性肾盂肾炎

C.慢性尿道炎

D.慢性肾盂肾炎

E.慢性膀胱炎

答案：B

解析：患者为育龄妇女，有感染中毒等症状如腰痛、腰酸，尿频、尿急、尿痛等尿路刺激征，中段尿培养阳性，血红细胞计数升高。

292.(A3/A4 型题)男，25 岁。发现血尿、蛋白尿 2 年。查体：BP150/90mmHg，双下肢无水肿。

检查:尿蛋白定量 0.5~0.8g/d, 尿 RBC5~10 个/HP, 血肌酐 125 μ mol/L, 血胆固醇 6.0mmol/L, B 超示双肾大小正常。该患者最可能的临床诊断为

- A.高血压肾病
- B.肾病综合征
- C.急性肾小球肾炎
- D.慢性肾小球肾炎
- E.无症状性蛋白尿和血尿

答案: D

解析: 性肾小球肾炎属于临床诊断, 需符合以下诊断指标:凡尿化验异常(蛋白尿.血尿). 伴水肿.高血压肾功能不全至少一种情况者达 3 个月以上; 若为单纯性蛋白尿, 尿蛋白大于 1g/d 者; 在除外继发性肾小球肾炎及遗传性肾小球肾炎后, 临床上可诊断为慢性肾炎。本患者血尿.蛋白尿 2 年, 血压升高.肾功能轻度损害, 无其他疾病史, 故诊断为慢性肾小球肾炎。

293.(A3/A4 型题)男, 68 岁, 进行性排尿困难, 尿线变细, 饮酒后症状加重。要确诊病因, 首选的影像学检查是

- A.CT
- B.MRI
- C.B 超
- D.KU
- E.膀胱造影检查

答案: C

解析: 确诊病因, 首选的影像学检查是 B 型超声波检查, 可显示增生的前列腺。该检查无创.经济, 为检查首选, 故选 C。

294.(A3/A4 型题)女性, 28 岁, 妊娠期体格检查, 尿糖(+++), 血糖:空腹 7.8mmol/L, 随机 16.7mmol/L。诊断考虑

- A.应激性高血糖
- B.糖尿病
- C.糖耐量减低
- D.反应性高血糖
- E.妊娠期糖尿病

答案: E

解析: 此题暂无解析

295.(A3/A4 型题)女性, 28 岁, 妊娠期体格检查, 尿糖(+++), 血糖:空腹 7.8mmol/L, 随机 16.7mmol/L。治疗主要选择

- A.饮食治疗
- B.体育锻炼
- C.口服降糖药
- D.胰岛素
- E.无须治疗

答案: D

解析: 此题暂无解析

296.(A3/A4 型题)患者,女,55岁。高血压20年,不规则服药。某日晨突发头痛,意识不清,30分钟后送到医院。体检:昏迷,血压210/110mmHg,双眼向右侧凝视,左足外旋位。下列哪项辅助检查对明确诊断最有价值

- A.腰穿检查
- B.脑电图检查
- C.脑超声检查
- D.头颅CT检查
- E.开颅探查

答案: D

解析: 确诊脑出血诊断最有价值的辅助检查是头颅CT检查,出血部位可见高密度影。

297.(A3/A4 型题)患者男,24岁。突然意识不清,跌倒,全身强直数秒钟后抽搐,咬破舌2分钟后抽搐停止。醒后活动自如。应进一步做的检查是

- A.头颅X线片
- B.脑电图
- C.脑脊液检查
- D.脑血管造影
- E.经颅超声多普勒(TCD)

答案: B

解析: 电图上的癫痫放电是人类癫痫的一个重要特征,也是诊断癫痫的主要佐证。理论上讲,任何一种癫痫发作都能用脑电图记录到发作或发作间期痫样放电。故选B。过关点睛: 癫痫的主要佐证是脑电图。

298.(A3/A4 型题)患儿,15岁,因发热、疲乏4天,尿黄、巩膜黄染2天入院,体温38.5℃,发病前曾在外饮食,有乙肝疫苗接种史。为了确诊最可靠的检查项目是

- A.抗HAV-IgG
- B.抗HBV-IgM
- C.抗HDV
- D.抗HEV
- E.抗HAV-IgM

答案: E

解析: 此题暂无解析

299.(A3/A4 型题)女性,20岁,服务业人员,未婚,不否认有性交行为。半月前躯干、四肢、双手掌跖出现红斑,无痒痛感,查躯干、四肢可见玫瑰色椭圆形斑疹,对称分布,掌跖部黄豆大小铜红色领圈样脱屑。要诊断梅毒还应做哪项检查

- A.TPPA
- B.抗-HIV
- C.抗-HEV
- D.RPR
- E.血沉

答案: A

解析: 此题暂无解析

300.(A3/A4 型题)女性，20 岁，服务业人员，未婚，不否认有性交行为。半月前躯干、四肢、双手掌跖出现红斑，无痒痛感，查躯干、四肢可见玫瑰色椭圆形斑疹，对称分布，掌跖部黄豆大小铜红色领圈样脱屑。若确诊为梅毒首选治疗药物是

- A.四环素
- B.红霉素
- C.头孢曲松钠
- D.青霉素类
- E.拜复乐

答案：D

解析：此题暂无解析

金英杰医考官方