

题号	预测题干	预测答案	星级
1	小儿惊厥病因中最常见的是	高热惊厥	☆☆☆
2	长期应用抗生素，口腔白色覆膜，不易拭去，问感染了什么（用什么漱口水）	真菌感染（2%碳酸氢钠）	☆☆☆
3	疫苗接种	常考：乙肝疫苗、卡介苗、麻疹疫苗接种部位时间	☆☆☆
4	新生儿期	出生后脐带结扎至生后 28 天	☆☆
5	生长发育规律	生长发育持续性和阶段性；各系统发育的不平衡性；生长发育的顺序性；生长发育的差异性	☆☆
6	评价小儿体格生长及营养状况的指标是	体重	☆☆☆
7	1~6 月小儿体重估算公式	体重=出生时体重（kg）+月龄×0.7	☆☆☆
8	反映小儿骨骼发育的重要指标	身高	☆☆☆
9	前囟闭合时间	1~1.5 岁	☆☆☆
10	前囟临床意义	早闭或过小：见于小头畸形； 迟闭或过大：佝偻病、先天性甲状腺功能减退症、脑积水； 前囟饱满：颅内压增高，多见脑积水； 潜心凹陷：脱水患儿、极度消瘦	☆☆☆
11	婴儿 4~6 月龄辅食添加	婴儿 4~6 月龄后，逐步添加辅食，主要引入的食物包括含铁配方米粉、配方奶、蛋黄、菜泥、水果泥	☆☆☆
12	疫苗接种时间口诀	出生乙肝卡介苗； 二月脊灰炎正好； 三月接种百白破； 八月麻疹活疫苗	☆☆☆
13	新生儿窒息复苏步骤	A 通畅气道 B 建立呼吸； C 恢复循环 D 药物治疗	☆☆☆
14	新生儿控制惊厥首选	苯巴比妥	☆☆☆
15	硬肿发生顺序	小腿-大腿外侧-下肢-臀部-面颊-上肢-全身	☆☆☆
16	新生儿肺透明膜病特点	由于缺乏肺泡表面活性物质引起的，呼吸窘迫呈进行性加重是本病特点	☆☆☆

17	破伤风受累肌肉	咀嚼肌	☆☆
18	营养不良早期表现	体重不增	☆☆☆
19	维生素缺乏性佝偻病激期临床表现	骨骼改变：3~6个月可见颅骨软化，重者乒乓球感； 7~8个月患儿可有方颅；还会有漏斗胸、X型腿，O型腿	☆☆☆
20	鹅口疮致病菌	白色念珠菌感染	☆☆☆
21	小儿腹泻分类	轮状病毒（引起秋冬季腹泻）和致病性大肠埃希菌（引起夏季腹泻）最常见	☆☆☆
22	疱疹性咽峡炎致病菌	柯萨奇病毒 A	☆☆☆
23	最常见的先天性心脏病是	室间隔缺损	☆☆☆
24	营养性缺铁性贫血	小细胞低色素性贫血	☆☆☆
25	婴儿缺铁的主要原因	铁摄入不足	☆☆☆
26	服用铁剂注意事项	两餐间服用；吸管或滴管服之；果汁促进铁的吸收	☆☆☆
27	儿童泌尿道感染最常见途径	上行感染	☆☆
28	急性肾小球肾炎活动护理	起病2周内卧床休息，待水肿消退、血压降至正常、肉眼血尿消失后，可下床轻微活动；血沉恢复正常可上学，但仍需避免体育活动，Addis计数正常后恢复正常生活	☆☆☆
29	化脓性脑膜炎确诊的重要依据	脑脊液检查	☆☆☆
30	麻疹出疹前特点	白色麻疹黏膜斑	☆☆☆
31	水痘出疹特点	斑疹、丘疹、疱疹、结痂	☆☆☆
32	猩红热致病菌	猩红热是由乙型A组溶血性链球菌引起的急性传染病	☆☆☆
33	中毒性细菌性痢疾检查	粪便中培养出痢疾杆菌	☆☆☆
34	惊厥持续状态	惊厥发作时间超过30min或两次发作间歇意识不能完全恢复	☆☆☆
35	结核菌素试验方法	皮内注射法，左前臂掌侧中、下1/3交界处，48~72h观察结果	☆☆☆
36	结核病的主要传播途径	呼吸道传播	☆☆
37	水痘治疗药物	阿昔洛韦是目前首选抗水痘-带状疱疹病毒的药物，在发病后24小时内用药才有效	☆☆☆

38	与风湿热相关致病菌	A 组乙型溶血性链球菌	☆☆☆
39	新生儿寒冷损伤综合征复温原则	逐步复温，循序渐进	☆☆☆
40	肾病综合征最根本病理生理改变	大量蛋白尿	☆☆☆