

2022年执业/助理医师资格考试

笔试高频精选冲刺题

中西医助理医师精选300题

套卷二【151-300题】

金英杰医学教育

151.(A1型题)可用于治疗温病初起及热毒泻痢的药物是

- A.金银花
- B.板蓝根
- C.白头翁
- D.蒲公英
- E.鱼腥草

答案:A

解析:●金银花具有清热解毒、疏散风热的作用,可治疗痈肿疔疖、温病初起、热毒血痢等。板蓝根具有清热解毒、凉血利咽的作用,治疗温病。白头翁清热解毒、凉血止痢,可治疗热毒血痢。鱼腥草具有清热解毒、消痈散结、利尿通淋的作用。蒲公英具有清热解毒、消痈散结、利尿通淋的作用,可治疗湿热黄疸。

152.(A1型题)功能活血利尿,兼可清热解毒的药是

- A.泽兰
- B.牛膝
- C.益母草
- D.瞿麦
- E.大蓟

答案:C

解析:●[考点]益母草的功效[分析]益母草能活血祛瘀,利尿消肿,治疗妇女血脉瘀阻之月经不调、经闭、产后瘀阻腹痛、跌打损伤等及小便不利、水肿,还能清热解毒,治疗疮痈肿毒、皮肤痒疹。

153.(A1型题)既能利尿通淋,又治湿热痹痛的药物是

- A.滑石
- B.通草
- C.木通
- D.地肤子
- E.生苡仁

答案:C

解析:●[考点]木通的主治证[分析]木通能利水通淋,泄热通乳,因其有通血脉,利湿热作用,能治疗湿热痹证。

154.(A1型题)含二硫化二砷矿物的药物是

- A.轻粉
- B.红粉
- C.白降丹
- D.雄黄
- E.朱砂

答案:D

解析:●[考点]雄黄的成分[分析]雄黄为含砷的结晶矿石雄黄(二硫化二砷),故答案是D。

155.(A1型题)下列哪味药物治疗中气下陷之久泻脱肛

- A.麻黄根
- B.浮小麦
- C.黄芪
- D.五味子
- E.白术

答案:C

解析:●黄芪能补气升阳,益卫固表,可治疗中气下陷,久泻脱肛,内脏脱垂。

156.(A1型题)下列哪味药物具有平肝潜阳,镇惊安神,纳气定喘的功效

- A.龙骨
- B.牡蛎
- C.磁石
- D.远志
- E.朱砂

答案:C

解析:●磁石、龙骨、牡蛎、远志、朱砂均能安神,仅磁石具有潜阳安神、纳气平喘的功效,故可选用;朱砂的功效为镇心安神,龙骨、牡蛎具有潜阳的功效,但没有纳气平喘之功,远志宁心安神、祛痰开窍,不符合条件,不可选用。

157.(A1型题)下列除哪组外都是镇心安神药组

- A.龙骨、牡蛎
- B.朱砂、磁石
- C.龟板、鳖甲
- D.珍珠、琥珀
- E.珍珠母、紫贝齿

答案:C

解析:此题暂无解析

158.(A1型题)下列哪味药物能够治疗临床表现为月经不调,伴有乳房胀痛,胁肋胀满,舌苔薄白,脉弦的病症

- A.川楝
- B.香附
- C.木香
- D.沉香
- E.橘皮

答案:B

解析:●川楝子具有行气止痛、杀虫疗癣的作用,可治疗肝郁化火所致诸痛证,还可用于虫积腹痛。香附疏肝理气、调经止痛,可治疗气滞胁痛、腹痛,肝郁月经不调,伴有乳房胀痛、胁肋胀满等。木香具有行气止痛的作用,可治疗脾胃气滞、泻痢里急后重、腹痛胁痛、黄疸等。沉香具有行气止痛、温中止呕、纳气平喘的作用,橘皮具有理气健脾、燥湿化痰的作用。

159.(A2型题)患者症见少腹急结,小便不利,谵语烦渴,至夜发热,其人如狂,舌有瘀点,脉涩。治疗应首选

- A.少腹逐瘀汤
- B.犀角地黄汤
- C.黄连解毒汤
- D.清瘟败毒饮
- E.桃核承气汤

答案:E

解析:●本证为下焦蓄血证。下焦蓄血则少腹急结,血瘀化热则谵语烦渴,至夜发热,瘀热甚则其人如狂。桃核承气汤为治下焦蓄血证的代表方剂,由桃核、大黄、桂枝、甘草、芒硝组成,能够破血下瘀。

160.(A2型题)患者食滞胃脘,脘腹痞满,噎腐吞酸,恶食呕逆,舌苔厚腻,脉滑。治疗应首选

- A.枳术丸
- B.健脾丸
- C.保和丸
- D.六君子汤
- E.参苓白术散

答案:C

解析:●本病属于食滞肠胃证,治疗应消食和胃。健脾丸健脾和胃,消食止泻。六君子汤可治疗脾胃气虚兼有痰湿证,可见呕吐等。保和丸为消食和胃剂。枳术丸可治疗脾虚气滞、饮食停聚之胸脘痞满、不思饮食等。参苓白术散可治疗脾虚泄泻证。

161.(A2型题)患者,女,3岁。高热神昏,痉厥抽搐,尿赤便秘,舌红绛苔干黄,脉数有力。治宜选用

- A.苏合香丸
- B.牛黄清心丸
- C.紫雪
- D.至宝丹
- E.安宫牛黄丸

答案:C

解析:●[考点]紫雪的主治证[分析]紫雪功能清热开窍,长于熄风止痉,兼可泻下通便。主治温热病,热闭心包及热盛动风证。症见高热烦躁,神昏谵语,痉厥,口渴唇焦,尿赤便秘,舌质红绛,苔黄燥,脉数有力或弦数,以及小儿热盛惊厥。

162.(A2型题)患者,男,8岁,面腮肿胀二天,伴发热,咽喉及颈部疼痛,有类似疾病接触传染史,舌燥口渴,舌红苔白兼黄,脉浮数有力。宜用方剂

- A.普济消毒饮
- B.养阴清肺汤
- C.银翘散
- D.黄连解毒汤

E.仙方活命饮

答案:A

解析:●[考点]普济消毒饮的主治[分析]普济消毒饮主治痄腮,即腮腺炎。局部肿胀疼痛,红肿不明显,由于是疫病,故有接触传染史。其他方剂不是主治该证的。

163.(A2型题)患者,女,36岁。证见倦怠乏力,食少便溏,四肢不温,月经量多,上臂和大腿皮下有瘀斑,心悸心慌。舌淡苔薄白,脉沉迟。治宜选用的方剂是

A.归脾汤

B.参苓白术散

C.理中汤

D.当归四逆汤

E.胶艾四物汤

答案:A

解析:●[考点]归脾汤的主治[分析]归脾汤的病机是思虑伤脾,导致血虚,血不养心,故而心悸心慌。脾虚不能统血,故出现月经量多。该例患者特征明显,故而容易判断。

164.(A2型题)患者症见饮食不化,肠鸣泄泻,脘腹痞闷,形体消瘦,舌苔腻,脉虚弱。治疗应首选

A.健脾丸

B.保和丸

C.四君子汤

D.参苓白术散

E.木香槟榔丸

答案:D

解析:●本题辨证为脾虚湿盛,健脾丸、保和丸擅消食和胃,健脾功效稍差,参苓白术散能健脾化湿,治疗脾虚湿盛证,四君子汤能健脾益气,用于脾气虚证,木香槟榔丸能行气消导,攻积泻热,用于积滞内停化热证,不符合条件不可选用。

165.(B型题)归脾汤的组成中含

A.酸枣仁、茯苓

B.酸枣仁、知母

C.龙眼肉、柏子仁

D.酸枣仁、柏子仁

E.远志、丹参

答案:A

解析:此题暂无解析

166.(B型题)血虚受寒,月经不调,经前腹痛者,宜选用何方治疗

A.复元活血汤

B.当归四逆汤

C.补阳还五汤

D.大柴胡汤

E.血府逐瘀汤

答案:B

解析:此题暂无解析

167.(B型题)复元活血汤的功用是

A.温经散寒, 养血通脉

B.补气活血通络

C.温经散寒, 祛瘀养血

D.活血化瘀, 疏肝通络

E.温经补血, 散寒通滞

答案:D

解析:此题暂无解析

168.(B型题)川芎茶调散中含

A.细辛、川芎、白芷、薄荷

B.黄芩、川芎、玄胡、薄荷

C.细辛、川芎、白芷、生地

D.细辛、川芎、玄胡、薄荷

E.黄芩、川芎、白芷、薄荷

答案:A

解析:此题暂无解析

169.(B型题)二陈汤中煎加乌梅的用意是

A.收敛肺气

B.安蛔止痛

C.涩肠止泻

D.敛肺止咳

E.敛阴止汗

答案:A

解析:此题暂无解析

170.(B型题)补阳还五汤中配伍当归的用意是

A.补血活血, 化瘀生新

B.养血和营, 活血通络

C.补血养肝, 和血调经

D.养血润燥, 止逆下气

E.补养心血, 以安神志

答案:B

解析:此题暂无解析

171.(B型题)具有行气疏肝, 散寒止痛功用的方剂是

A.枳实消痞丸

B.金铃子散

C.半夏厚朴汤

D.天台乌药散

E.柴胡疏肝散

答案:D

解析:●[考点]半夏厚朴汤及枳实消痞丸、金铃子散、天台乌药散、柴胡疏肝散的功用[分析]半夏厚朴汤的功用是行气散结、降逆化痰。枳实消痞丸的功用是消痞除满、健脾和胃。金铃子散的功用是疏肝泄热、活血止痛。天台乌药散的功用是行气疏肝、散寒止痛。柴胡疏肝散的功用是疏肝行气、活血止痛。

172.(B型题)以温阳化饮、健脾利湿为主要功用的方剂是

A.麻黄汤

B.止嗽散

C.小青龙汤

D.苓桂术甘汤

E.苏子降气汤

答案:D

解析:此题暂无解析

173.(A1型题)理中丸的组成药物是

A.附子、干姜、人参、白术

B.附子、干姜、白术、茯苓

C.附子、干姜、干草、白术

D.干姜、人参、白术、甘草

E.干姜、人参、茯苓、甘草

答案:D

解析:●理中丸用于姜温中祛寒,人参、白术、甘草补气健脾,治疗中焦虚寒证,符合条件可选用;附子长于温肾阳,茯苓偏于利水渗湿,故不选用。

174.(A1型题)“培土生金”法体现在下列哪方中

A.补中益气汤

B.百合固金汤

C.参苓白术散

D.四君子汤

E.人参蛤蚧散

答案:C

解析:●[考点]参苓白术散的配伍意义[分析]参苓白术散是“培土生金”法的代表方剂,以众多的补气健脾渗湿之品为主,伍以砂仁、桔梗理气行脾,开提肺气,调畅气机,即通过补脾土,间接受到益肺金的功效。

175.(A1型题)下列哪项是补阳还五汤主治证候的临床表现

A.小便不利

B.小便频数

C.大便秘结

D.大便溏薄

E.二便不利

答案:B

解析:●补阳还五汤可治疗中风后遗症,正气亏虚,淤血阻络。中风后正气亏虚,脉络瘀阻,筋脉肌肉失养,故见半身不遂,口角歪斜;气虚血滞,舌本失养,故语言蹇涩,口角流涎;气虚不能固摄,则小便频数,遗尿不禁。综上诸症,皆由正气亏虚,淤血阻络所致。

176.(A1型题)实脾散与真武汤共有的药物是

- A.附子、干姜、茯苓、白术
- B.附子、干姜、茯苓、甘草
- C.附子、生姜、白芍、白术
- D.附子、木香、茯苓、甘草
- E.附子、生姜、茯苓、白术

答案:E

解析:●实脾散为治疗脾肾阳虚,阳不化水,水气内停所致的阴水证,偏于温脾,其方药组成是厚朴、白术、木瓜、木香、草果仁、大腹子、附子、白茯苓、干姜、甘草、生姜、大枣。真武汤亦为脾肾阳虚,水气内停的水肿病,与实脾散不同之处是偏于温肾,其药物组成是茯苓、芍药、白术、生姜、附子。所以二者共同的药物组成是E。

177.(A1型题)贝母瓜蒌散的功效

- A.清热化痰、理气止咳
- B.润肺清热,理气化痰
- C.燥湿化痰,理气止咳
- D.燥湿化痰,理气和中
- E.理气化痰,温肺化饮

答案:B

解析:●贝母瓜蒌散由贝母、瓜蒌、花粉、茯苓、橘红、桔梗组成,具有润肺清热、理气化痰的作用,可治疗肺燥有痰者,以咳嗽痰稠、涩而难出为主要特征。

178.(A2型题)患者,男,50岁。面色白乏力,脘腹胀闷,纳减便溏,神疲肢冷,小便短少。身肿,腰以下甚。舌质淡,苔白腻,脉沉缓。治疗首选方

- A.附子理中丸合五苓散
- B.济生肾气丸合真武汤
- C.杞菊地黄丸
- D.金匱肾气丸
- E.无比山药丸

答案:A

解析:●身肿,腰以下甚乃阳虚之象;纳减便溏,神疲肢冷,舌质淡,苔白腻,脉沉缓为脾阳虚表现,治疗当采用温阳健脾利水法。济生肾气丸合真武汤温补肾阳,利水消肿,用于肾阳不足型水肿,不符合。杞菊地黄丸滋阴补肾,平肝明目,不符合。金匱肾气丸温补肾阳,亦治肾阳不足证,不符合。无比山药丸补肾益脾,无明显利水作用,不符合。附子理中丸能温阳健脾合五苓散利水渗湿,共用治疗脾阳亏虚所致的水肿,符合。

179.(A2型题)女, 52岁, 急性起病, 寒战, 高热, 全身衰弱, 痰稠呈砖红色胶冻状, 胸部X线检查结果为右侧肺可见实变阴影及蜂窝状脓肿, 叶间隙下坠。下列哪项诊断和治疗最适合

- A.金黄色葡萄球菌肺炎, 选用万古霉素治疗
- B.军团菌肺炎, 选用红霉素治疗
- C.支原体肺炎, 选用红霉素治疗
- D.肺炎克雷白杆菌肺炎, 选用半合成广谱青霉素加氨基糖苷类
- E.厌氧菌肺炎, 选用青霉素G治疗

答案:D

解析:●[考点]克雷白杆菌肺炎的诊治[分析]克雷白杆菌肺炎发生时, 渗出液粘稠且比重较大, 常使叶间隙下坠。由血液和粘液混合成砖红色胶冻状痰为此种肺炎的一个特征。可选用半合成广谱青霉素加氨基糖苷类联用治疗。

180.(A2型题)男性, 65岁, 慢性喘息性支气管炎病史20余年, 近5年来间断出现下肢浮肿, 7天前受凉后咳、痰、喘加重, 难以入睡, 时有躁动, 以下治疗错误的是

- A.抗感染
- B.化痰
- C.利尿
- D.营养支持
- E.安眠药镇静

答案:E

解析:●[考点]慢性肺源性心脏病的诊断和治疗[分析]患者老年男性, 有慢性肺疾病, 近5年来间断出现下肢浮肿, 考虑慢性肺源性心脏病可能性大。现因感染诱发病情加重, 应给予抗感染、化痰、解痉平喘、营养支持和改善右心功能等治疗。但应避免给予镇静剂, 以免出现呼吸中枢受抑制, 加重通气功能障碍, 甚至诱发肺性脑病。

181.(A2型题)男性, 45岁, 突然呕血400ml并伴黑便。血压100/70mmHg, 心肺(-), 可见腹壁静脉曲张, 肝未触及, 脾于肋下2cm可触及。应首选的治疗是

- A.静脉注射止血药
- B.静脉推注奥美拉唑(洛赛克)
- C.静脉滴注垂体后叶素
- D.静脉滴注代血浆
- E.冰盐水洗胃

答案:C

解析:●[考点]肝硬化上消化道出血的处理[分析]呕血, 黑便, 腹壁静脉曲张, 脾可触及, 考虑为门脉高压食管静脉破裂出血, 治疗首选血管加压素, 可降低门脉压。垂体后叶素的主要成分为血管加压素。

182.(A2型题)患者, 男性, 78岁, 症见喘逆剧甚, 张口抬肩, 鼻翼扇动, 面色苍白, 冷汗淋漓, 四肢厥冷, 面紫舌暗, 脉微欲绝, 治当选用

- A.二陈汤
- B.真武汤

- C.涤痰汤
- D.补肺汤
- E.独参汤

答案:E

解析:●[考点]慢性呼衰的辨证论治[分析]综观脉证,该患者属慢性呼衰的阳微欲脱证。治当益气温阳,固脱救逆。当用独参汤灌服。

183.(A2型题)患者男,67岁,久咳气逆,阵阵发作,痰少质粘,咳引胸胁疼痛,口干咽干,舌苔薄黄少津,脉象弦数,其治法宜用

- A.养阴清肝,化痰止咳
- B.清肺化痰,宣肃肺气
- C.清肺润燥,化痰止咳
- D.清肺泻肝,化痰止咳
- E.滋阴润肺,清肝止咳

答案:D

解析:●[考点]慢性支气管炎的辨证论治[分析]综合患者症、舌、脉表现,辨病属咳嗽,辨证属肝火犯肺。肝气郁结化火,上逆侮肺,肺失肃降,则咳嗽气逆,阵阵发作;木火刑金,炼液成痰,故痰少质粘;火邪伤津,故口干咽干;肝脉布于两胁,上注于肺,肝肺络气不和,故咳引胸胁疼痛;舌苔薄黄少津,脉象弦数,为肝火肺热之证。治当清肺泻肝,化痰止咳。

184.(A2型题)男性,30岁,上腹突发刀割样疼痛,很快波及全腹,体温39°C,腹部呈板状,有明显压痛、反跳痛和肌紧张,肝浊音界消失,肠鸣音消失。最可能诊断是

- A.急性化脓性胆囊炎
- B.胃十二指肠溃疡穿孔
- C.急性阑尾炎穿孔
- D.急性出血性胰腺炎
- E.急性梗阻性化脓性胆管炎

答案:B

解析:●[考点]胃十二指肠溃疡穿孔的诊断[分析]患者突发上腹剧痛、迅速发生全腹急性腹膜炎、肝浊音界消失,最可能的诊断应是胃十二指肠溃疡穿孔。

185.(A2型题)男性,60岁,心前区阵发性疼痛1个月,多在夜间发作。与活动无关。每次发作15分钟,发作时心电图II、III、aVF导联ST段抬高。首选治疗的药物是

- A.硝酸酯类
- B.β受体阻滞剂
- C.钙离子拮抗剂
- D.洋地黄类
- E.乙胺碘呋酮

答案:C

解析:●[考点]心绞痛的治疗[分析]该老年男性病人心前区疼痛的特点是多在夜间发作,与活动无关,疼痛呈发作性,且发作时心电图相关导联ST段抬高,符合典

型的变异型心绞痛，是由于冠状动脉痉挛所致。该类心绞痛的首选治疗药物是钙离子拮抗剂，可以扩张冠状动脉，解除冠状动脉痉挛，改善心肌血液供应。

186.(A2型题)患者，男，42岁，心悸气短，头晕乏力，胸痛胸闷，少气懒言，五心烦热，失眠多梦，舌红少苔，脉虚数，治疗方法是

- A.镇惊定志，养心定神
- B.补血养心，益气安神
- C.滋阴清火，养心安神
- D.清热化痰，宁心安神
- E.益气养阴，养心安神

答案:E

解析:●[考点]快速性心律失常的辨证论治[分析]综观脉症，患者为气阴两虚之快速性心律失常，治疗方法应为益气养阴，养心安神。

187.(A2型题)患者，女，62岁。双手指间关节肿痛7周，晨间关节僵硬，低热，实验室检查血红蛋白9.1g/dl，RF(+)，手和腕的X线片显示明确的骨质疏松。最有可能诊断为

- A.风湿热
- B.风湿性关节炎
- C.类风湿性关节炎
- D.SLE
- E.皮炎

答案:C

解析:●类风湿性关节炎特点具有小关节疼痛，晨僵，类风湿因子(RF)阳性即可确定为类风湿性关节炎。

188.(A2型题)一孕妇，26岁，妊娠7个月，贫血，头昏，无力，纳差，Hb45g/L，RBC $2.5 \times 10^{12}/L$ ，血常规提示:小细胞低色素性贫血。其贫血是

- A.再生障碍性贫血
- B.缺铁性贫血
- C.稀释性贫血
- D.维生素B12缺乏
- E.自身免疫性溶血性贫血

答案:B

解析:●[考点]贫血的诊断[分析]本试题临床病历提供了该孕妇对造血原料需求增加及纳差的病史，其贫血原因应围绕病史思考。小细胞低色素性贫血是缺铁性贫血的特点，故应选B。维生素B缺乏，属大细胞性贫血。

189.(A2型题)患者，女性，36岁，患慢性肾小球肾炎七年余，慢性肾功能不全，现见恶心呕吐，胸闷纳呆，口淡粘腻，口有尿味。应选用的治疗方药是

- A.杞菊地黄丸加减
- B.小半夏加茯苓汤加减
- C.五皮饮合五苓散加减
- D.参芪地黄汤

E.天麻钩藤汤加减

答案:B

解析:●[考点]慢性肾功能不全的辨证论治[分析]综观脉证,患者为慢性肾小球肾炎标实证中的湿浊证,治当和中降逆,化湿泄浊,方用小半夏加茯苓汤加减。

190.(A2型题)患者,男性,15岁,患急性白血病。症见皮肤瘀斑,鼻衄,齿龈出血,发热,五心烦热,口苦,口干,盗汗,乏力,体倦,面色晦滞,舌质红,苔黄,脉细数。治宜

A.黄连解毒汤合清营汤加减

B.温胆汤合桃红四物汤加减

C.知柏地黄丸合二至丸加减

D.五阴煎加减

E.葛根芩连汤加味

答案:C

解析:●[考点]急性白血病的辨证论治[分析]综观脉证,患者为急性白血病之阴虚火旺证,治宜滋阴降火,凉血解毒,方用知柏地黄丸合二至丸加减。

191.(A2型题)患者,女,40岁。3年前发现患有风湿性心脏瓣膜病,近半年体力活动明显受限,轻度活动即出现心悸,气短。心功能为

A.1级

B.2级

C.3级

D.4级

E.以上都不是

答案:C

解析:●心功能分四级:I常无,II常有,III低IV静定分级--

I级日常活动无心衰症状,II级日常活动出现心衰症状,III级低于日常活动则出现心衰症状,IV级静息时出现心衰症状。本病例体力活动明显受限,小于日常活动即引起心悸、气短、呼吸困难或心绞痛发作,符合“III低”,为心功能3级。

192.(A2型题)患者,女,61岁。由于急性广泛前壁心肌梗死发病12小时合并心力衰竭收入院进一步治疗,首选治疗心力衰竭的药物是

A.洋地黄

B.血管扩张剂

C.利尿剂

D.β受体阻滞剂

E.钙拮抗剂

答案:B

解析:●心肌梗死合并心力衰竭,主要治疗左心衰,可选用血管扩张剂减轻左心室后负荷。洋地黄类药物可能引起室性心律失常,宜慎用。

193.(A2型题)患者,男,58岁。近日因生气后出现胸膈痞闷,脘腹胀痛,噯腐吞酸,恶心呕吐,饮食不消。治疗应首选

- A.二陈汤
- B.平胃散
- C.越鞠丸
- D.藿香正气散
- E.枳实消痞丸

答案:C

解析:●生气可致肝气郁结,气郁日久化火;肝气犯脾,脾失健运,饮食内停,痰湿内生。痰、火、湿、食、气邪均有,故选用越鞠丸。

194.(B型题)咳嗽频剧,咳痰不爽,痰粘稠,常伴有鼻流黄涕,口渴,头痛,恶风,身热,舌苔薄黄,脉浮数。其治法是

- A.清热肃肺,润燥止咳
- B.宣肺清热,平肝化痰
- C.清热化痰,滋阴润肺
- D.肃肺化痰,化瘀通络
- E.疏风清热,肃肺化痰

答案:E

解析:此题暂无解析

195.(B型题)干咳,连声作呛,痰少而粘,不易咳出,口干咽燥,初起鼻塞,头痛,微寒,身热,舌红少津,苔薄黄,脉浮数。其治法是

- A.清热肃肺,润燥止咳
- B.宣肺清热,平肝化痰
- C.清热化痰,滋阴润肺
- D.肃肺化痰,化瘀通络
- E.疏风清热,肃肺化痰

答案:A

解析:●[考点]慢性支气管炎的辨证论治[分析]第1小题辨证为风热犯肺咳嗽,治当疏风清热,肃肺化痰;第2小题辨证为温燥犯肺咳嗽,治当清热肃肺,润燥止咳。

196.(B型题)气虚血瘀型心绞痛的治疗方药是

- A.血府逐瘀汤
- B.栝楼薤白半夏汤合涤痰汤
- C.补阳还五汤
- D.枳实薤白桂枝汤合当归四逆散
- E.生脉散合炙甘草汤

答案:C

解析:此题暂无解析

197.(B型题)心血瘀阻型心绞痛的治疗方药是

- A.血府逐瘀汤
- B.栝楼薤白半夏汤合涤痰汤
- C.补阳还五汤
- D.枳实薤白桂枝汤合当归四逆散

E.生脉散合炙甘草汤

答案:A

解析:●[考点]心绞痛的辨证论治[分析]气虚血瘀型心绞痛的治疗方法是益气活血,通脉止痛,方药用补、阳还五汤。心血瘀阻型心绞痛的治疗方法是活血化瘀,通脉止痛,方药用血府逐瘀汤。

198.(B型题)降压治疗的目标是使血压降至

A.血压 \leq 130/85mmHg

B.血压 \leq 140/90mmHg

C.血压 \leq 160/90mmHg

D.血压 \leq 110/70mmHg

E.血压 \leq 120/80mmHg

答案:B

解析:此题暂无解析

199.(B型题)中青年患者或合并有糖尿病、肾病变患者,血压应控制在

A.血压 \leq 130/85mmHg

B.血压 \leq 140/90mmHg

C.血压 \leq 160/90mmHg

D.血压 \leq 110/70mmHg

E.血压 \leq 120/80mmHg

答案:A

解析:●[考点]高血压病的治疗目标[分析]根据国际对高血压的诊断治疗统一标准,降压治疗的达标血压为 \leq 140/90mmHg,对合并有糖尿病或肾病患者、中青年患者则要求达标血压为 \leq 130/85mmHg。

200.(B型题)慢性肾小球肾炎患者,尿蛋白 \geq 1g/d,血压应控制在

A.120/70mmHg以下

B.125/75mmHg以下

C.130/80mmHg以下

D.140/90mmHg以下

E.140/85mmHg以下

答案:B

解析:此题暂无解析

201.(B型题)慢性肾小球肾炎患者,尿蛋白 \leq 1g/d,血压应控制在

A.120/70mmHg以下

B.125/75mmHg以下

C.130/80mmHg以下

D.140/90mmHg以下

E.140/85mmHg以下

答案:C

解析:●[考点]慢性肾小球肾炎的治疗[分析]高血压是加速肾小球硬化、促进肾功能恶化的重要因素,积极控制高血压是慢性肾小球肾炎治疗的重要环节。要力争

把血压控制在理想水平,尿蛋白 $\geq 1\text{g/d}$,血压应控制在 $125/75\text{mmHg}$ 以下;尿蛋白 $< 1\text{g/d}$,血压控制在 $130/80\text{mmHg}$ 以下。

202.(A2型题)男性,35岁,稍长距离步行后感右小腿疼痛,肌肉抽搐而跛行,稍休息后症状消失。平时感右足发凉,怕冷,有麻木感。右足背动脉搏动减弱。应考虑

- A.血栓性静脉炎
- B.深静脉血栓形成
- C.血栓闭塞性脉管炎(营养障碍期)
- D.血栓闭塞性脉管炎(局部缺血期)
- E.动脉粥样硬化症

答案:D

解析:●[考点]血栓闭塞性脉管炎的诊断[分析]根据患者平时感右足发凉,怕冷,麻木感,轻度间歇跛行,稍休息后可缓解,检查足背动脉搏动减弱,符合血栓闭塞性脉管炎局部缺血期表现。三、

203.(B型题)病变区和正常皮肤界限清楚

- A.疔
- B.痈
- C.丹毒
- D.急性蜂窝织炎
- E.淋巴管炎

答案:C

解析:此题暂无解析

204.(B型题)皮肤可见“红线”的是

- A.疔
- B.痈
- C.丹毒
- D.急性蜂窝织炎
- E.淋巴管炎

答案:E

解析:●[考点]浅部软组织化脓性感染的临床表现[分析]丹毒是皮肤及网状淋巴管的急性炎症,由 β -

溶血性链球菌从皮肤、粘膜的细小伤口入侵所致,表现为局部片状红疹,颜色鲜红,中间较淡,边缘清楚。急性浅层淋巴管炎可以出现皮肤的“红线”,在皮肤伤口的近侧,硬而有压痛。是细菌侵入浅层淋巴管所致。

205.(A1型题)全脊椎麻醉的主要危险是

- A.低血压
- B.剧烈疼痛
- C.麻醉作用过久
- D.呼吸心跳骤停
- E.损伤脊髓导致截瘫

答案:D

解析:硬膜外麻醉所用的麻醉药量较蛛网膜下腔麻醉大,若蛛网膜下腔麻醉范围失控,或者硬膜外麻醉误造成蛛网膜下腔麻醉,则全部或大部分麻药注入蛛网膜下腔,即可导致全部脊神经被阻滞。一旦发生,患者可在注药后短时间内血压下降,意识模糊,甚至因呼吸心跳骤停导致死亡。因此,呼吸心跳骤停是最危险的。

206.(A1型题)下列预防和治疗术后肺不张的措施中,哪项是不恰当的

- A.鼓励咳痰
- B.防止呕吐
- C.术前锻炼深呼吸
- D.术后胸、腹部切口应紧紧固定或绑扎
- E.减少肺泡和支气管内分泌物增多,如术前2周应禁烟

答案:D

解析:●[考点]术后并发症的处理[分析]预防和治疗术后肺不张的一些措施是为了保持病人顺畅的呼吸活动,如何保持呢?主要是术前就要开始练习深呼吸、停止吸烟、术后鼓励咳痰,去除或避免过紧的胸部包扎与固定,以免影响和限制呼吸。术后防止呕吐以免引起误吸。故D项的做法是不恰当的。

207.(A1型题)诊断乳房深部脓肿的主要依据是

- A.恶寒发热,乳房触痛
- B.乳房红肿热痛
- C.穿刺抽出脓性液体
- D.局部检查有波动感
- E.超声检查提示有液平

答案:C

解析:此题暂无解析

208.(A1型题)关于化学消毒灭菌法的叙述正确的是

- A.药液应不定期更换
- B.消毒物品至少应有2/3没入消毒剂中
- C.器械从消毒剂中取出后可直接用于病人
- D.沾有脓血的物品可直接投入消毒剂中消毒
- E.对金属有腐蚀作用的药液不能用于浸泡器械

答案:E

解析:●[考点]化学消毒灭菌法[分析]用化学消毒剂消毒时,药液应按使用期限定期更换;消毒物品应与药液充分接触;经浸泡消毒器械在使用前必须用无菌生理盐水冲洗后再用;物品必须去除脓血或油污等污物并擦干后再浸泡;对金属有腐蚀作用的药液不可用于器械浸泡消毒。

209.(A1型题)血胸欲行胸腔闭式引流术的最佳引流位置是

- A.腋前线第6~8肋间
- B.腋前线与腋中线之间第6~8肋间
- C.腋中线第6~8肋间
- D.腋中线与腋后线之间第6~8肋间

E.腋后线第6~8肋间

答案:D

解析:●[考点]闭式胸腔引流的部位[分析]血胸闭式引流的位置在腋中线与腋后线之间第6或第7肋间隙。气胸是在前胸壁锁骨中线第2肋间隙(第2~3肋间)。

210.(A1型题)急性肾衰少尿期的治疗哪项不妥

A.大量供给电解质

B.防治高血钾

C.纠正酸中毒

D.血液净化

E.高糖、低蛋白、高维生素饮食

答案:A

解析:●[考点]急性肾衰少尿期处理[分析]少尿期特别注意水中毒和高血钾的防治,一定要限制水分和电解质的输入,所以不能大量供给电解质,量出为人补充即可。

211.(A1型题)破伤风的平均潜伏期为

A.1天

B.2~5天

C.6~12天

D.11~15天

E.16~30天

答案:C

解析:●[考点]破伤风的潜伏期[分析]破伤风是破伤风杆菌侵入人体伤口、繁殖、产生毒素引起的一种急性特异性感染。潜伏期可在24小时内,也可达数月,但平均6~12天。

212.(A1型题)胎火胎毒之丹毒,治疗方药为

A.普济消毒饮

B.龙胆泻肝汤

C.五神汤合葶藶分清饮

D.犀角地黄汤

E.清瘟败毒饮

答案:D

解析:●[考点]丹毒的中医治疗[分析]胎火胎毒之丹毒,多见于新生儿,治当凉营清热解毒,方选犀角地黄汤加减。

213.(A1型题)疖的特点

A.易脓、易溃、易敛

B.易成走黄之势

C.易内陷

D.易溃而不易敛

E.多伴全身症状

答案:A

解析:●[考点]疖的特点[分析]疖易脓、易溃、易敛,根浅,色红。

214.(A1型题)下列有关体表感染的描述,错误的是

- A.疖是毛囊与邻近皮脂腺的化脓性感染
- B.痈是多数散在的、不相关联的疖病
- C.丹毒是皮内网状淋巴管的炎性病变
- D.急性蜂窝织炎是皮下结缔组织的感染
- E.脓肿是急性感染后的局限性脓液积聚

答案:B

解析:痈是相邻的多个毛囊及其周围软组织的急性化脓性感染。故错误描述是B。

215.(A1型题)外科病人在创伤、手术后蛋白质的日需量是

- A.0.5~0.6g/kg
- B.0.8~1.0g/kg
- C.1.2~1.5g/kg
- D.1.6~2.0g/kg
- E.2.0~3.0g/kg

答案:E

解析:●[考点]外科病人蛋白质需要量[分析]蛋白质是维持生命的主要组成成分。外科病人在创伤或手术后分解代谢占优势,蛋白质日需量可按2~3g/kg供给。

216.(A1型题)破伤风最初的症状是

- A.角弓反张
- B.四肢抽搐
- C.张口困难
- D.呼吸急促
- E.神志不清

答案:C

解析:破伤风典型的临床表现是肌肉痉挛性收缩。阵发性肌肉强烈痉挛,首先影响咀嚼肌,随后影响的肌群顺序是:面部表情肌,颈、背、腹、四肢肌,最后是膈肌。相应最先出现的表现是:张口困难(牙关紧闭)。故本题选C。过关点睛:破伤风最先出现的症状是张口困难。

217.(A1型题)外科急诊不合作内镜检查的是

- A.上消化道出血
- B.下消化道出血
- C.梗阻性黄疸
- D.上消化道异物
- E.多种炎性急腹痛

答案:E

解析:●[考点]外科急诊内镜的适应证[分析]上、下消化道出血时,经内镜检查不但可发现出血点,还可进行相应的止血治疗。上消化道异物时可经内镜检查发现后取出异物,梗阻性黄疸时,也可经内镜检查及造影,明确梗阻的平面并判断引

起梗阻的原因,因此上述四种情况均适合作内镜检查。唯炎性急腹痛时不适宜于施行内镜检查,故应选择E。

218.(A1型题)在鉴别单纯性肠梗阻与绞窄性肠梗阻时,最有意义的化验检查项目是

- A. 血气分析
- B. 血红蛋白测定
- C. 血白细胞计数
- D. 尿常规检查
- E. 呕吐物隐血试验

答案:E

解析:绞窄性肠梗阻可有血液浓缩,白细胞计数和中性粒细胞比例增高,水电解质酸碱平衡失调。呕吐物和大便作潜血试验阳性者考虑,肠管有血运障碍。

219.(A1型题)直肠指检不易发现的病变是

- A. 肛瘘
- B. 直肠息肉
- C. 内痔
- D. 肛管直肠癌
- E. 盆腔脓肿

答案:C

解析:此题暂无解析

220.(A1型题)在进行乳房物理检查时,不正确的是

- A. 应按外上、外下、内下、内上、中央的顺序检查乳房
- B. 先检查健侧再检查患侧乳房
- C. 用手指轻捏乳房及肿物,以体会肿物情况
- D. 用手指掌面检查腋窝淋巴结情况
- E. 乳头溢液需观察溢液量及色泽等

答案:C

解析:●[考点]乳房的检查方法[分析]乳腺的检查应采取坐位或平卧位,用手指掌面而不是手指尖打诊,不要用手指捏乳腺组织,以防将捏到的腺组织当作肿块;检查要按照外上、外下、内下、内上、中央的顺序进行,不能遗忘腋窝淋巴结,应先查健侧,后查患侧;对于乳房溢液应观察记录量及色泽。

221.(A1型题)肾损伤非手术疗法不正确的是

- A. 抗休克治疗
- B. 密切观察
- C. 应用止血剂、止痛和镇静剂
- D. 抗感染治疗
- E. 血尿减轻后即可下床活动

答案:E

解析:●[考点]肾损伤的保守治疗[分析]肾损伤的非手术治疗,绝对卧床休息应2~4周,病情稳定,尿液检查正常才能下地活动,否则有可能再次引起出血,伤后2

~3个月内不宜参加体力劳动或其他剧烈运动。因此E项是不对的。A、B、C、D四项都是正确的。

222.(A1型题)判断前列腺大小较准确的检查方法是

- A.残余尿测定
- B.B超
- C.膀胱造影
- D.直肠指诊
- E.膀胱镜检查

答案:B

解析:●[考点]前列腺增生的检查[分析]判断前列腺大小较准确的方法是B超,经腹壁B超可清晰显示前列腺体积大小,增生腺体是否突入膀胱,还可测定膀胱残余尿量。经直肠超声对前列腺内部结构分辨率更为精确,目前已普遍采用。

223.(A1型题)食管癌早期诊断简易而有效的方法是

- A.X线食管钡透
- B.食管镜检查
- C.带网气囊检查
- D.气管镜检查
- E.同位素扫描

答案:A

解析:此题暂无解析

224.(A1型题)下列哪种阑尾炎宜采用非手术治疗

- A.急性化脓性阑尾炎
- B.急性坏疽性阑尾炎
- C.阑尾脓肿
- D.阑尾穿孔
- E.阑尾周围脓肿

答案:E

解析:●[考点]阑尾炎的治疗[分析]绝大多数急性阑尾炎确诊后,应早期施行阑尾切除术,早期单纯性阑尾炎手术操作简单,并发症少。急性化脓性阑尾炎和坏疽性阑尾炎,也应行阑尾切除术,腹腔如有脓液,应仔细清除,注意保护伤口。阑尾脓肿尚未穿孔破溃,按化脓性阑尾炎处理,穿孔性阑尾炎除上述外,必要时还要放置腹腔引流。阑尾周围脓肿病情较稳定者,宜采用非手术治疗,应用抗生素等治疗,待急性炎症消退后3个月,再择期手术,切除阑尾。如非手术治疗效果不好,有扩大趋势则行切开引流术。

225.(A1型题)关于溃疡性结肠炎的叙述,下列哪项不是此病的典型表现

- A.本病的病理特点是结肠粘膜有广泛的溃疡形成
- B.最常受累的部位是升结肠和回肠末端
- C.主要症状是腹泻,带有脓血及粘液
- D.钡剂灌肠和纤维结肠镜是最有价值的检查

E.症状反复发作、久治不愈者癌变率高

答案:B

解析:●[考点]溃疡性结肠炎[分析]溃疡性结肠炎是直、结肠的非特异性炎性疾病。病理特点是结肠粘膜广泛的溃疡形成。主要症状是腹泻,带有脓血及粘液。X线钡灌肠和纤维结肠镜检查对诊断最有价值。反复发作、病程长、久治不愈者,应警惕癌变的可能。此病虽可能侵犯全部结肠甚至波及回肠末段,但最常累及的部位是直肠和乙状结肠。

226.(A1型题)肾损伤早期手术指征是

- A.开放性肾损伤
- B.严重肾裂伤
- C.肾血管损伤
- D.合并其他脏器损伤
- E.以上都包括

答案:E

解析:●[考点]肾损伤的治疗[分析]肾损伤早期手术指征包括A、B、C、D四项。

227.(A2型题)孕40周临产,规则宫缩12小时,破膜10小时。肛查:宫口开大8cm, S+1,目前的诊断以下哪项正确

- A.胎膜早破
- B.正常潜伏期
- C.正常活跃期
- D.潜伏期延长
- E.第一产程延长

答案:C

解析:●[考点]正常产程的划分、各期的临床表现、胎膜早破的定义[分析]该病例在临产2小时后破膜,故不能诊断胎膜早破。临产12小时,宫口开大8cm,目前已进入正常活跃期。

228.(A2型题)某产妇足月妊娠,阴道自然分娩一男婴,重4000g,胎儿娩出后15分钟,阴道突然出血约300ml,此时最恰当的处理是

- A.用力牵拉脐带
- B.用力按摩子宫
- C.手取胎盘
- D.检查会阴有无裂伤
- E.肌肉注射宫缩剂

答案:C

解析:●[考点]产后出血的防治、正确娩出胎盘的时机和方法[分析]一般胎儿娩出后待出现胎盘剥离征象时协助胎盘娩出。在等待过程中若阴道出血较多,应迅速娩出胎盘,必要时手取胎盘。强行牵拉脐带或按摩子宫可导致胎盘剥离不全。检查会阴伤口、肌肉注射宫缩剂多在胎盘娩出后进行。

229.(A2型题)24岁未婚妇女,减肥后月经稀发,继之闭经6个月,为了解卵巢功能,下述哪项检查最简便、易行、可靠

- A.测定血中性激素水平
- B.阴道细胞学检查
- C.内膜活检病理检查
- D.宫颈粘液检查
- E.基础体温测定

答案:A

解析:●[考点]闭经原因的诊断、卵巢功能测定的方法及意义[分析]题中列举的方法均可测定卵巢功能,对未婚妇女来讲,最常用而且简便、易行的方法是测定血中性激素水平、即E₂、FSH、LH、PRL、P、T。

230.(A2型题)患者,女,45岁,已婚。近3个月月经量多,伴经期小腹胀痛,周期26天,经前乳房胀痛,心烦,舌有瘀斑,苔薄,脉细弦。妇科检查:子宫增大如孕8周大小,表面不规则突起,质硬。其诊断是:

- A.月经过多
- B.癥瘕
- C.绝经前后诸证
- D.崩漏
- E.痛经

答案:B

解析:◆妇女胞中结块,伴有或痛或胀或满或出血者,称为症瘕。症者,坚硬不移,痛有定处;瘕者,推之可移,痛无定处。大抵症属血病,瘕属气病。但气血密切相关,症瘕亦难分割,故统称为症瘕。妇科检查发现盆腔有包块,或在子宫,或在附件,也可在宫旁组织间。或伴有痛、胀、满的自觉症状,或兼见月经异常或经期外的不正常出血。必要时借助B超检查或Crr扫描,或核磁共振,以了解肿块的位置、大小及性质。故本题选B。三、

231.(B型题)产褥中暑暑犯心包证治疗方剂为

- A.白虎汤
- B.清暑益气汤
- C.安宫牛黄丸、紫雪丹、至宝丹
- D.生脉散
- E.人参白虎汤

答案:C

解析:●[考点]产褥中暑的辨证论治[分析]产褥中暑暑伤津液证治疗方法为清热解暑,益气生津,方用清暑益气汤;产褥中暑暑犯心包证治疗方法为清心开窍,方用安宫牛黄丸、紫雪丹、至宝丹。

232.(B型题)妊娠合并急性肾盂肾炎心火偏亢证治疗方剂为

- A.知柏地黄丸
- B.导赤散
- C.加味五淋散
- D.八正散
- E.猪苓汤

答案:B

解析:●[考点]妊娠合并急性肾盂肾炎的辨证论治[分析]妊娠合并急性肾盂肾炎阴虚火旺证治疗方法为滋阴清热通淋,佐以安胎,方用知柏地黄丸;妊娠合并急性肾盂肾炎心火偏亢证治疗方法为清热泻火,润燥通淋,方用导赤散。

233.(B型题)常规体检发现子宫正常大小前位,活动好,一侧附件区可触及5~6cm直径囊实性包块,表面光滑,可活动,无压痛。可能的诊断为

- A.盆腔子宫内膜异位症
- B.盆腔结核
- C.卵巢恶性肿瘤
- D.卵巢畸胎瘤
- E.慢性盆腔炎

答案:D

解析:●[考点]各种盆腔包块的特征、临床诊断与鉴别诊断[分析]盆腔子宫内膜异位、盆腔结核、卵巢恶性肿瘤、输卵管卵巢炎性包块均可表现为盆腔囊实性包块,不活动,与子宫粘连;伴有腹水者多考虑恶性肿瘤,附件区不规则串珠样结节多考虑盆腔结核,继发痛经进行性加重,应多考虑内膜异位症。囊实性中等大小、光滑活动的包块,应多考虑卵巢畸胎瘤。当然应通过更详细的病史及辅助检查(B超、血CA125、CT或MRI、血象等)进一步鉴别。

234.(B型题)正常妊娠时,绒毛膜促性腺激素出现高峰,是在末次月经后的

- A.4~6周
- B.8~10周
- C.12周
- D.16周
- E.20周

答案:B

解析:此题暂无解析

235.(B型题)生殖器结核常见的症状是

- A.高烧,白带增多,子宫及附件区压痛,WBC升高
- B.停经,下腹痛,阴道出血
- C.腹痛由脐周开始,后转移至右下腹麦氏点
- D.不孕,消瘦,输卵管碘油造影呈串珠状
- E.卵巢囊肿病史,运动后突发一侧下腹痛,B超检查囊肿消失,盆腔有少量积液

答案:D

解析:●急性盆腔炎常见的症状是高热、寒战、阴道分泌物增多,常呈脓性,下腹痛,压痛及反跳痛明显,血白细胞总数及中性粒细胞增高。生殖器结核常见的症状是不孕,消瘦,输卵管碘油造影呈串珠状。而腹痛由脐周开始,后转移至右下腹麦氏点为急性阑尾炎的症状。E为卵巢囊肿破裂的症状。停经,下腹痛,阴道出血是先兆流产的症状。

236.(B型题)最常应用的侵袭性产前诊断技术为

- A.绒毛活检术
- B.超声影像检查

- C.羊膜腔穿刺术
- D.脐带血穿刺术
- E.孕妇外周血分离胎儿细胞

答案:C

解析:●[考点]产前诊断的方法及适应证[分析]绒毛活检术是早孕期对胎儿进行染色体分析、基因或酶代谢等遗传性疾病的诊断方法。超声影像可准确检测胎儿有无结构异常,如头颅、脊柱、心脏病等。羊膜腔穿刺术是最常应用的侵袭性产前诊断技术,一般在16~20周进行。脐带血穿刺术操作难度大、技术要求最高、对胎儿的危险最大。产前诊断的方法还有胎儿镜检查 and 孕妇外周血分离胎儿细胞技术等。

237.(B型题)治疗闭经气血虚弱证,应首选的方剂是

- A.知柏地黄丸
- B.归肾丸
- C.六味地黄丸
- D.人参养营汤
- E.肾气丸

答案:D

解析:●肝肾不足型闭经的治法为补肾益气,调理冲任,方选加减苁蓉菟丝子丸或归肾丸;气血虚弱证当补气养血调经,方用人参养营汤。

238.(B型题)妊娠合并急性病毒性肝炎热毒内陷证的治疗方剂为

- A.茵陈蒿汤
- B.胃苓汤
- C.逍遥散
- D.犀角地黄汤合黄连解毒汤
- E.栀子豉汤

答案:D

解析:●[考点]妊娠合并急性病毒性肝炎的辨证论治[分析]妊娠合并急性病毒性肝炎肝郁脾虚证的治疗方法为疏肝理气,健脾安胎,方用逍遥散;妊娠合并急性病毒性肝炎热毒内陷证的治疗方法为清热解毒,凉血救阴,方用犀角地黄汤合黄连解毒汤。

239.(B型题)妇女卵巢功能逐渐衰退,生殖器官开始萎缩并向衰退过渡的时期称为

- A.新生儿期
- B.幼年期
- C.青春期
- D.性成熟期
- E.更年期

答案:E

解析:此题暂无解析

240.(A1型题)不孕症的治疗,以下哪项不妥

- A.手术治疗器质性疾病,如阴道横膈、宫颈狭窄等
- B.促排卵首选LHRH
- C.溴隐亭治疗高泌乳血症
- D.用雌激素改善宫颈粘液
- E.输卵管阻塞的手术治疗

答案:B

解析:●[考点]不孕症的治疗方法及合理选择[分析]促排卵首选克罗米芬, HCG常与其合用。若克罗米芬无效, 可选用HMG+HCG; 若为下丘脑性无排卵, 可用LHRH。

241.(A1型题)下列关于新产后和哺乳期的生理特点的叙述, 错误的是

- A.有恶露的排出, 1月左右干净
- B.体温在产后24小时内略升高
- C.产褥早期, 产妇血液处于高凝状态
- D.12小时可开始哺乳
- E.生理性闭经

答案:D

解析:此题暂无解析

242.(A1型题)关于输卵管通畅试验, 以下哪项错误

- A.适用于原发或继发不孕症的诊断
- B.适用于输卵管粘连不通的治疗
- C.碘油造影的诊断准确性优于输卵管通液
- D.应在月经干净后3~7天进行
- E.腹腔镜下输卵管通液是判断输卵管是否通畅的金标准

答案:B

解析:●[考点]输卵管通畅试验各种方法的合理应用、临床意义[分析]通液对输卵管轻度粘连可能有治疗作用。输卵管碘油造影术不仅可较准确显示输卵管是否梗阻, 而且可显示阻塞的部位和长度, 为复通治疗提供可靠资料, 故优于输卵管通液。通畅试验的禁忌为: 内外生殖器急性炎症期、全身严重疾病、阴道出血等。

243.(A1型题)与月经、胎孕关系密切的经脉主要是

- A.冲脉、督脉
- B.冲脉、任脉
- C.冲脉、带脉
- D.任脉、督脉
- E.任脉、带脉

答案:B

解析:●[考点]冲任二脉功能[分析]冲脉是气血运行的要冲, 为十二经之海、血海, 为月经之本。任脉是人体妊养之本, 为阴脉之海, 主胞胎, 总司精、血、津、液等一身之阴。督脉为阳脉之海, 总督一身之阳。

244.(A1型题)盆腔炎的病原菌及传染途径, 以下哪项正确

- A. 盆腔炎与性生活没关系
- B. 盆腔感染的主要菌种是厌氧菌
- C. 主要是需氧菌和厌氧菌的混合感染
- D. 病原菌以血循环传播为主
- E. 病原菌以沿生殖器粘膜上行蔓延为主

答案:C

解析:●[考点]盆腔炎的病原菌及传染途径[分析]盆腔炎受STD的影响很大,与性生活紊乱、开始过早有关;盆腔炎主要是需氧菌和厌氧菌的混合感染。病原菌以经淋巴系统蔓延为主。

245.(A1型题)下述哪项不属于异位妊娠

- A. 输卵管妊娠
- B. 卵巢妊娠
- C. 腹腔妊娠
- D. 宫颈妊娠
- E. 子宫残角妊娠

答案:E

解析:●[考点]异位妊娠的部位、定义[分析]受精卵于子宫体腔外着床,称为异位妊娠。包括输卵管妊娠、卵巢妊娠、宫颈妊娠及腹腔妊娠。子宫残角妊娠属于发育异常的残角子宫的宫腔内妊娠,不属异位妊娠。

246.(A1型题)青春期功血的治则

- A. 防止子宫内膜病变
- B. 直接调整周期促排卵
- C. 减少周期
- D. 调整垂体与性腺功能
- E. 止血,减少经量

答案:B

解析:●功血的治疗原则是止血、调整周期,无排卵型功血促进排卵,排卵型功血促进黄体功能的恢复。青春期及生育期无排卵型功血以止血,调整周期,促排卵为主;绝经期患者以止血、调整周期,减少经量,防止子宫内膜病变为主,故答案选B。

247.(A1型题)以下哪项不属于胎萎不长的病因

- A. 气血不足
- B. 气滞血瘀
- C. 脾虚
- D. 血寒宫冷
- E. 肾虚

答案:B

解析:●[考点]胎萎不长的病因[分析]胎萎不长的主要机理是气血不足以荣养胎元,使胎元生长迟缓。主要病因有气血虚弱、脾肾不足、血寒宫冷。

248.(A1型题)妊娠合并心脏病的妊娠期处理,以下哪项不合适

- A. 孕期适当休息, 避免过劳
- B. 妊娠20周后建议每周检查一次
- C. 孕中晚期常规给予铁制剂, 及早预防和治疗贫血
- D. 孕晚期常规给予抗生素, 积极预防上呼吸道感染
- E. 有早期心衰的孕妇, 给予地高辛治疗

答案:D

解析: ●[考点]妊娠合并心脏病的妊娠期处理原则[分析]除D项外均正确, 应积极防治上呼吸道感染, 抗生素适于治疗, 不用于常规预防。另外, 如因心功能不良不适于妊娠者, 应在妊娠12周内行人工流产; 若有心衰, 应控制心衰后终止妊娠。

249.(A1型题)关于巨大胎儿, 下列描述哪项正确

- A. 胎儿体重达到或超过4000克
- B. 主要与遗传因素有关
- C. B超对估计胎儿体重无帮助
- D. 一经诊断, 临产前均应剖宫产
- E. 与宫缩乏力、产后出血无关

答案:A

解析: ●[考点]巨大胎儿的定义、诊断及处理[分析]巨大胎儿与遗传因素、孕期糖尿病、过期妊娠有关; B超可估计胎儿体重、排除畸形等; 一经诊断, 不宜试产过久, 估计胎儿体重 >4500 克, 应剖宫产; 可发生宫缩乏力、产后出血, 应积极防治。

250.(A1型题)下列各项, 不属引起外阴瘙痒的全身因素的是

- A. 白癜风
- B. 糖尿病
- C. 妊娠期肝内胆汁淤积症
- D. 黄疸
- E. 精神因素

答案:A

解析: 此题暂无解析

251.(A2型题)男婴, 8个月。腹泻3天, 大便10余次/日, 蛋花汤样伴少量粘液, 呕吐4~5次/日。嗜睡, 口干, 尿量少。体检: 精神萎靡, 皮肤较干燥、弹性较差, 眼窝及前囟凹陷, 哭时泪少。血钠135mmol/L, 血钾4mmol/L。该患儿诊断为婴儿腹泻合并

- A. 轻度等渗脱水
- B. 中度等渗脱水
- C. 重度低渗脱水
- D. 中度高渗脱水
- E. 重度等渗脱水

答案:B

解析: ●[考点]婴儿腹泻病病例分析[分析]8个月婴儿腹泻大便次数增多10余次/日, 性质为蛋花汤样伴粘液, 伴有呕吐, 诊断婴儿腹泻病。体检精神萎靡, 皮肤较干

燥、弹性较差，眼窝及前囟明显凹陷，哭时泪少。符合中度脱水。血钠、血钾正常为等渗性。

252.(A2型题)5岁男孩，咳嗽4个月，凌晨及活动后加剧，服用多种抗生素无效，服用特布他林(博利康尼)后有缓解。查体：无发热，面及颈部散在湿疹。两肺呼吸音粗，该病儿最可能的诊断是

- A.毛细支气管炎
- B.支气管异物
- C.咳嗽变异性哮喘
- D.支气管淋巴结核
- E.儿童哮喘

答案:C

解析：●[考点]咳嗽变异性哮喘诊断[分析]咳嗽持续大于1个月；长期抗生素治疗无效；支气管扩张剂可使咳嗽缓解，符合咳嗽变异性哮喘的诊断标准。支气管扩张剂有效是诊断本病的基本条件。

253.(A2型题)一个健康儿前囟1.0cm×1.0cm，体重7kg，刚能独坐一会儿、用手摇玩具，能认识熟人和陌生人，其月龄为

- A.3个月
- B.6个月
- C.8个月
- D.10个月
- E.12个月

答案:B

解析：●[考点]婴儿体格与动作发育分析[分析]体重7kg，刚能独坐一会儿，用手摇玩具，能认识熟人和陌生人，其月龄为6个月。

254.(A2型题)患儿，男性，3岁，患麻疹未及时医治，现症见高热烦躁，神昏谵语，偶有抽搐，皮疹遍及全身，色紫红，舌红绛，脉弦数。治疗宜用

- A.宣毒发表汤加减
- B.清热透表汤加减
- C.沙参麦冬汤
- D.麻杏石甘汤加减
- E.羚角钩藤汤

答案:E

解析：●[考点]麻疹的辨证论治[分析]综合观察脉证，应为麻疹逆证之邪陷心肝，治法为凉肝熄风，清营解毒，方用羚角钩藤汤。

255.(A1型题)新生儿期是指从出生断脐至足

- A.7天
- B.18天
- C.28天
- D.30天

E.40天

答案:C

解析:●[考点]新生儿期的意义[分析]新生儿期是从新生儿脐带结扎时开始至出生28天。该期是从子宫内到出母体的适应过程,经历心、肺、脑等各器官全身巨大变化。

256.(A1型题)急性上呼吸道感染风寒感冒证的治疗方剂为

A.荆防败毒散加减

B.银翘散加减

C.新加香薷饮

D.人参败毒散

E.玉屏风散

答案:A

解析:●[考点]急性上呼吸道感染的辨证论治[分析]急性上呼吸道感染风寒感冒证的治疗方法为辛温解表,方用荆防败毒散加减。

257.(A1型题)流行性腮腺炎常证温毒在表的治疗方剂为

A.柴胡葛根汤加减

B.普济消毒饮加减

C.清瘟败毒饮加减

D.龙胆泻肝汤加减

E.五味消毒饮加减

答案:A

解析:●[考点]流行性腮腺炎的辨证论治[分析]流行性腮腺炎常证温毒在表的治疗方法为疏风清热,散结消肿,方用柴胡葛根汤加减。

258.(A1型题)1岁小儿的动作能力,不可能的是

A.会爬

B.会拍手

C.会自己坐起来

D.会骑三轮车

E.会弯腰拾东西

答案:D

解析:●[考点]婴幼儿动作发育[分析]小儿动作发育,反映小儿神经精神发育过程。简单记忆方法是:一(个月)视,二(个月)听(声音),三(个月)抬头,四(个月)握(东西),五(个月)抓(玩具),六(个月)翻身,七(个月)坐,八(个月)爬,九(个月)扶床站,十(个月)抓握(拇指、食指抓握东西),周(岁)会走。3岁才会骑三轮车。

259.(A1型题)小儿腹泻时口服补液盐(ORS液)的电解质渗透压是含钠钾液的

A.1/4张

B.1/3张

C.2/5张

D.1/2张

E.2/3张

答案:E

解析:●[考点]口服补液盐配方[分析]口服补液盐是由氯化钠3.5g、碳酸氢钠2.5g、氯化钾1.5g、无水葡萄糖20g配制成,应用时加水1000ml,其中电解质渗透压为2.20mmol/L,即2/3张含钠钾液。

260.(A1型题)支气管肺炎与支气管炎的主要鉴别点是

- A.发热的高低
- B.咳嗽的轻重
- C.食欲的好坏
- D.肺部是否有固定的中小水泡音
- E.血白细胞数的高低

答案:D

解析:●[考点]肺炎鉴别诊断[分析]支气管肺炎与急性支气管炎症状有时很难鉴别,特征是肺部听诊肺炎脊柱两侧有固定的中小水泡音。

261.(A1型题)儿科常见病中发病率最高的是

- A.消化系统疾病
- B.循环系统疾病
- C.呼吸系统疾病
- D.营养性疾病
- E.泌尿系统疾病

答案:C

解析:考察小儿病理特点。小儿发病容易,突出表现在肺、脾、肾及传染病方面。其中肺常不足表现突出,加之小儿冷暖不知自调。消化系统疾病的发生率在儿科居第二位。本题题眼的发病容易的理解

262.(B型题)八脉交会穴中通带脉的是

- A.足三里
- B.阳陵泉
- C.悬钟
- D.足临泣
- E.公孙

答案:D

解析:●[考点]八会穴的名称。八脉交会穴的特点[分析]八会穴的筋会是阳陵泉。八脉交会穴中的足临泣通带脉。

263.(B型题)在胃痛治疗中,以气海、关元、脾俞、胃俞作为配穴,其证型是

- A.寒邪犯胃
- B.气滞血瘀
- C.饮食停止
- D.肝气犯胃
- E.脾胃虚寒

答案:E

解析:此题暂无解析

264.(B型题)脉会

- A.太渊
- B.大杼
- C.绝骨
- D.中腕
- E.膈俞

答案:A

解析:●[考点]八会穴名称[分析]八会穴之骨会是大杼。八会穴之脉会是太渊。八会穴之腑会是中腕。

265.(B型题)面痛风热证者,应在主方的基础上加

- A.阳白、外关
- B.列缺
- C.曲池、尺泽
- D.太冲、三阴交
- E.颧髻、迎香

答案:C

解析:●[考点]面痛的处方[分析],列缺穴能祛风散寒。曲池、尺泽可疏风清热。太冲、三阴交可理气活血化瘀。

266.(B型题)内伤咳嗽兼肺阴亏虚者,治疗时应加

- A.少商
- B.丰隆、阴陵泉
- C.行间
- D.膏肓
- E.孔最

答案:D

解析:●[考点]咳嗽的处方[分析]内伤咳嗽兼痰湿侵肺者,治疗时应加丰隆、阴陵泉化痰除湿。内伤咳嗽兼肺阴亏虚者,治疗时应加膏肓滋补肺阴。

267.(B型题)治疗阳明头痛在主穴的基础上配

- A.印堂、攒竹、合谷、内庭
- B.天柱、后溪、申脉
- C.四神聪、太冲、内关
- D.率谷、外关、足临泣
- E.曲池、合谷、内关

答案:A

解析:●[考点]头痛的处方[分析]率谷、外关、足临泣均为少阳经穴位,率谷位于头痛局部,外关、足临泣为八脉交会穴配穴。阳明头痛主要在前额部,印堂、攒竹位于前额局部,合谷、内庭均为阳明经穴位,属同名经配穴,远端取穴。太阳头痛的部位主要在后头部,天柱位于局部,后溪、申脉均为太阳经穴位,属同名经配穴、八脉交会穴配穴、远端取穴。厥阴头痛的部位主要在巅顶部,四神聪位于局部,太冲、内关均为厥阴经穴位,属同名经配穴、远端取穴。

268.(A1型题)下列各穴中,具有利胆、舒筋、宽胁作用的是

- A.期门
- B.日月
- C.丘墟
- D.阳陵泉
- E.悬钟

答案:D

解析:●[考点]腧穴的主治[分析]阳陵泉为足少阳胆经穴,又是胆的下合穴,能疏肝利胆,理气宽胁;同时阳陵泉又是八会穴之筋会,故又能舒筋。

269.(A1型题)下列各组穴中,治疗便秘较好的是

- A.公孙、丰隆
- B.中脘、下巨虚
- C.水分、上巨虚
- D.支沟、天枢
- E.下脘、陷谷

答案:D

解析:●[考点]腧穴的主治[分析]治疗便秘最好的穴组应是:天枢、上巨虚、支沟。因为便秘的病位主要在大肠,而天枢是大肠的募穴,上巨虚是大肠的下合穴,支沟是治疗便秘的经验要穴。以上各组可选答案中D最符合。

270.(A1型题)四缝穴的位置在

- A.手1~5指间,指蹼缘后方赤白肉际处
- B.手1~4指掌侧,指骨关节横纹中点处
- C.手2~5指掌侧,近端指骨关节横纹中点处
- D.手1~4指掌侧,近端指骨关节横纹中点处
- E.手2~5指掌侧,掌指关节横纹中点处

答案:C

解析:●[考点]腧穴定位[分析]四缝:第2、第3、第4、第5指掌面,近端指间关节的中央,左右共8穴。

271.(A1型题)十二经脉中,阴经与阳经多在什么部位交接

- A.头部
- B.胸腹部
- C.面部
- D.四肢末端
- E.上肢部

答案:D

解析:●[考点]经络系统的组成:十二经脉的交接规律[分析]十二经脉循行交接规律是:①相表里的阴经与阳经在手足末端交接。②同名的阳经与阳经在头面部交接。③相互衔接的阴经与阴经在胸中交接。

272.(A1型题)治疗胎位不正最常用的腧穴是

- A.合谷
- B.至阴
- C.三阴交
- D.太冲
- E.足三里

答案:B

解析:●[考点]腧穴的主治[分析]至阴穴主治:胎位不正,滞产等。

273.(A1型题)分布于胸腹第二侧线的经脉是

- A.足太阴脾经
- B.足少阴肾经
- C.足阳明胃经
- D.足厥阴肝经
- E.足少阳胆经

答案:C

解析:足阳明胃经:“在鼻旁与手阳明大肠经衔接,联系的脏腑器官有鼻,目,上齿,口唇,喉咙和乳房,属胃,络脾,在足大趾与足太阴脾经相接。”“其支者,起于胃下口,循腹里”。“经脉分布于头面、胸腹第二侧线、下肢外侧前缘及第二趾和大趾。其络脉、经别分别与之内外相连,筋经分布于外部。”腹针常用的腹部腧穴有滑肉门、天枢、外陵、大距、水道

274.(A1型题)内踝高点上3寸,胫骨内侧面后缘是

- A.光明
- B.绝骨
- C.复溜
- D.三阴交
- E.输穴

答案:D

解析:●[考点]腧穴定位[分析]三阴交:内踝高点上3寸,胫骨内侧面后缘。

275.(A1型题)在皮肤松弛部位针刺,最好选哪种进针法

- A.爪切进针
- B.舒张进针
- C.夹持进针
- D.管针进针
- E.单手进针

答案:B

解析:●[考点]毫针刺法:进针方法[分析]舒张进针法主要用于皮肤松弛部位的腧穴。

276.(A1型题)郄穴多用于治疗

- A.头面躯干和内脏病
- B.急性病
- C.脏腑病

- D.局部与全身病
E.其所属范围的病证

答案:B

解析:●[考点]特定穴:郄穴[分析]郄穴治疗本经和相应脏腑的病证,尤其在治疗急症方面有独特的疗效。如急性胃脘痛,取胃经郄穴梁丘;肺病咯血,取肺经郄穴孔最等。

277.(A1型题)提插补泻法中,补法的操作手法是

- A.轻插重提,幅度小,频率快
B.轻插重提,幅度小,频率慢
C.重插轻提,幅度大,频率快
D.重插轻提,幅度小,频率快
E.重插轻提,幅度小,频率慢

答案:E

解析:此题暂无解析

278.(A1型题)治疗实热证月经先期在关元、三阴交、血海的基础上加

- A.行间
B.隐白
C.归来
D.太溪
E.足三里

答案:A

解析:●[考点]针灸治疗月经不调的处方[分析]针灸治疗月经先期的主穴为:关元、三阴交、血海。实热证者,加太冲或行间;行间为肝经荥穴,能清泄肝经郁热,与关元、血海相配可清热和血,调理冲任。

279.(A1型题)中风中经络的针灸基本处方为

- A.内关、人中、三阴交、极泉、尺泽、委中
B.百会、神阙、关元、足三里、内关
C.气海、关元、丰隆、委中、三阴交
D.神门、内关、大陵、三阴交、足三里
E.神阙、关元、委中、太溪、昆仑

答案:A

解析:●[考点]针灸治疗中风的处方[分析]按照醒脑开窍法治疗中风中经络,应取内关、水沟、三阴交、极泉、尺泽、委中作为主穴。

280.(A1型题)既能治疗前头痛,又善治目疾的腧穴是

- A.列缺
B.悬钟
C.昆仑
D.阳白
E.太阳

答案:D

解析:●列缺主治:1咳嗽、气喘、咽喉肿痛等肺系病症;2头痛、齿痛、项强、口眼歪斜等头顶部疾患。悬钟主治:1痴呆、中风等髓海不足疾患;2颈项强痛,胸胁满痛,下肢痿痹。昆仑主治:1后头痛、项强、腰骶疼痛、足踝肿痛等痛证;2癫痫;3滞产。阳白主治:1前头痛;2目痛、视物模糊、眼睑瞤动等目疾。太阳主治:1头痛;2目疾;3面瘫。

281.(A2型题)患者心悸,气短1年,劳累后加重。检、查:脉搏80次/分,节律不规整,心率约110次/分,心律完全不规则,心音强弱绝对不一致。此患者心律失常的类型是

- A.窦性心律不齐
- B.窦性心动过速
- C.过早搏动
- D.心房纤维颤动
- E.室上性心动过速

答案:D

解析:●房颤临床听诊特点有:①心律完全不规则,快慢不一且其间完全无规律。②第一心音强弱不等且无规律。③脉搏短绌。

282.(A2型题)患者,男,65岁,突感上腹部剧烈疼痛,取硝酸甘油片含服,未能缓解。查体:脸色青白,血压80/60mmHg(10.67/7.98kPa),除心率140次/分外,心肺听诊无异常,腹平软,无压痛、反跳痛,肠鸣音存在。应首先考虑的是

- A.胃痉挛
- B.胃穿孔
- C.急性胰腺炎
- D.心绞痛
- E.心肌梗死

答案:E

解析:■心绞痛及心肌梗死的疼痛多在胸骨后方和心前区或剑突下,可向左肩和左臂内侧放射,甚至达环指与小指,也可放射于左颈或面颊部,胸痛伴苍白、大汗、血压下降或休克多见于心肌梗死、夹层动脉瘤、主动脉窦瘤破裂和大块肺栓塞。因此根据题干患者是老年患者,有上腹部放射痛,低血压,服用硝酸甘油无效,故排除心绞痛,考虑心肌梗死,而胃痉挛是一过性,突发性疼痛,胃穿孔是持续性、广泛性剧烈腹痛伴腹壁肌紧张或板样强直,急性胰腺炎是持续性疼痛,伴呕吐,呕吐后不缓解,向腰背放射,一般突发休克少见,故本题选E。

283.(A1型选择题)构成宇宙本源的是

- A.天气
- B.精气
- C.阳气
- D.阴气
- E.地气

答案:B

解析:哲学中的精、气二字内涵经常相同,是指构成宇宙的极细微的物质。

284.(A1型选择题)构成人体的基本物质是

- A.天气
- B.清气
- C.阳气
- D.水精
- E.精气

答案:E

解析:无

285.(A1型选择题)古代哲学中,精的概念源自于

- A.阴阳说
- B.五行说
- C.元气说
- D.云气说
- E.水地说

答案:E

解析:无

286.(A1型选择题)下列关于精气学说的描述错误的是

- A.中医学的精气理论,来源于古人对人类生殖繁衍过程的观察与体验
- B.精气是人体生命的本原及维系
- C.人体的生理机能依靠气的推动和调控
- D.人体的诸脏腑、形体、官窍由精化生
- E.精气学说与中医整体观念无直接关系

答案:E

解析:精气学说渗透于中医学领域,促使中医学产生了同源性思维和相互联系的思想,构建了人体本身的完整性和联系性以及人与自然、社会环境的和谐统一、完整性和联系性的整体观念。

287.(A1型选择题)五行中具有"润下"特性的是

- A.木
- B.火
- C.土
- D.金
- E.水

答案:E

解析:水曰润下——

引申为凡具有滋润、下行、寒凉、闭藏等性质或作用的事物,均归属于水。

288.(A1型选择题)属于五行之"火"的五音是

- A.宫音
- B.角音
- C.商音
- D.徵音
- E.羽音

答案:D

解析:五行 五音木 角火 徵土 宫金 商水 羽

289.(A1型选择题)五行中,"水"的"子"行是

- A.金
- B.木
- C.土
- D.火
- E.水

答案:B

解析:《难经》把相生关系比喻为母子关系,“生我”者为母,“我生”者为子。比如金为水之母,木为水之子。

290.(A1型选择题)“青色”的五行属性是

- A.土
- B.金
- C.水
- D.火
- E.木

答案:E

解析:事物属性的五行归类:木为青,火为赤,土为黄,金为白,水为黑

291.(A1型选择题)“鼻”的五行属性是

- A.木
- B.火
- C.土
- D.金
- E.水

答案:D

解析:无

292.(A1型选择题)下列不按五行相生顺序排列的是

- A.呼、笑、歌、哭、呻
- B.筋、脉、肉、皮、骨
- C.青、赤、黄、白、黑
- D.角、徵、商、宫、羽
- E.酸、苦、甘、辛、咸

答案:D

解析:五行的相生顺序:木→火→土→金→水→木, D选项的正确顺序是角、徵、宫、商、羽

293.(A1型选择题)肝病及心的五行传变是

- A.相乘传变
- B.相侮传变
- C.母病及子
- D.子病犯母
- E.相克传变

答案:C

解析:相乘次序:木→土→水→火→金→木。相侮次序:木→金→火→水→土→木。五行的母子相及包括两个方面:即母病及子和子病及母

294.(A1型选择题)属“子盗母气”的脏病相传是

- A.肺病及脾
- B.肺病及肾
- C.肺病及心
- D.肾病及肝
- E.以上都不是

答案:A

解析:无

295.(A1型选择题)按五行相生关系确立的治法是

- A.抑木扶土法
- B.佐金平木法
- C.培土制水法
- D.泻南补北法
- E.滋水涵木法

答案:E

解析:无

296.(B1型题)属五行相乘传变的是

- A.肝病及心
- B.肝病及肾

- C.肝病及肺
- D.肝病及脾
- E.脾病及心

答案:D

解析:相乘、相侮都是不正常的相克现象,相乘与相侮可同时发生;发生的条件:均可由“太过”“不及”引起。相乘是按五行相克次序发生过度克制;相侮是与五行相克次序反向发生过度克制。

297.(B1型题)属五行相侮传变的是

- A.肝病及心
- B.肝病及肾
- C.肝病及肺
- D.肝病及脾
- E.脾病及心

答案:C

解析:相乘、相侮都是不正常的相克现象,相乘与相侮可同时发生;发生的条件:均可由“太过”“不及”引起。相乘是按五行相克次序发生过度克制;相侮是与五行相克次序反向发生过度克制。

298.(B1型题)心肾不交的治法是

- A.泻南补北
- B.扶土抑木
- C.佐金平木
- D.培土生金
- E.滋水涵木

答案:A

解析:无

299.(B1型题)肺阴虚无力滋肾,或肾阴不足,不能上滋肺阴而致的肺肾阴虚证,其治疗宜采用

- A.益火补土法
- B.金水相生法
- C.抑木扶土法
- D.培土制水法
- E.泻南补北法

答案:B

解析:无

300.(A1型选择题)按五行相克关系确立的治法是

- A. 金水相生法
- B. 益火补土法
- C. 培土制水法
- D. 滋水涵木法
- E. 培土生金法



金英杰医学
JINYINGJIE.COM



金英杰医学
JINYINGJIE.COM



金英杰医学
JINYINGJIE.COM